

Coco Prieto

Plegadis falcinellus

Glossy Ibis



Morfología: Zancuda de mediano tamaño, con el pico largo y curvado hacia abajo, mayor en los machos. El plumaje tiene un color marrón oscuro con tonalidades púrpura y verde metálico brillante, que de lejos se observa negro. **Ecología:** Muy abundante en las arroceras y la ciénaga de Biramas. Habita además en ciénagas y pantanos de aguas someras, así como en sabanas naturales inundadas y arroceras. Se alimenta de insectos acuáticos, moluscos, pequeños peces y crustáceos. En las arroceras su dieta puede cambiar a granívora después de la etapa de cría, consumiendo fundamentalmente arroz. Cría entre junio y agosto. Nidifica en grandes colonias, frecuentemente junto a otras garzas, guanabaes y cocos blancos. Ponen entre 2-4 huevos de color azul más intenso que el de las garzas. Los pichones nacen de color gris, con el pico pequeño, recto y de color claro con una o dos bandas transversales negras en la porción central. A medida que crecen el pico se les oscurece y recurva.

Sevilla

Ajaia ajaja

Roseate Spoonbill



Morfología: Esta es una especie inconfundible con unos 81 cm. de largo, el pico es largo y aplanado con forma de cuchara. EL cuello es relativamente largo, de color blanco y las regiones dorsal, ventral y las alas de color rosado. La cabeza en los adultos carece de plumas y es de color verde. **Ecología:** Forrajea solitaria o en pequeños grupos, moviendo la cabeza de un lado a otro, formando semicírculos en el agua. En su dieta incluye pequeños peces y crustáceos, especialmente camarones; además puede incluir algún tipo de material vegetal. Nidifica en colonias o solitaria, de mayo a septiembre, a mediana altura. El nido es voluminoso, pone 2 o 3 huevos. Vive en zonas pantanosas y costeras de Suramérica, América Central y el Caribe y las partes más bajas de Estados Unidos.

Orden PHOENICOPTERIFORMES

Este es un grupo pequeño (5 especies), con una distribución restringida a determinadas zonas de Suramérica, América Central, el Caribe y África. Lo más característico son sus patas y cuello largos que los hace muy llamativos en las zonas en que viven. En Cuba existe una sola especie que permanece durante todo el año.

Flamenco

Phoenicopterus ruber
Greater Flamingo



Morfología: Como representante del orden, lo más característico de esta especie son sus largas patas y cuello, lo que hace que sea considerada un ave muy grande (120-135 cm.) Además tiene un pico curvado hacia abajo con una serie de laminillas en su interior que le permite alimentarse mediante filtración. Tiene un color rosado que se hace más intenso durante la adultez.


Ecología: Su dieta es muy variada y está formada en su mayoría por invertebrados acuáticos, moluscos y anélidos. Además incluye materia vegetal principalmente semillas. Cría de abril a octubre, en grandes colonias de hasta 20 000 parejas donde hace unos nidos de lodo muy peculiares, en forma de montículo. En ellos, deposita un solo huevo de gran tamaño. Su distribución en Cuba está restringida a algunas zonas costeras y cayos. La principal área de reproducción está al norte de Camaguey en la desembocadura del río Máximo.

Orden ANSERIFORMES

Bajo este nombre se agrupan 150 especies de patos, gansos y cisnes, distribuidos por todo el mundo. En Cuba han sido observadas 29 especies de las cuales 23 son migratorias y solo 6 crían en nuestro territorio. Se caracterizan por presentar membranas entre los tres dedos anteriores y un pico en forma de espátula.

Yaguasín

Dendrocygna bicolor
Fulvous Whistling Duck



Morfología: Tiene un tamaño de unos 51 cm. y un peso de 670 g. Su coloración general es leonada, aunque la parte superior es oscura y en los flancos presenta plumas alargadas con marcas blancas, tanto el pico como las patas son de color grisáceo. **Ecología:** Su alimentación se basa en semillas de arroz, arrocillo, metebravo y otras plantas indeseables que se presentan en los campos arroceros. La época de cría comienza en abril y en algunos casos puede extenderse hasta diciembre. Construye su nido entre la vegetación herbácea o en los campos arroceros. Pone entre 11 y 18 huevos blancos, aunque algunos nidos pueden presentar una cantidad mayor de huevos, debido a puestas de otras hembras. Se encuentra ampliamente distribuido por el mundo y en Cuba comenzó a incrementar sus poblaciones a partir de los años 60 y llegó a tener grandes poblaciones en las arroceras durante los años 70 y 80. A partir de ahí ha disminuido drásticamente, debido en gran medida a la presión de caza.

Yaguasa Criolla

Dendrocygna arborea
West Indian Whistling-Duck




Morfología: Su tamaño es de unos 53 cm. y su peso de 1150 g. En la parte superior del cuerpo presenta una coloración parda oscura y se destaca una banda negruzca en la parte superior de la cabeza y el cuello. La zona de la garganta y el vientre son de color grisáceo y el pecho es pardo claro. Se destacan a ambos lados del cuerpo un grupo de plumas muy oscuras manchadas de blanco. Las patas y el pico son de color gris pizarra.

Ecología: Durante el día permanecen ocultas en zonas de manglares, lagunas u otras áreas de refugio bien alejadas de la actividad humana. Al caer la noche vuelan hacia las plantaciones de arroz u otros cultivos para alimentarse de semillas, tubérculos, rizomas y otras porciones vegetales. Crían entre abril y diciembre, en huecos abandonados en troncos de palma o entre las raíces del mangle, ponen de 11 a 16 huevos de color blanco. Habita únicamente en las Antillas Mayores y las Bahamas. **Se encuentra amenazada de extinción por la cacería indiscriminada y la reducción de su hábitat. Cuba cuenta aun con algunas poblaciones y debemos trabajar para garantizar su supervivencia.**

Huyuyo

Aix sponsa
Wood Duck



Morfología: Es el pato mas brillantemente coloreado de todos los que tenemos en Cuba. Su tamaño es de unos 48 cm. y su peso de 600g. En el macho se presenta un patrón complejo de colores con verde iridiscente y violeta en la cabeza, donde se destaca una cresta de plumas eréctiles, el pecho es marrón, los flancos crema y se presentan además marcas blancas y negras en otras partes del cuerpo. La hembra es parda y es característica en ellas una marca blanca alrededor de los ojos y en la garganta. **Ecología:** Se alimenta de semillas, vegetación acuática y algunos insectos. Anida en huecos de troncos y pone de 8 a 14 huevos blancos entre junio y octubre. Habita en la América del Norte, desde el Sur de Canadá hasta México, además en Bahamas y Cuba. Generalmente se les ve en parejas o pequeños grupos, pero nunca en grandes bandadas como otras especies. Vive en lagunas, ríos , arroceras, etc.