

Pato Serrano

Anas crecca

Green-Winged Teal

Pato Bahamas

Anas bahamensis

White-Cheeked Pintail



Pato Serrano- **Morfología:** Es el más pequeño de los patos migratorios que nos visitan, con solo 36 cm. de longitud y un peso de 350g. Se destacan los machos por tener la cabeza de color castaño con un parche verde que comienza alrededor del ojo y se extiende hacia atrás. Las hembras y juveniles son pardos moteados en negro. **Ecología:** Se alimenta de plantas acuáticas y semillas. Cría en E. U. y Canadá y después migra al sur, llegando hasta Honduras, Belice y el Caribe. En Cuba se ha visto con mayor frecuencia en los últimos años. Habita en lagunas, ciénagas, esteros y arrozceras.

Pato Bahamas- **Morfología:** Tiene un tamaño de unos 43 cm., y un peso de 500g. El elemento mas destacado es la zona blanca debajo del ojo y el parche rojo a ambos lados del pico. Los sexos son similares. **Ecología:** se alimenta principalmente de semillas, moluscos, plantas e insectos acuáticos. Cría entre mayo y agosto y pone de 6 a 12 huevos de color crema en nidos que construye entre la vegetación acuática. Vive en América del Sur y el Caribe. En Cuba se le encuentra principalmente asociado con los campos arrozceros

Pato Pescuecilargo

Anas acuta

Northern Pintail

Pato Lavanco

Anas americana

American Wigeon



Pato Pescuecilargo- **Morfología:** Es relativamente grande con unos 66 cm. de longitud y un peso de 800g. Se destacan por tener el cuello y la cola alargados, muy evidentes en vuelo. En el macho la cabeza es pardo oscura y el cuerpo gris por encima y blanco por debajo. La hembra es parda. **Ecología:** Consumen principalmente semillas, vegetación acuática, insectos y renacuajos. Crían desde el norte de E.U. hasta el norte de Canadá. Durante la migración viajan al sur por la América Central y el Caribe, ocasionalmente llegan hasta el norte de la América del Sur.

Pato Lavanco- **Morfología:** Es muy robusto con unos 51 cm. de longitud y un peso de 720g. El macho es parduzco por la parte superior y mas claro por la inferior. La cabeza es gris con la coronilla blanca y un parche verde oscuro a ambos lados. La hembra es parda con la cabeza gris. **Ecología:** Se alimenta principalmente de semillas y vegetación acuática. Cría en EE.UU. y Canadá y después migra hacia el sur por toda la América Central y el Caribe, llegando hasta Colombia y Venezuela en la América del Sur. En Cuba habita en lagunas, ciénagas y embalses, aunque no es tan común como otras especies.

Pato Cuchareta

Anas clypeata
Northern Shoveler



Morfología: tiene un tamaño mediano con unos 48 cm. de longitud y un peso de 610g. Su carácter mas distintivo es el pico en forma de espátula, con una especie de peine de finos dientes en sus bordes, que utilizan para filtrar el plancton que constituye parte esencial de su alimentación. En los machos la cabeza es verde iridiscente, el pecho blanco y la zona ventral y los flancos de color castaño. Las hembras son pardas y se distinguen básicamente por la forma del pico. **Ecología:** Su alimentación esta constituida por pequeños caracoles, insectos, semillas y plancton. Crían en las praderas inundables del norte de los EE.UU. y sur de Canadá. Habitan en Eurasia y Norteamérica. Posterior a la cría las poblaciones de Norteamérica migran hacia el sur ocupando las áreas de Centroamérica, el Caribe y el norte de la América del Sur. En Cuba es común como residente invernal de nuestras lagunas costeras, embalses, arroceras etc.

Pato de la Florida

Anas discors
Blue-Winged Teal



Morfología: Es uno de los patos más pequeños que nos visitan durante la migración. Cuenta con solo 41 cm. de longitud y un peso de 380g. Se destacan los machos por tener una coloración pardo-grisácea densamente poblada de marcas negras. Su carácter más distintivo es la cabeza gris con una media luna blanca por delante de los ojos. Las hembras son pardas. Los jóvenes son muy similares a las hembras y comienzan a mudar el plumaje hacia finales de año. **Ecología:** Su alimentación está basada en semillas, vegetación acuática e insectos. Crían en el norte de EE.UU. y sur de Canadá. Al concluir la temporada reproductiva migran hacia el sur distribuyéndose desde el sur de norteamérica y México, por toda la América Central, el Caribe y la América del Sur hasta Argentina. Prefieren los cuerpos de agua de baja profundidad por lo que con frecuencia se les ve en las márgenes de embalses, ríos y lagunas. Son frecuentes en los campos de arroz, sobre todo durante la noche, cuando vienen a alimentarse.

Pato Cabezón

Aythya collaris
Ring-Necked Duck

Pato Morisco

Aythya affinis
Lesser Scaup



Pato Cabezón o Negro- **Morfología:** Es fuerte, con unos 43 cm. de longitud y un peso de 700g. En los machos la cabeza, el cuello, el dorso y el pecho son de color negro y el vientre es blanco. La hembra es parda con un pequeño anillo blanco alrededor del ojo. **Ecología:** Bucea en el fondo de lagunas y embalses, donde captura insectos acuáticos y moluscos. Cría en América del Norte y después migra al sur, llegando hasta Panamá y el Caribe. En Cuba se pueden observar con frecuencia en los embalses, a veces en grandes bandadas que se mantienen casi en reposo durante el día.

Pato Morisco- **Morfología:** Tiene un tamaño de unos 43 cm. y un peso de 830 g, lo que le da una apariencia robusta. En el macho la cabeza, cuello y pecho son negros. La parte superior es oscura muy marcada en blanco, el vientre es blanco y la cola es pardo negruzca. La hembra es parda con una marca blanca rodeando la base del pico. **Ecología:** Obtiene su alimento buceando en lagunas y embalses, donde consume invertebrados y vegetación acuática. Cría desde el norte de EE.UU. hasta el norte de Canadá, después migra al sur y llega hasta América del Sur y el Caribe.

Pato Chorizo


Oxyura jamaicensis

Ruddy Duck

Pato Agostero

Oxyura dominica

Masked Duck



Pato Chorizo- Morfología: Tiene un tamaño de 38 cm y un peso de 560 g. Los machos tienen un plumaje pardo rojizo, con la parte superior de la cabeza negra, las mejillas blancas y el pico azul. Las hembras son pardas, con una zona más clara en las mejillas, atravesada por una línea oscura. **Ecología:** Son buceadores y se alimentan de vegetación acuática. Construyen sus nidos desde junio hasta agosto entre la vegetación. Ponen 6 huevos blanquecinos. Habitan en lagunas, sabanas inundables, campos de arroz, etc., en el Sur de EE.UU. y este de la América del Sur y Las Antillas.

Pato Agostero- Morfología: Tiene unos 33 cm. de longitud y un peso de 380 g. El plumaje de los machos es castaño y la cabeza negra. Se destaca una mancha blanca en las alas cuando vuelan. Las hembras son pardas con las mejillas más claras y atravesadas por dos líneas oscuras. **Ecología:** Son buceadores y se alimentan de insectos acuáticos y materia vegetal del fondo de lagunas, embalses, etc. Crían de junio a septiembre en campos de arroz, y lagunas de baja profundidad. Ponen de 8 a 18 huevos de color crema. Habitan desde la zona costera del Golfo de México hasta la América del Sur y Las