



Características distintivas:

# Pterois volitans / Pterois miles

**Nombres comunes:** Pez León Rojo / Pez León Diablo

**Familia:** Scorpaenidae

**Origen:** Océano Índico y Océano Pacífico



## Síntesis de la descripción zoológica:

Son peces que pueden alcanzar 43 cm y un peso máximo de 1,2 Kg. El dimorfismo es sólo visible durante la reproducción. El cuerpo es blanco o crema con un intercalado de rallas blancas y oscuras en disposición vertical, la coloración del cuerpo puede variar según el hábitat. A lo largo de la línea lateral y las aletas pectorales presentan puntos blancos (luteos). Poseen 13 espinas dorsales; entre 9 y 11 radios dorsales blandos (10-11 para *P. volitans* y 9-11 para *P. miles*); 3 espinas anales; entre 6-7 radios blandos anales. Las aletas pectorales tienen forma de abanicos. La dorsal principal y las 3 espinas anales son venenosas. Pueden presentar pequeños tentáculos carnosos (cirros) encima de los ojos y debajo de la boca, y protuberancias espinosas en el rostro.



Algunas características distintivas de esta especie

# Pterois volitans

## Aspectos de la biología reproductiva:

Amabas son especies gonocóricas, su cortejo de apareamiento incluye círculos y curvas, comenzando poco antes del anochecer y se extiende hasta bien entrada la noche. Los machos se agrupan con múltiples hembras para formar grupos de tres a ocho peces, interactuando los machos de forma antagónica. Tras la fase del cortejo, la hembra libera dos masas de huevos flotantes que son fecundados por el macho, liberándose entre 2.000-15.000 huevos. Las larvas de *P. volitans* tienen una longitud notocordal 3,8-11mm. Son capaces de reproducirse a lo largo de todo el año, alcanzado un pico máximo comprendido de finales de año (octubre-noviembre) hasta inicios de año (marzo-abril) estimándose que

comienzan a reclutarse por primera vez a la reproducción a partir de los 20 cm de longitud total.



Agrupamiento de individuos en posible cortejo.

## Ecosistemas que afecta en Cuba:

Son peces de arrecifes coralinos, han colonizado manglares, pastizales, zonas profundas y zonas estuarinas, dependiendo de la abundancia de refugios y disponibilidad de alimento.



Pez León alimentándose en el arrecife coralino

## Distribución en Cuba:

Se reporta por primera vez en 2007 frente a la costa del Acuario de Baconao en la costa sur de la provincia de Santiago de Cuba, luego se continuó reportando a lo largo de todo el país en los años siguientes hasta en 2010 en que empieza a considerarse ya como una especie establecida. La vía más probable de su llegada a Cuba puede haber sido a través de las Bahamas.

Si detecta la presencia de esta especie en otro sitio, por favor, repórtelo a la oficina más cercana del Cuerpo de Guardabosques.

Textos: Isora Baró y Pedro Herrera Fotos:  
Diseño: Luis Antonio Casanella Cué

