

D

- DAGAME:** (*Calycophyllum, candidissimum*, D. C.) Arbol silvestre de las Rubiáceas, conocido en toda la Isla con este solo nombre. Es abundante en terrenos llanos o poco elevados calcáreos y pedregosos. Es muy elevado (y se le distinguen fácilmente en el bosque por su tronco recto, liso, de color rojo pálido y sin ramas bajas. Florece en Abril y Mayo y su fruto lo come el ganado. Su madera es dura, pesada y compacta, de color uniforme, amarillo muy pálido, algo parecido al Boj. Se le utiliza en la carpintería rural para ejes de carretas, timones de arados, soleras, etc. Las flores pequeñas, tubulosas, son visitadas por las abejas, y están rodeadas de unas grandes brácteas blancas que parecen pétalos, y que dan al árbol un aspecto muy vistoso.
- DAGAME CIMARRÓN:** Llaman así en Jamaica, Habana, a un arbusto silvestre de las Rubiáceas, el *Psychotria horizontalis*, Lin., que crece en las colinas calcáreas.
- DAGAMITO:** En la zona de Niquero, Oriente, aplican ese nombre a la *Jussiaea erecta* Lin., planta herbácea propia de pantanos y orillas de ríos, de la familia de las Enoteráceas, y más conocida como *Clavellina*. V.
- DAGUAIBÓN:** *Nelumbo nucifera* Gaertn. Malanga acuática colectada con ese nombre en la ciénaga de Birama, Oriente, por el Ing. Acuña. V. YUCA CHINA.
- DAGUILLA:** "Arbol silvestre que se eleva a más de diez varas: su grueso dos pies; florece en Abril y Mayo; su corteza interior es como una tela de rengue o tejido de redecilla muy elástico, la cual, por su suavidad, suele emplearse en el campo para delantales, pañuelos de cuello, etc. Las tiraderas de ella son preferidas a las de cáñamo; su madera sin uso; no así su corteza, destinada para cordelería y tejidos. Se encuentra en las sierras y peñascos".—Pichardo.
- Hay varias Daguillas, todas ellas de lomas y terrenos áridos, preferentemente de cuabales o sea terrenos de serpen-

tina. La especie principal, llamada Daguilla común es el *Lagetta lintearia*, Lam., de la familia de las Timeliáceas. Abunda más en la mitad oriental de la Isla. Otra especie común es *Lagetta Valenzuelana*, A. Rich., que abunda en la provincia de La Habana. En Oriente le dicen Guanilla (diminutivo de Guana), Grisebach llama a esa especie Daguilla de loma, y Fernández, Daguilla valenzuelana.

DAGUILLA COMÚN (Pichardo): V. DAGUILLA.

DAHILE (Bachiller): V. DAGUILLA COMÚN.

DAHLIA (Pichardo): V. DALIA.

DALBERGIA: Tercer Informe de la Estación Agronómica): Arbol exótico, introducido y propagado por la Estación Agronómica, el *Dalbergia sisso*, Roxb., de las leguminosas. Es de rápido crecimiento y suministra una madera dura y valiosa. Se propaga por medio de semillas y también por estacas de las raíces superficiales. Florece en Marzo y Abril. Sus hojas son pequeñas parecidas en la forma a las del álamo, y los frutos son unas legumbres pequeñas y aplanadas. Es una planta bastante ornamental y se prestaría para el arbolado de las carreteras y para la repoblación de nuestros bosques.

DALIA: Planta ornamental cultivada, de grandes y bellas flores que ofrecen un buen número de variedades y matices. Las variedades más valiosas pertenecen a la especie *Dahlia coccinea* Cav. de la familia de las Compuestas. Estas se multiplican por sus tubérculos o raíces múltiples y desaparecen todos los años en la seca. Pero hay una especie aclimatada, perenne, arbustosa, que se reproduce por gajos o estacas y prende muy fácilmente. Aunque es poco apreciada por ser muy común, ella produce bellas flores dobles de color lila intenso. Es la *Dahlia variabilis* Des., comúnmente llamada GIGANTÓN. V.

“Tubérculos feculentos, comestibles, diuréticos, sudoríficos”.—(Maza).

DAMA ENTRE GALANES: *Lantana insularis* Moldenke. Nombre anotado por el Hno. Aláin para esta especie de Verbenácea que sólo existe en la costa sur de Oriente y en Jamaica.

DAMASQUINA (Maza): V. CAJIGAL.

DAMIANA: V. ROMPE CAMISA MACHO.

DÁTIL: (*Phoenix dactylifera*, Lin.) Palmera exótica bastante propagada en la Isla, que llega a producir frutos de buena calidad; pero no en escala comercial. Como se trata de una planta dioica, es decir, de sexos separados en distintos pies, es necesario tener una planta que produzca flores fe-

- meninas y que en el mismo terreno o cerca exista otra planta con flores masculinas. Las abejas se encargan de transportar el polen de un modo inconsciente. V. PALMA DÁTIL.
- DÁTIL DEL SUR: (*Phoenix rupicola*, T. Anders): Palmita ornamental introducida y propagada por los jardines de La Habana.
- DÁTIL PEQUEÑO: *Phoenix humilis* Royle. Palma cultivada, escasa, ornamental.
- DELEITE: Según Pichardo y Pezuela así llaman en Santiago de Cuba al *Clitoria ternatea*, Lin., Papilionácea cultivada. V. BEJUCO DE CONCHITAS y CONCHITA AZUL.
- DEMAHAGUA (Oviedo): V. DEMAJAGUA y MAJAGUA COMÚN.
- DEMAJAGUA: En Oriente llaman así a la MAJAGUA COMÚN. V.
- DERRIS: Nombre científico hecho vulgar del *Derris elliptica* Benth., Leguminosa originaria de Burma, Malaya, y cultivada extensamente en la Indonesia para extraer el *rotenone*, insecticida contenido en sus raíces. La especie fue introducida en Cuba desde hace más de 10 años; pero el escaso rendimiento de la variedad existente hizo que no se propagase su cultivo. Hace unos cinco años recibimos de la Estación Experimental de Puerto Rico estacas de nueve clones o variedades de esta planta que fueron seleccionadas en aquel país, utilizando material recibido de la plantación de la Goodyear en Java. Estos nueve clones se aseguran que contienen del 6 al 9% de rotenone, en tanto que la variedad que teníamos no pasaba del 1%. Hemos cultivado y multiplicado estos clones en los terrenos de la Estación, pero no se ha comprobado todavía si mantienen la misma riqueza en *rotenone*.
- DESNUDO FLORECI: V. PIÑÓN AMOROSO.
- DESNUDO FLORECIDO: En Pinar del Río y en algunos lugares de Las Villas dan ese nombre al Piñón amoroso *Gliricidia sepium* (Jacq.), Steud.
- DIACANÁN (Maza): Nombre indígena, dudoso, de la yuca
- DIAGAMÓN: *Nelumbo lutea* Willd. N. *nucifera* Gaern. V. DAGUAIBÓN y YUCA CHINA.
- DAHUTIA (Oviedo): V. YAUTIA.
- DIAMELA: (*Jasminum sambac* (L.) Soland, var. *trifoliatum*, D. C.) Arbusto ornamental cultivado de la familia de las Jasmínáceas. V. JAZMÍN DIAMELA.
- DIBIDIBI: Nombre de tres árboles silvestres de la familia de las *Cesalpiniáceas*. Son el *Caesalpinia coriaria* (Jacq.), Willd.,

también llamado Guaracabuya y Guatapaná; el *Caesalpinia pauciflora* (Griseb.), C. Wright, común en las sabanas del litoral de Cienfuegos, y el *Caesalpinia pinnata*, *Sauvalle*. Todos ellos son de madera dura y de frutos y corteza muy ricos en tanino, por lo que se usan como curtientes. V. CACALOTE y DIVIDIVI.

DICHA: Planta ornamental muy común en La Habana y pueblos de la provincia. Es el *Dieffenbachia Seguine* (Jacq.), Schott., de la familia de las Aráceas. En Santiago de las Vegas lo llaman, además, Brazo poderoso. Presenta un tallo herbáceo y cilíndrico de dos metros o más de altura y hojas grandes ovaladas, verdes con pintas o manchas blancas. Esta planta contiene un jugo acre y cáustico que produce una gran inflamación en la lengua, por lo cual los americanos la llaman Dumbcane (caña que produce la mudéz).

DÍCTAMO: V. DÍCTAMO REAL.

DÍCTAMO REAL: "Especie de Euforbiácea común, cuyo tallo y ramas verde-oscuros son quebradizas; hojas alternas, terminadas en punta, aquilladas, gruesas; flores agrupadas, de figura extraordinaria, pues parecen vejiguillas en forma de cuerpo de paloma, circunstancia que dio origen al nombre de Palomilla o Gallito colorado, como otros llaman al Díctamo, y las cuales son de color rojo y algún amarillo, conteniendo miel que liban de preferencia las abejas y zunzunes. El jugo lechoso que esta planta destila por donde quiera se le parta, es un violento vomipurgante y se le emplea para curar empeines; las hojas, despojadas de sus nervios, se mascan para los males de la garganta; y el cocimiento o jarabe para los del pecho. Agrega el señor Michelena que de esta especie de Titimalo, perteneciente a la familia de las Euforbiáceas, se extrae un aceite que puede reemplazar al de Tártago o Catapuera menor, que con sus hojas mascadas se curan las úlceras dándoles baños al mismo tiempo con el cocimiento del tallo y las hojas, siendo uno de los narcóticos más infalibles en la cirugía".—Pichardo.

Hay tres especies distintas de Díctamo o Díctamo real, que es como generalmente se llama en Cuba. Son *Pedilanthus angustifolius* Poit., *Pedilanthus latifolius*, Millsp. y *Pedilanthus tithymaloides* (L.) Poit. Esta última especie es la más común, abundantísima en toda la Isla y usada para formar cercas y guardarrayas. Sus flores rojas, que más bien tienen la figura de un pie o de un zapato que de una paloma, tienen un néctar o jugo dulce por lo cual los

muchachos las chupan y y el jugo del tallo lo utilizan para curarse las boqueras.

“Látex, semillas y raíz irritantes, eméticos y drásticos; las hojas en decocción se usan como emenagogas, flores pectorales, de néctar azucarado, comestibles. El látex se emplea tópicamente contra el carcinoma y las verrugas”. (Maza).

A nosotros se nos ha asegurado que el jugo del dictamo real es bueno para los herpes.

DIENTE DE LEÓN: *Taraxacum officinalis* Weber (*Taraxacum Dens-Leonis* Dcne.) Compuesta cultivada, recientemente introducidas en Cuba. Las hojas tiernas se comen en ensalada y las raíces son medicinales. Tiene las hojas con grandes dientes en el margen, a lo que aluden el nombre vulgar y el científico.

DIENTE DE MAJÁ: Así llaman en Motembo, provincia de Las Villas, al *Solanum jamaicense* Mill., Solanácea espinosa, conocida en Vueltabajo como AJICÓN. V.

En La Maya, Oriente, dicen así al *Acidocroton oligostemon* Urb., arbusto espinoso silvestre de las Euforbiáceas.

DIEZ DEL DÍA: Hierba postrada, especie de verdolaga, de hojas carnosas, lineales y flores rosadas; silvestre en las sabanas arenosas de la costa Sur de Vueltabajo. Se le usa mucho en La Habana y en otros lugares de la Isla para formar césped y adornar las orillas de los canteros en jardines y parques. Le dicen Diez del día, Diez de la mañana y Saltaperico, porque abre bruscamente sus flores a eso de las diez de la mañana. Es el *Portulaca pilosa* Lin., de la familia de las Portulacáceas. También llaman así a la *Portulaca grandiflora*.

En Camagüey dicen también *Diez del día* al *Solanum lentum* Cav. Solanácea silvestre, común en los montes de tierras altas, trepadora. Las flores son moradas, grandes, parecidas a las de la papa. V. VERDOLAGA.

DIGITAL: Planta medicinal cultivada, *Digitalis purpurea* L. de la familia de las Escrofulariáceas. De sus hojas se obtiene la *digitalina*.

En la Sección de Plantas Medicinales de la Estación Experimental Agronómica se han logrado plantas de diversas especies de digital, obtenidas de semillas recibidas de Europa. Estas especies son: *Digitalis ambigua* Mier., *D. parviflora* Lin. y *D. purpurea* Lin. Esta última se propaga bien; pero no ha llegado a florecer en el país. Han florecido la *D. ferruginea* y *D. lutea*.

DINAMITA: Lllaman así en Camagüey, al Sur, al *Ruellia tuberosa* L., planta silvestre de lugares húmedos, con flores azul-lila, de la familia de las Acantáceas. V. SALTA PERICO.

En Oriente llaman *Dinamita* a una planta ornamental cultivada *Synadenium Grantii* Hook, de las Euforbiáceas, cuyo látex cáustico, es dañino para los ojos. V. SINADENIA.

DISCIPLINA (Pichardo): DISCIPLINILLA.

DISCIPLINARIA (Sauvalle): V. DISCIPLINILLA.

DISCIPLINILLA: "Planta parásita que se cría en algunos jagüeyes y otros árboles, de figura semejante a la disciplina de azotar. Las hay verdes, rosadas, etc. Sauvalle en las Cactáceas Disciplinaria o Disciplinilla, en la Vueltabajo". —Pichardo.

Esta planta es el *Rhipsalis Cassutta*, Gaertn., de la familia de las Cactáceas. Se la encuentra en los bosques de toda la Isla; pero no es parásita, puesto que tiene clorofila, sino epífita, es decir, que vive sobre los árboles sin alimentarse a expensas de ellos; a veces también es saxícola, esto es, que vive sobre las piedras. Carece de hojas y sus ramas verdes son cilíndricas, colgantes; las flores pequeñas y los frutitos son unas bayas blancas, redondas, de 5 mm. de diámetro.

El Catálogo del Jardín Botánico del Instituto de La Habana trae otra Disciplinilla cultivada, que es una Euforbiácea (*Telmaca mexicana*, Lin.).

DIVIDIVI (Maza): DIBIDIBI.

DIVIERTE CAMINANTE: V. DIVIERTE SABANERO.

DIVIERTE SABANERO: En Cayo Ramona, península oriental de Zapata, dan ese nombre al *Centrosema virginianum* (L.) Benth. enredadera silvestre de las Papilionáceas. V. CLICA DE NEGRA y PAPITO.

DOBLE UÑA: "Arbusto silvestre que se propaga de semilla; su madera es bastante dura, pero no muy pesada, de textura fibrosa y de grano fino, de color gris teñido de amarillento parduzco con vetas algo más oscuras; es susceptible de buen pulimento y sin embargo no se hace uso de ella que yo sepa".—Fernández.

Parece que se trata del *Pithecellobium hystrix* (A. Rich.), Benth., o de alguna especie afín. V. CARRASQUILLA y ZARCILLA.

DOCE DEL DIA (Maza): V. BUENAS TARDES.

DODONEA: (*Dodonaea viscosa*, Jacq.) Planta silvestre de la familia de las Sapindáceas.

DOEKOE: (*Lansium domesticum*, Jacq.), Meliáceas. V. ÁRBOL DE LANZA y LANSIO.

DÓLICO: *Dolichos lablab* L. V. FRIJOL CABALLERO.

DOMBEYA: *Dombeya Wallickii* Benth & Hook (*Astrapea Wallickii* Lindl.) arbolito nativo de Madagascar que puede alcanzar hasta 30 pies de altura, con hojas grandes, aterciopeladas, acorazonadas irregularmente lobadas, con estípulas foliáceas. Flores color escarlata o rosadas en umbelas colgantes, los pedúnculos largos y peludos. Esta especie está algo propagada en nuestros jardines y algunos la llaman *hortensia* y *mil flores*. Hay otra especie, menos común, la *Dombeya spectabilis* Bojer, que es una planta más pequeña y de flores blancas más chicas.

DOMINICA (Maza): V. VICARIA.

DOMINGUITO: Nombre local empleado en la Bahía de Cochinos para designar al *Linociera domingensis* (Lam.), K. Muehl., árbol silvestre de la familia de las Oleáceas. V. BAYITO, CANEY, CORONEL y GUANEY.

DON CARLOS (Pichardo): V. CAÑUELA y HIERBA DE DON CARLOS.

DONCELLA: Nombre local, empleado en Topes de Collantes, montañas de Trinidad, para un arbolito de las Sapindáceas, *Matayba apetala*, Radlk. V. MACURIJE.

DON DIEGO DE DÍA (Maza): Convolvulácea cultivada (*Convolvulus tricolor*, Lin.).

DON DIEGO DE NOCHE: "Planta que el señor Sauvalle coloca en las Nictagináceas inmediata a la Maravilla".—Pichardo.

Es el *Weddeliella incarnata* (L.), Cockerell (*Allionia incarnata*, Lin.), de las Nictagináceas. V. BELLA DE NOCHE.

DON JUAN DE CASTILLA: En Camagüey dan ese nombre a una graminácea silvestre, buen pasto y muy común, la *Digitaria sanguinalis* L. V. PATA DE GALLINA.

DON TOMÁS (Maza): V. PIÑÓN VÓMICO.

DON TRIBUCIO: Así se llama en Baracoa, según el Dr. Ekman, una hierba silvestre de la familia de las Rubiáceas, *Diodia sarmentosa* Sw. V. YERBA DE GARRO.

DOÑA MANUELA: En Catalina de Güines, provincia de La Habana, designan de ese modo al *Clerodendron speciosissimum* Van Geert (*Clerodendron fallax* Lindl.), arbusto ornamental de las Verbenáceas. V. GUARDIA CIVIL.

DOÑANICA. En Baracoa llaman así al *Lantana trifolia*, L., arbusto silvestre de las Verbenáceas. V. FILIGRANA DE PIÑA.

DORADILLA: Sauvalle, Maza y demás autores cubanos mencionan varias doradillas, a saber: *Asplenium auriculatum*, Sw.; *Asplenium dentatum*, Lin., y *Asplenium serratum*, Lin., helechos silvestres de la familia de las Polipodiáceas también llamadas Culantrillos. Otra Doradilla: *Peperomia rotundifolia* (L.) H. B. K. (*P. nummulariaefolia*, H. B. K.) de las Piperáceas.

Pero ninguna de éstas es la verdadera Doradilla, tan conocida y popular. Esta es un helecho de la familia de las Polipodiáceas, el *Polypodium polypodioides* (L.), A. S. Hitchc. (*Polypodium incanum*, Sw) Crece sobre los árboles en los bosques húmedos, pero más comúnmente en las desembocaduras de los ríos de la costa Sur, en terrenos pantanosos y orillas de las ciénagas y babineyes. Se le encuentra de preferencia sobre las yanas, júcaros, ocujes y guásimas. Es una planta muy estimada y buscada como medicinal, considerándose la mejor la que procede de Isla de Pinos y de la Vueltabajo. Se le considera como un excelente remedio en las enfermedades del hígado y se la toma en cocimiento o simplemente se utiliza para beber el agua en que se han colocado hojas de esta planta por varias horas, durante las cuales toma un gusto peculiar a tierra.

Existe patentado un Elíxir de Doradilla. La planta tiene unos rizomas trepadores cubiertos de escamitas pardas. Los tallos son densamente escamosos, de 2.5 a 10 cm. de largo; el limbo de las hojas o frondes es de contorno oblongo-lanceolado, agudo, coriáceo, de 3 a 15 cm. de largo hendido casi hasta el mismo raquis de segmentos obtusos, enteros, oblongos, lampiños en la cara superior y con la cara inferior densamente cubierta de escamas peltadas, grises, con el centro más oscuro. Este helecho, durante la sequía o cuando se le arranca del tronco donde vive, aparece completamente seco, y sus hojas, arrugadas y muy reducidas de tamaño, parecen muertas; pero tan pronto llueve y quedan inundados los terrenos bajos donde vive, extiende sus hojas como si renaciera, de un color verde intenso. Lo mismo sucede cuando se echa una de estas hojas en agua y se la deja allí varias horas, aunque haya estado guardada en envases durante mucho tiempo. Por esta razón los norteamericanos llaman a esta planta *Resurrection fern* (Helecho que resucita).

DORMIDERA: En la parte occidental de la Isla dan ese nombre a varias leguminosas silvestres, cuyas hojas se cierran al menor contacto. Entre ellas la más notable es la conocida universalmente como Sensitiva (*Mimosa pudica*, L.), de las Mimosáceas, que en todas las obras de Botánica se cita como ejemplo notable de sensibilidad en los vegetales. Se ha discutido mucho la causa de estos movimientos, que algunos consideran como una forma de irritabilidad simplemente, debida a causas puramente mecánicas, y otros los consideran como una verdadera manifestación de sensibilidad. Esta especie es muy común en todas las provincias, formando colchones de grandes extensiones en terrenos bajos y húmedos. Basta tocar ligeramente una parte de la planta para que toda ella cierre sus hojas inmediatamente, volviendo a abrirse al poco tiempo. El mismo efecto se consigue poniendo junto a ella una esponja empapada en éter o cloroformo. Es una planta rastrera, espinosa, de hojas compuestas con folíolos pequeños y flores rosadas en cabezuelas. Otras especies menos sensibles son: *Mimosa viva*. L.; *Aeschynomene sensitiva*, Sw., y *Aeschynomene viscidula*, Michx. Algunos dicen a aquélla Sensitiva, otros Vergonzosa, y en la provincia oriental MORIVIVI. V.

DORMIDERA CIMARRONA: Otro nombre de la *Aeschynomene americana* L. V. TAMARINDILLO.

DORMIDO: Al Sur de Baracoa, en Imías y Jaruco, llaman así al *Lysiloma bahamensis*, Benth. árbol silvestre de las Mimosáceas. También le dicen Sabcí. V. ABEY, FRIJOLILLO y TAMARINDILLO.

DORMILONA (Pezuela): V. DORMIDERA.

DRACENA (Armand): Nombre genérico castellanizado de varias plantas cultivadas como ornamentales por su follaje colorido. Pertenecen a la familia de las Liliáceas y a los géneros *Cordyline* y *Dracaena*. Los catálogos de jardinería mencionan las siguientes: *Dracaena fragrans* Ker-Gawl.; *Dracaena brasiliensis*, Schult., y *Dracaena Oteló* (*Cordyline terminalis*, Kth. var. Ti, Baker). V. DRAGO e ILANG-ILANG.

DRAGA: *Crudia antillana* Urb. Nombre anotado por Smith como aplicada a un árbol que crece cerca de la Bahía de Taco, en Moa, Oriente. Parece tratarse de esta especie de las *Cesalpínáceas*, que es un árbol grande con vainas y semillas redondas muy grandes también.

DRAGALE: "Árbol silvestre que se propaga de semilla y esqueje; su madera es ligera y algo porosa, color morado

muy claro y el corazón amarillo verdoso, y se puede aplicar a varios usos de la carpintería urbana".—Fernández. V.

AGALLA DE COSTA.

DRAGO: "Arbol silvestre poco elevado; florece en primavera; se propaga de semilla, en Isla de Pinos en las sierras y peñascos; también lo hay en Banes y Baja. Este es el que produce la goma o sangre de su nombre; a su madera no le conozco aplicación".—Fernández.

Esta información de Fernández es errónea: el Drago es un árbol característico de los mogotes y de las sierras calcáreas de la Cordillera de los Organos, desde Taco-Taco hasta Guane, en Pinar del Río. En la parte oriental y central de esta provincia le llaman Ceibón; el nombre de Drago lo emplean desde Consolación del Norte hasta Guane, que es donde más abunda. En las sierras de Viñales, de San Vicente y de Guane se ven millares de estos árboles creciendo en los paredones verticales de los mogotes, donde, junto con la Palma de Sierra (*Gaussia princeps*) y el Roble caimán (*Tabebuia calcicola*), constituyen casi la única vegetación arbórea. Se le distingue perfectamente por sus troncos lisos abultados y redondeados, completamente verdes, y con las ramas sólo en el extremo superior. En las hojas y en las flores se parece mucho a la Carolina (*Pachira insignis*). Muchas personas en esos distritos se dedicaban a derribar estos árboles que luego echaban en un arroyo o río y los despojaban de toda la corteza verde, cuya capa interna o liber suministra la majagua tan apreciada y fina que se utiliza para atar las ruedas de tabaco.

Esta especie es el *Bombax emarginatum*, A. Rich., de la familia de las Bombacáceas.

La especie que produce una resina roja, que se utilizaba antiguamente en Medicina con el nombre de Sangre de drago, también existe cultivada en Cuba, es el *Pterocarpus officinalis*, Jacq.), árbol de las Leguminosas originario de la América Central y del Sur. V. DRAGUE.

Además, Maza y Fernández llaman Drago a las diversas especies cultivadas de *Dracaena* y *Cordyline*, que llaman En Santiago de las Vegas y otros pueblos de la provincia de La Habana, Libertad y Palo de candela, con hojas lanceoladas, rojas, verdes y listadas. Las especie principales son: *Cordyline terminalis* Kth. que ofrece las variedades *cannaefolia*, Baker (*Dracaena cannaefolia*, Hort.) *Dracaena ferrea*, Baker (*Cordyline ferrea*, Planch.) y *Ti*, Baker (*Dracaena brasiliensis* Schult.) V. CORDILINA y DRACENA.

- DRAGO COLORADO RAYADO, DE EUROPA (Fernández): El *Cordyline terminalis*, Kth., de la familia de las Liliáceas. V. DRAGO.
- DRAGO DE ÁFRICA (Fernández): El *Cordyline fragrans*, Planch., Liliácea cultivada. V. DRAGO e ILANG-ILANG.
- DRAGO DE CANARIAS: *Dracaena Draco* Lin. Especie que se ha cultivado en Cuba como ornamental. Es un árbol originario de Canarias que alcanza una altura de 30 a 60 pies, ramificándose cuando tiene mucha edad. El Drago de la Isla de Tenerife en Canarias, famoso durante siglos, tenía unos 70 pies de alto, y era uno de los árboles más viejos del mundo. El nombre de Drago proviene de la creencia de que el jugo desecado se parece a la sangre del dragón.
- DRAGO DE HOJAS PURPÚREAS: (*Cordyline terminalis*, Kth.) V. DRAGO, LIBERTAD y PALO DE CANDELA.
- DRAGO DE JARDÍN (Morales): *Cordyline speciosa* L. V. DRAGO.
- DRAGO MORADO DE EUROPA (Fernández): V. DRAGO.
- DRAGO ROJO (Catálogo del Jardín Botánico del Instituto): Arbusto cultivado de las Liliáceas con hojas de color rojo (*Cordyline magnifica* Hort.) V. CORDILINA, DRAGO y LIBERTAD.
- DRAGO VERDE DE EUROPA (Fernández): El *Dracaena reflexa*, Lam., arbusto de las Liliáceas. V. DRAGO y PALO CANDELA.
- DRAGÓN (Hno. León): *Alpinia speciosa* (Wendl.) Schum. V. COLONIA.
- DRAGONAL (Maza): V. DURION.
- DRAGUE: *Pterocarpus officinalis* Jacq. "Árbol de gran tamaño, de la tribu de los *Lonchocarpus*. Vive junto a cañadas y ríos fangosos".
- Este mismo árbol fue colectado por Acuña en el camino del Yunque, cerca de Baracoa. Es un gran árbol de las *Papilionáceas*, con grandes hojas compuestas y frutos redondos, grandes y aplanados, alados en el margen. V. SANGRE DE DRAGO.
- DUBLÓN: Nombre empleado en Guantánamo para un arbusto de las *Gesneriaceas*, *Rhytidophyllum villosulum* (Urb.) Morton, que crece en los paredones de la sierra detrás de Ermita.
- DULCAMARA: *Solanum dulcamara* Lin. Fam. Solanáceas. Planta medicinal europea, cultivada en la Estación Experimental Agronómica con semillas recibidas de distintos países.

La planta es semitrepadora y se parece mucho a nuestro jazmín de Italia. Germina y crece bien en el país durante los meses de otoño e invierno; pero no soporta los calores del verano. Se usan los tallos y las raíz que son diuréticos, depurativos y diaforéticos.

DURAZNO DE MÉJICO: Nombre local de San Fernando de Camarones, Las Villas, para el *Diospyros discolor* Willd., árbol cultivado de las Ebenáceas. V. MABOLO.

DURION: (*Durio zibethimus* [Lin.], Murray), Arbol cultivado de la familia de las Bombacáceas. V. ERIZO DE ÁRBOL.