

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Vireo gundlachi</i> (CUVI) Lembeye, 1850. Juan Chivi	RP/A/LC Ab/E	Ballenato del Medio (74), Cruz (1), Ensenachos (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Santa María (26,27,3), Francés (27,3), Las Brujas (27,3), Guillermo (27,58,2), Coco (29,41,2,96,56,81), Lucas (45), Palma (45), Sabinal (62,75), Cinco Leguas (NR), Conuco (NR), Paredón Grande (70), Caguanes (97,45), Judas (99)
<i>Vireo flavifrons</i> (YTVI) Vieillot, 1808. Verdón de Pecho Amarillo	RI/M/LC Co	Aguada (45), Coco (2,56,81), Guajaba (33), Las Brujas (27), Santa María (37), Ají (45), Caguanes (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (86), Paredón Grande (94,51)
<i>Vireo gilvus</i> (WAVI) (Vieillot, 1808). Vireo Cantor	T/MR/LC Ra	Coco (81)
<i>Vireo philadelphicus</i> (PHVI) (Cassin, 1851). Vireo de Filadelfia	T/MR/LC Ra	Coco (96,81), Santa María (27,25,3), Conuco (NR)
<i>Vireo olivaceus</i> (REVI) (Linnaeus, 1766). Vireo de Ojo Rojo	T/MR/LC Pc	Coco (2,96,56), Guajaba (1), Santa María (37), Paredón Grande (94,51)
<i>Vireo altiloquus</i> (BWVI) (Vieillot, 1808). Bienteveo	RV-T/A/LC Co	Aguada (45), Guajaba (1), Las Brujas (3), Romano (4,1), Coco (4,2,56,81), Lanzasillo (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Ají (45), Caguanes (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Guillermo (58), Sabinal (62,75), Paredón Grande (70,51), Ballenato del Medio (74), Judas (99)
Familia Corvidae		
<i>Corvus nasicus</i> (CUCR) Temminck, 1826. Cao Montero	RP/MR/LC Pc	Guajaba (33,1), Romano (4,1,86), Sabinal (48,62), Guillermo (NR)
Familia Hirundinidae		
<i>Progne cryptoleuca</i> (CUMA) Baird, 1865. Golondrina Azul	RV/MR/LC Pc	Coco (41,2,56), Guajaba (1), Romano (1), Sabinal (62), Guillermo (67)
<i>Tachycineta bicolor</i> (TRES) (Vieillot, 1808). Golondrina de Árboles	RI/MR/LC Pc/InAe	Coco (2,56), Guajaba (1), Romano (1), Sabinal (62), Paredón Grande (68)
<i>Stelgidopteryx serripennis</i> (NRWS) (Audubon, 1838). Golondrina Parda	T-RI/MR/LC Ra	Coco (104), Paredón Grande (68)
<i>Petrochelidon fulva</i> (CASW) (Vieillot, 1807). Golondrina de Cuevas	RV-RI/M/LC Co	Aguada (45), Guajaba (1), Romano (4,1), Coco (4,2,56,104), Caguanes (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Paredón Grande (51), Sabinal (62), Ballenato del Medio (74)

CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Hirundo rustica</i> (BARS) Linnaeus, 1758. Golondrina Cola de Tijera	T/R/LC Pc	Caimán de la Mata de Coco (NR), Coco (2,56,104), Las Brujas (3), Francés (27), Santa María (27,2), Romano (54)
Familia Polioptilidae		
<i>Polioptila caerulea</i> (BGGN) (Linnaeus, 1766). Rabuita	RI/M/LC Pc	Aguada (45), Coco (2,56,81), Francés (3), Las Brujas (3), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Guillermo (58), Ballenato del Medio (74), Romano (86), Santa María (92), Caguanes (97,45)
<i>Polioptila lembeyei</i> (CUGN) (Gundlach, 1858). Sinsontillo	RP/R/LC Ab/E	Coco (29,4,77,41,2,81), Cruz (1), Mégano Grande (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Sabinal (62,75)
Familia Turdidae		
<i>Catharus fuscescens</i> (VEER) (Stephens, 1817). Tordo Colorado	T/MR/LC Ra	Coco (67), Santa María (37), Judas (99)
<i>Catharus minimus</i> (GCTH) (Lafresnaye, 1848) Tordo de Mejillas Grises	T/MR/LC Ra	Caimán del Faro (27), Santa María (37), Coco (81), Paredón Grande (94,51), Judas (99)
<i>Catharus ustulatus</i> (SWTH) (Nuttall, 1840) Tordo de Espalda Olivada	T/MR/LC Ra	Caimán del Faro (27), Santa María (37), Sabinal (62), Paredón Grande (94,51), Coco (1)
<i>Catharus guttatus</i> (HETH) (Pallas, 1811) Tordo de Cola Colorada	AC/MR/LC Ra	Coco (1)
<i>Hylocichla mustelina</i> (WOTH) (Gmelin, 1789). Tordo Pecosó	T/MR/LC Ra	Coco (84,104), Guajaba (1)
<i>Turdus plumbeus</i> (RLTH) Linnaeus, 1758. Zorzal Real	RP/A/LC Ab	Aguada (45), Guillermo (2,58), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,4,41,2,96,81), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Sabinal (62,75), Cinco Leguas (NR), Caguanes (97,45), Cruz (98), Judas (99)
Familia Mimidae		
<i>Dumetella carolinensis</i> (GRCA) (Linnaeus, 1766). Zorzal Gato	RI-T/A/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Guajaba (1), Romano (1,86), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Coco (2,56,81), Ensenachos (3), Santa María (3), Lanzanillo (27), Ají (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62), La Yana (NR), Ballenato del Medio (74), Caguanes (97,45), Judas (99)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Mimus polyglottos</i> (NOMO) (Linnaeus, 1758). Sinsonte	RP/MA/LC Ab	Aguada (45), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Santa María (26,27,3), Lanzanillo (27), Las Tocineras (27), Punta de Piedra (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Coco (29,4,41,81), Aji (45), Ajicito (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (48,62,75), Ballenato del Medio (74), Caguanes (97,45), Antón Grande (98), Cruz (98)
<i>Mimus gundlachi</i> (BAMO) Cabanis, 1855. Sinsonte Prieto	RP/M/LC Pc	Coco (29,4,41,2,81), Mégano Grande (1), Cruz (1,36,98), Guillermo (2,58,98), Paredón Grande (2,98,51), Las Brujas (3), Tío Pepe (24), Francés (27), Lanzanillo (27), Santa María (43,3)
Familia Bombycillidae		
<i>Bombycilla cedrorum</i> (CEDW) Vieillot, 1808. Picotero del Cedro	T-RI/MR/LC Pc	Coco (104), Guajaba (1)
Familia Parulidae		
<i>Vermivora cyanoptera</i> (BWWA) (Linnaeus, 1766). Bijirita de Alas Azules	RI-T/MR/LC Pc	Caguanes (97,45), Conuco (27), Sabinal (39), Santa María (92), Coco (102,56,70)
<i>Vermivora chrysoptera</i> (GWWA) (Linnaeus, 1766). Bijirita de Alas Doradas	T/MR/NT Ra	Romano (1)
<i>Oreothlypis peregrina</i> (TEWA) (Wilson, 1811). Bijirita de Tennessee	T/MR/LC Ra	Caimán del Faro (27), Guajaba (1), Coco (81,69)
<i>Oreothlypis celata</i> (OCWA) (Say, 1823). Bijirita de Coronilla Anaranjada	AC/MR/LC Ra	Coco (104,69), Santa María (37)
<i>Oreothlypis ruficapilla</i> (NAWA) (Wilson, 1811). Bijirita de Nashville	T/MR/LC Ra	Coco (105, 69), Paredón Grande (51)
<i>Setophaga ruticilla</i> (AMRE) (Linnaeus, 1758). Candelita	RI-T/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Paredón Grande (2,96,51), Las Brujas (3), Santa María (3), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Coco (29,41,2,96,104,81), Aji (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Guillermo (58), Romano (54,1,86), Sabinal (62,75), Las Picúas (NR), Ballenato del Medio (74), Ensenachos (92), Caguanes (97,45), Antón Grande (98), Judas (99)

CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Setophaga citrina</i> (HOWA) (Boddaert, 1783). Monjita	T-RI/R/LC Pc	Coco (96,104,81), Sabinal (39), Santa María (37), Salinas (45), Las Picúas (NR), Paredón Grande (94,51)
<i>Setophaga americana</i> (NOPA) (Linnaeus, 1758). Bijirita Chica	RI-T/M/LC Co	Aguada (45), Cruz (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Francés (3), Las Brujas (3), Santa María (3), Guajaba (33,1), Caimán del Faro (27), Coco (29,41,2,96,81), Fábrica (45), Lucas (45), Romano (54,1,86), Sabinal (62,75), Ballenato del Medio (74), Caguanes (97,45)
<i>Setophaga petechia</i> (YWAR) (Linnaeus, 1766). Canario de Manglar	RP-T/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,1), Sevilla (7), Pájaro (5), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,4,41,2,96,81,98), Ají (45), Ajicito (45), Caguanes (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Judas (NR), Ballenato del Medio (74), Fragoso (76), Antón Grande (98)
<i>Setophaga pensylvanica</i> (CSWA) (Linnaeus, 1766). Bijirita de Costados Castaños	T/MR/LC Ra	Coco (69), Santa María (37), Paredón Grande (94,51)
<i>Setophaga magnolia</i> (MAWA) (Wilson, 1811). Bijirita Magnolia	RI-T/M/LC Pc	Ballenato del Medio (74), Guajaba (1), Guillermo (2), Paredón Grande (2,96,51), Coco (29,41,2,96,81), Santa María (37), Caguanes (45), Fábrica (45), Lucas (45), Sabinal (62), Las Brujas (92), Romano (91)
<i>Setophaga tigrina</i> (CMWA) (Gmelin, 1789). Bijirita Atigrada	RI-T/M/LC Ab	Caguanes (45), Cruz (1), Romano (1,86), Guillermo (2,58), Las Brujas (3), Santa María (3), Guajaba (33,1), Tío Pepe (27), Coco (29,41,2,96,81), Salinas (45), Sabinal (62,75), Las Picúas (NR), Paredón Grande (94,51)
<i>Setophaga caerulescens</i> (BTBW) (Gmelin, 1789). Bijirita Azul de Garganta Negra	RI-T/A/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Guillermo (2), Guajaba (33,1), Tío Pepe (27), Coco (29,41,2,96,81), Santa María (37), Ají (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,86), Sabinal (62,75), Francés (NR), Las Picúas (NR), Ballenato del Medio (74), Las Brujas (92), Caguanes (97,45), Paredón Grande (94,51), Judas (99)
<i>Setophaga coronata</i> (MYWA) (Linnaeus, 1766). Bijirita Coronada	RI-T/R/LC Pc	Coco (2,56,104), Guajaba (1), Romano (1), Santa María (27,2), Las Picúas (NR), Paredón Grande (70,51), Guillermo (104,70)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Setophaga nigrescens</i> (BTYW) (Townsend, 1837). Bijirita Gris de Garganta Negra	AC/MR/LC Ra	Coco (104)
<i>Setophaga virens</i> (BTNW) (Gmelin, 1789). Bijirita de Garganta Negra	RI-T/R/LC Co	Coco (2,56,81), Francés (27,3), Sabinal (39), Paredón Grande (68), Romano (86), Santa María (92)
<i>Setophaga fusca</i> (BLBW) (Müller, 1776). Bijirita Blackburniana	T/MR/LC Ra	Coco (29,41,2,81), Romano (1), Santa María (37), Las Brujas (92)
<i>Setophaga dominica</i> (YTWA) (Linnaeus, 1766). Bijirita de Garganta Amarilla	RI-T/M/LC Co	Ballenato del Medio (74), Cruz (1), Guajaba (1), Mégano Grande (1), Romano (1,86), Guillermo (2,58), Coco (82,96,56,81), Santa María (3), Lanzanillo (27), Paredón Grande (51), Sabinal (62), Conuco (NR), Las Picúas (NR), Ensenachos (92), Las Brujas (92)
<i>Setophaga pinus</i> (PIWA) (Linnaeus, 1766). Bijirita de Pinos	T/MR/LC Ra	Romano (91)
<i>Setophaga kirtlandii</i> (KIWA) (Baird, 1852). Bijirita de Kirtland	AC/MR/NT Ra	Coco (67)
<i>Setophaga discolor</i> (PRAW) (Vieillot, 1809). Mariposa Galana	RI-T/A/LC Co	Antón Grande (98), Guajaba (1), Guillermo (2), Paredón Grande (2,96,51), Coco (82,96,56,81), Santa María (3), Tío Pepe (27), Palma (45), Romano (54,1,86), Sabinal (62,75), Judas (NR), Las Picúas (NR), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Caguanes (97,45), Cruz (98), Mégano Grande (98)
<i>Setophaga palmarum</i> (WPWA) (Gmelin, 1789). Bijirita Común	RI-T/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Mégano Grande (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Santa María (3), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Coco (29,41,2,96,81), Aji (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1,86), Sabinal (62,75), Judas (NR), Las Picúas (NR), Ballenato del Medio (74), Caguanes (97,45), Antón Grande (98)
<i>Setophaga castanea</i> (BBWA) (Wilson, 1810). Bijirita Castaña	T/MR/LC Ra	Ensenachos (3), Francés (3), Las Brujas (3), Santa María (27,2), Paredón Grande (96)
<i>Setophaga striata</i> (BLPW) (Forster, 1772). Bijirita de Cabeza Negra	T/R/LC Pc	Ballenato del Medio (74), Guajaba (1), Mégano Grande (1), Romano (1), Coco (2,56,96,104), Tío Pepe (27), Santa María (37), Las Brujas (92), Paredón Grande (94,51)
<i>Setophaga cerulea</i> (CERW) (Wilson, 1810). Bijirita Azulosa	T/MR/VU Ra	Sabinal (62)

CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Mniotilta varia</i> (BAWW) (Linnaeus, 1766). Bijirita Trepadora	RI-T/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Guajaba (33,1), Francés (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,41), Aji (45), Ajicito (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1,86), Sabinal (62,75), Las Picúas (NR), Ballenato del Medio (74), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Caguanes (97,45), Antón Grande (98), Judas (99)
<i>Protonotaria citrea</i> (PROW) (Boddaert, 1783). Bijirita Protonotaria	T/MR/LC Pc	Coco (81), Guajaba (1), Romano (1), Paredón Grande (51), Santa María (NR)
<i>Helmitheros vermivorum</i> (WEWA) (Gmelin, 1789). Bijirita Gusanera	RI-T/R/LC Co/	Caimán del Faro (27), Guillermo (2), Coco (82,96,56,81), Santa María (3), Sabinal (39), Caguanes (45), Romano (86), Las Brujas (92), Paredón Grande (96)
<i>Limnothlypis swainsonii</i> (SWWA) (Audubon, 1834). Bijirita de Swainson	RI-T/MR/LC Pc	Caguanes (45), Sabinal (39), Santa María (37), Coco (104,81), Romano (91)
<i>Seiurus aurocapilla</i> (OVEN) (Linnaeus, 1766). Señorita de Monte	RI-T/A/LC Ab	Aguada (45), Guajaba (1), Guillermo (2), Caimán del Faro (27), Coco (29,41,2,96,81), Santa María (37), Aji (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Ballenato del Medio (74), Romano (86), Ensenachos (92), Las Brujas (92), Caguanes (97,45), Paredón Grande (94,51), Cruz (98), Judas (99)
<i>Parkesia noveboracensis</i> (NOWA) (Gmelin, 1789). Señorita de Manglar	RI-T/A/LC Ab	Antón Grande (98), Cruz (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Las Brujas (3), Guajaba (33,1), Tío Pepe (27), Santa María (27,2), Coco (29,41,2,96,81), Caguanes (45), Salinas (45), Romano (54,1,86), Sabinal (62,75), Judas (NR), Ballenato del Medio (74), Ensenachos (92), Mégano Grande (98)
<i>Parkesia motacilla</i> (LOWA) (Vieillot, 1809). Señorita de Río	RI-T/MR/LC Pc	Coco (2,56,104), Las Brujas (3), Romano (91)
<i>Geothlypis formosa</i> (KEWA) (Wilson, 1811). Bijirita de Kentucky	T-RI/MR/LC Ra	Coco (96,104), Las Brujas (27)
<i>Geothlypis Philadelphia</i> (MOWA) (Wilson, 1810). Bijirita de Cabeza Gris	AC/MR/LC Ra	Coco (70)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Geothlypis trichas</i> (COYE) (Linnaeus, 1766). Caretica	RI-T/MA/LC Co	Aguada (45), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Coco (82,96,56,81), Ensenachos (3), Santa María (3), Guajaba (33,1), Lanzanillo (27), Tío Pepe (27), Sabinal (39,75), Ají (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Romano (54,1), Caimán de Bella (NR), Las Picúas (NR), Las Brujas (92), Caguanes (97,45), Antón Grande (98), Cruz (98), Judas (99)
<i>Teretistris fernandinae</i> (YHWA) (Lembeye, 1850). Chillina	RP/MR/LC Ra/G	Cinco Leguas (NR ASC)
<i>Teretistris fornsi</i> (ORWA) Gundlach, 1858. Pechero	RP/R/LC Ab/G	Coco (4,2,56,96,81), Cruz (1), Mégano Grande (1), Paredón Grande (2,96,51), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Sabinal (62,75), Judas (99)
<i>Cardellina pusilla</i> (WIWA) (Wilson, 1811). Bijirita de Wilson	T/MR/LC Pc	Santa María (27), Coco (70)
<i>Cardellina canadensis</i> (CAWA) (Linnaeus, 1766). Bijirita del Canadá	T/MR/LC Ra	Caimán del Faro (NR), Coco (69,70)
<i>Icteria virens</i> (YBCH) (Linnaeus, 1758). Bijirita Grande	T/MR/LC Ra	Coco (29,2,104), Paredón Grande (104,51,69)
<i>Coereba flaveola</i> (BANA) (Linnaeus, 1758). Reinita	RI/R/LC Pc	Coco (104,81), Tío Pepe (24,27), Sabinal (62), Cruz (98), Guillermo (104), Paredón Grande (104,98,68)
Familia Thraupidae		
<i>Spindalis zena</i> (SHTA) (Linnaeus, 1766). Cabrero	RP/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Guillermo (2), Paredón Grande (2,96,51), Ensenachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,1,86), Coco (4,2,56,96,81), Guajaba (33,1), Santa María (26,27,3), Lanzanillo (27), Francés (27,3), Ají (45), Ajicito (45), Cueva (45), Ermita (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Cinco Leguas (NR), Esquivel del Norte (NR), Piedra del Obispo (NR), Ballenato del Medio (74), Caguanes (97,45), Judas (99)
<i>Cyanerpes cyaneus</i> (RLHO) (Linnaeus, 1766). Aparecido de San Diego	RP/MR/LC Pc	Caguanes (45), Coco (104)
Familia Emberizidae		
<i>Melopyrrha nigra</i> (CUBU) (Linnaeus, 1758). Negrito	RP/MA/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,96,51), Ensenachos (3), Romano (4,1,86), Guajaba (33,1), Francés (27,3), Las Brujas (27,3), Santa María (27,3), Coco (29,4,41,2,81), Ají (45), Ajicito (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Ballenato del Medio (74), Caguanes (97,45), Judas (99)

CAPÍTULO 3. VERTEBRADOS

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Tiaris canorus</i> (CUGR) (Gmelin, 1789). Tomeguín del Pinar	RP/MR/LC Pc/E	Romano (4), Sabinal (62)
<i>Tiaris olivaceus</i> (YFGR) (Linnaeus, 1766) Tomeguín de la Tierra	RP/A/LC Ab	Aguada (45), Cruz (1), Guillermo (2,58), Enseñachos (3), Las Brujas (3), Romano (4,86), Guajaba (33), Santa María (26,27,3), Lanzanillo (27), Francés (27,3), Coco (29,4,41,2,56,81), Aji (45), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Caguanes (97,45), Paredón Grande (94,51)
<i>Tiaris bicolor</i> (BFGR) (Linnaeus, 1766). Tomeguín Prieto	RP/MR/LC Pc	Ballenato del Medio (74), Tío Pepe (24), Coco (29,41,2,104), Paredón Grande (68), Guillermo (104)
<i>Torreornis inexpectata</i> (ZASP) Barbour y Peters, 1927. Cabrerito de Ciénaga	RP/MR/EN Co/G,S	Coco (29,77,4,41,2,81), Romano (66)
<i>Spizella passerina</i> (CHSP) (Bechstein, 1798). Gorrión de Cabeza Carmelita	AC/MR/LC Ra	Guillermo (104)
<i>Spizella pallida</i> (CCSP) (Swainson, 1832). Gorrión Colorado	T-RI/MR/LC Ra	Caimán del Faro (27), Guajaba (1), Santa María (27,2)
<i>Chondestes grammacus</i> (LASP) (Say, 1823). Gorrión de Uñas Largas	AC/MR/LC Ra	Paredón Grande (68)
<i>Passerculus sandwichensis</i> (SAVS) (Gmelin, 1789). Gorrión de Sabana	RI-T/MR/LC Ra	Coco (77,2,104), Santa María (27,2), Guillermo (107), Paredón Grande (51,68)
<i>Ammodramus savannarum</i> (GRSP) (Gmelin, 1789). Chamberguito	T-RI/MR/LC Pc	Coco (81), Santa María (3), Paredón Grande (51), Guillermo (107)
<i>Melospiza lincolni</i> (LISP) (Audubon, 1834). Gorrión de Lincoln	T-RI/MR/LC Pc	Caimán del Faro (27), Santa María (27)
<i>Zonotrichia leucophrys</i> (WCSP) (Forster, 1772). Gorrión de Coronilla Blanca	T-RI/MR/LC Ra	Paredón Grande (51)
Familia Cardinalidae		
<i>Piranga rubra</i> (SUTA) (Linnaeus, 1758). Cardenal Rojo	RI-T/MR/LC Pc	Caguanes (45), Romano (1), Las Brujas (3), Sabinal (5), Paredón Grande (68)
<i>Piranga olivacea</i> (SCTA) (Gmelin, 1789). Cardenal de Alas Negras	T/R/LC Pc	Caimán del Faro (27), Guajaba (1), Coco (2,56), Las Brujas (27), Guillermo (27,2), Santa María (37), Paredón Grande (94,51)

Anexo 3.3.1. Continuación...

ORDEN/Familia/Especie/ Nombre común	Categoría permanencia/ Categoría distribución/ Categoría amenaza/ Abundancia/ Endemismo	Distribución (Referencia)
<i>Pheucticus ludovicianus</i> (RBGR) (Linnaeus, 1766). Degollado	T-RI/R/LC Pc	Caimán del Faro (27), Guajaba (1), Romano (1), Coco (2,102,56,104), Santa María (25), Cagua- nes (45), Paredón Grande (51), Sabinal (62)
<i>Passerina caerulea</i> (BLGR) (Linnaeus, 1758). Azulejón	T-RI/R/LC Pc	Coco (2,56,98), Guajaba (1), Romano (1), Santa María (25), Francés (27,3), Sabinal (62), Gui- llermo (67), Paredón Grande (70,51), Las Brujas (92)
<i>Passerina cyanea</i> (INBU) (Linnaeus, 1766). Azulejo	RI-T/M/LC Co	Coco (2,96,102,56,104,81), Romano (1), Gui- llermo (2), Ensenachos (3), Francés (3), Guajaba (33), Santa María (27,2), Cruz (36), Lucas (45), Paredón Grande (51), Sabinal (62,75), La Yana (NR)
<i>Passerina ciris</i> (PABU) (Linnaeus, 1758). Mariposa	T-RI/M/NT Pc	Coco (102,104,81), Guajaba (1), Romano (1), Guillermo (2), Paredón Grande (2,96,51), Ense- nachos (3), Santa María (27,2), Lucas (45), Sabinal (62), La Yana (NR)
Familia Icteridae		
<i>Dolichonyx oryzivorus</i> (BOBO) (Linnaeus, 1758). Chambergo	T/R/LC Pc	Coco (2,56), Lanzanillo (27), Santa María (27,2), Sabinal (62), Guillermo (67), Paredón Grande (70,51), Las Brujas (92), Romano (91)
<i>Agelaius humeralis</i> (TSBL) (Vigors, 1827). Mayito	RP/R/LC Pc	Caguanes (45), Cruz (1), Guajaba (1), Romano (1), Coco (29,30,41,2), Palma (45), Sabinal (62)
<i>Sturnella magna</i> (EAME) (Linnaeus, 1758). Sabanero	RP/MR/LC Pc	Coco (29,41,2,56), Guajaba (1), Sabinal (62), Judas (NR) , Romano (NR)
<i>Dives atroviolaceus</i> (CUBL) (D'Orbigny, 1839). Totí	RP/R/LC Pc/E	Aguada (45), Ají (45), Lucas (45), Obispo (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Caguanes (97,45)
<i>Quiscalus niger</i> (GAGR) (Boddaert, 1783). Chichinguaco	RP/MA/LC Ab	Aguada (45), Mégano Grande (1), Cruz (1,36), Guillermo (2,58), Paredón Grande (2,51), Ense- nachos (3), Romano (4,1,86), Sevilla (7), Guajaba (33,1), Las Brujas (27,2), Santa María (27,2), Coco (29,4,41,2,81), Cueva (45), Fábrica (45), Lucas (45), Palma (45), Salinas (45), Sabinal (62,75), Cinco Leguas (NR) , Francés (3), La Yana (NR) , Las Picúas (NR) , Caguanes (97,45), Caimán de Barlovento (NR)
<i>Molothrus bonariensis</i> (SHCO) (Gmelin, 1789). Pájaro Vaquero	RP/MR/LC Pc	Caguanes (45), Coco (2,56,70), Sabinal (62)
<i>Icterus melanopsis</i> (CUOR) (Wagler, 1829). Solibio	RP/R/LC Co/E	Ballenato del Medio (74), Romano (1,86), Coco (4,2,96,81), Guajaba (33,1), Cruz (36), Guillermo (58), Sabinal (62,75), Paredón Grande (70,51), Caguanes (97,45)