

O

OCÚ: En Puerto Padre, Oriente, llaman así al ocujé. V.

OCUJE: Arbol indígena, de la familia de las Clusiáceas, el *Calophyllum antillanum*, Britton (*C. calabo*, Jacq.) Existe en toda la Isla y es abundante en las tierras bajas y orillas de las ciénagas, donde a veces forma colonias llamadas ocujales. Es una de las pocas plantas que tienen un solo nombre vulgar en toda la Isla. Alcanza gran altura y tiene el tronco recto y la corteza vieja con profundas y anchas hendiduras. Hojas opuestas, elípticas, de 7 a 15 cm. de largo, lampiñas, coriáceas, redondeadas o ligeramente marginadas en el ápice, brillantes; las venas laterales muy numerosas y aproximadas; flores polígamas en racimos muchos más cortos que las hojas, de pocas flores; sépalos 2 a 4; pétalos 4 (-2), imbricados, blancos, olorosos; estambres ∞ (-definidos); anteras oblongas, introrsas; ovario 1 (-2)-locular, estriado longitudinalmente, más largo que el estilo; óvulos solitarios, erectos; estilo distinto; estigma peltado, lobado; pericarpio drupáceo; embrión ovoide; cotiledones coherentes.

Este árbol es uno de los más valiosos de Cuba; su madera de color rojo es muy sólida y resistente, algo parecida al cedro. Se la emplea en muebles, soleras, llaves, construcciones navales, horcones, pértigos de carretas y traviesas de ferrocarril. El árbol por su belleza, por sus hojas firmes y brillantes y por su raíz profunda, resulta uno de los más apropiados para avenidas, parques y carreteras; sólo que su crecimiento es algo lento al principio. El fruto lo comen los cerdos y la resina del tronco se emplea como remedio en las hernias incipientes.

OCUJE BLANCO: Variedad del Ocuje de color pálido. V. ocujé.

OCUJE COLORADO: En Monte Centeno, Moa, llaman de ese modo al ocujé de color intenso y gran densidad, que

es propio de aquellos terrenos áridos y secos. Es sólo una variedad del *Calophyllum antillarum* Britton. V. OCUJE.

OCUJE DE COSTA: *Elaeodendrum attenuatum* A. Rich. Nombre inapropiado empleado en la zona de Moa, Oriente, para este árbol que tiene otros nombres vulgares. V. PIÑIPINI y ROÑOSO.

OCUJE HEMBRA: "Árbol silvestre, que florece en las mismas épocas y se eleva como el anterior o más; su madera es blanca, dura, compacta, flexible y correosa y se aplica como el anterior y en particular para arboladuras de buque y para ese efecto es muy solicitada". (Fernández).

No conocemos más que una especie de ocuje. Este debe ser sólo una variedad del anterior.

OCUJE MACHO (Fernández): V. OCUJE.

OFÓN: "El Sr. Fernández y Jiménez trae un árbol exótico, originario del Africa, donde es conocido de los congos por ofón, aclimatado aquí; se eleva 14 varas, 5½ pies de circunferencia; sus brazos desparramados, gruesos, hojas oblongas sobre-redondas en la parte superior, aterciopeladas por debajo. Florece dos veces al año y entonces echa espigas parecidas a las de las verbenas, a cuya familia pertenece; el fruto como ciruela loca, achocolatado cuando maduro y comestible, agridulce, mejor que nuestra ciruela; flores pequeñas, blanco-amarillosas". (Pichardo).

En la finca El Retiro, que perteneció a Don José Blain, botánico aficionado, situado al pie de la Sierra Rangel en Taco-Taco, Pinar del Río, existen ejemplares de este árbol que fructifican abundantemente y sus frutos son como los describe Pichardo. Es el *Vitex Doniana* Sweet, de la familia de las Verbenáceas.

OFÓN CRIOLLO: Según Sauvalle es el *Vitex divaricata*, Sw., árbol silvestre de las Verbenáceas. V. ROBLE DE OLOR, ROBLE GUAYO y ROBLE GÜIRO.

OÍDO DE SORDO: En Taco-Taco, Pinar del Río, le dicen así a un arbustito ornamental cultivado, *Thumbergia erecta*, T. Anders, de la familia de las Acantháceas, cuyas flores en forma de campanilla de color lila, tienen la garganta amarilla. V. MAINERETA, MEYENA y TUMBERGIA.

OJANCHA: "Árbol silvestre, su buena madera, color castaño claro, es dura, compacta, de buen peso, grano regular; se puede emplear en la carpintería rural. Hay muestras de esta madera en el Museo de los RR. PP. Jesuítas". (Fernández).

Este nombre vulgar, corrupción de *hoja ancha*, es muy empleado en Baracoa, Mayarí y otros lugares de Oriente para designar a un árbol común en las montañas de toda

la Isla, el *Ocotea leucoxydon* (Sw.), G. de la Maza, de la familia de las Lauráceas. V. AGUACATHILLO, BONIATO y JUDÍO.

OJO DE BORRICO (Pichardo): V. JAIREL, OJO DE BUEY.

OJO DE BUEY: *Mucuna urens* (L.), D. C. Enredadera vigorosa de la familia de las Papilionáceas, común en los bosques húmedos. Alcanza 10 m. o más de longitud y es lampiña, con los peciolos del largo de los foliolos o más cortos; foliolos 3, delgados, lampiños en ambas caras, oblongos o elíptico-lanceolados, de 8 a 16 cm. de longitud, abruptamente acuminados; inflorescencia colgante, pedúnculo delgado, hasta de 1.5 m. de largo, con una o varias flores en el extremo; pedicelos de 2 cm. de largo o menos, esgrados en el fruto; cáliz como de 1.5 cm. de largo; estandante purpúreo-azuloso, de 3 a 4 cm. de largo; alas con larga uña, purpúreas; quilla amarillenta, un poco más larga que las alas; legumbre leñosa de 8 a 20 cm. de largo, como 5 cm. de ancho, hispida con pelos urticantes y finamente pubescentes, casi lampiña cuando vieja; semillas comprimido-globosas, de tres o cuatro cm. de diámetro.

En la Ciénaga de Zapata llaman a esta planta jairey, y en Camagüey ojo de caballo y ojo de borrico. El cocimiento de los tallos o bejucos de esta planta constituye un poderoso diurético muy empleado en el campo.

Fernández habla de un ojo de buey, árbol silvestre de regular altura, tronco recto y delgado, de madera blanco-amarillosa, con el corazón prieto. Nosotros no conocemos este árbol.

OJO DE BUEY DE COSTA (Sauvalle): Planta trepadora de las Papilionáceas, *Dioclea reflexa*, Hook f. (*Canavalia reflexa*, Hook f.).

OJO DE CABALLO: V. OJO DE BUEY.

OJO DE CANGREJO (Sauvalle): Árbol silvestre de la familia de las Mimosáceas, común en los pinares y en sabanas arenosas y tierras bajas. Es el *Pithecellobium obovale* (A. Rich.) C. Wright., cuyas semillas parecen ojos de cangrejo. V. ABEY, ABEY BLANCO, ARGELINO, AZUL DE SABANA, AZULITO, ENCINILLO y HUMO DE SABANA.

OJO DE COCUYO (Grisebach): V. COCUYO DE FRUTO CHICO.

OJO DE PERDIZ: V. ESPINO DE SABANA y GRANADILLO.

OJO DE POETA: "Enredadera que produce la flor amarillosa o color de mamoncillo con un disco morado oscuro en el centro, que llaman otros anteojos de poeta. El doctor Gundlach dice que la hay de color blanco con aquel centro". (Pichardo).

- Es el *Thumbergia alata*, Bojer, de la familia de las *Acantháceas*. V. ANTEOJO DE POETA.
- OJO DE RATÓN: *Rivina humilis*, Lin. Hierba silvestre de la familia de las *Fitolacáceas*. V. CORALITOS.
- OLACUAJONILT (Maza): V. OLI.
- OLEO-RESINA DE COPAIVA (Maza): V. BÁLSAMO DE COPAIVA.
- OLÍ (Maza): V. CAUCHO, GOMA ELÁSTICA Y HULE.
- OLIVO: *Olca europea* Lin. Este valioso árbol del Viejo Mundo se cultiva en Cuba, pero solamente como una curiosidad, pues aunque florece nunca llega a cuajar los frutos. En algunos lugares llaman olivo al *Capparis ferruginea* Lin. (*C. grisebachii* Eich.), arbusto de la familia de las *Caparidáceas* cuyos frutos parecen aceitunas. V. ALCAPARRO.
- En La Yaya, Puerto Padre, llaman *Olivo* al *Elaeodendron attenuatum* A. Rich., *arbolito* de las *Celastráceas* que tienen otros muchos nombres vulgares. V. PIÑIPIÑI.
- OLIVO BASTARDO: *Bontia daphnoides*, Lin. Arbusto o árbol de la familia de las *Mioporáceas* que crece en las costas bajas entre mangles y yanás. Alcanza hasta 9 m. de altura y es lampiño, con ramillas delgadas y cilíndricas. Las hojas son oblongas u oblongo-lanceoladas, que caen fácilmente de las ramas al secarse; de 10 cm. de longitud o menos, acuminadas en la base, el nervio medio prominente, las venas laterales poco destacadas los pecíolos de 1 a 2 cm. de largo, pedúnculos delgados de 1 a 3 cm. de longitud; segmentos del cáliz anchamente ovales, con la punta aleznada; corola como de 2 cm. de longitud, amarilla, matizada de purpúreo o el labio blanco interiormente; drupa puntiaguda, amarilla, de 1 a 1.5 cm. de longitud.
- Las hojas y frutos de esta planta tienen un olor aromático y en San Luis, Pinar del Río, dicen que es el cativo mangle, del que se extrae el bálsamo de su nombre. V. CATIVO MANGLE.
- OLIVO DE SABANA (Curbelo): En Puerto Padre, Oriente, aplican ese nombre al *Byrsonima cuneata* (Turcz.) P. Wilson, árbol de las *Malpighiáceas*, que es más conocido como CARNE DE DONCELLA. V.
- OLOROSA DE SAN PEDRO: Nombre empleado en la zona de Santiago de las Vegas para designar a uno de los guairajes, el más común, *Eugenia axillaris* (Sw.) Willd., cuyas hojas las usan en cocimiento para el catarro. V. GUAIRAJE.
- OMBLIGO DE VENUS (Maza) V. QUITASOLILLO.
- OMBÚ: *Phytolacca dioica* Lin. Árbol de la familia de las *Fitolacáceas*, introducido por la Estación Agronómica me-

diante semillas recibidas de Buenos Aires, en Octubre de 1955.

El árbol alcanza gran grosor del tronco y extensión la copa. Las hojas de peciolo delgado son lampiñas, elípticas o aovadas, mayormente agudas en el ápice y con el nervio medio extendido hasta la punta. La inflorescencia es en racimos que apenas sobrepasan las hojas, casi siempre colgantes; las flores masculinas tienen de 20 a 30 estambres y las piezas del cáliz son elípticas y obtusas, matizadas de blanco; las flores femeninas con unos 10 estaminoidios y las piezas del caliz más anchas; el ovario es globoso y con 7 a 10 carpelos; fruto abayado. Esta planta es nativa de Suramérica y en la Argentina la tienen en gran estima probablemente por ser una de las pocas especies que se utilizan para sombra en las pampas.

En Cuba se da muy bien y crece muy rápidamente dando mucha sombra. Su madera es floja y mala y no sabemos que la planta tenga otra aplicación.

ONATE (Maza): V. YERBA ACOLCHADA.

ONOTO (Maza): V. BIJA O ACHIOTE.

OREGANILLO: *Weimmannia pinnata* L., arbusto de la familia de las Cunoniáceas, que crece en lo alto de la Sierra Maestra. Tiene propiedades medicinales.

OREGANITO: En Jarahuca Arriba, Oriente, dan este nombre, según el Ing. Acuña, a una especie de *Lippia* de las Verbenáceas.

ORÉGANO (Pichardo): El *Hyptis americana* (Aubl), Urb. (*H. gonocephala*, Gris.), de la familia de las Labiadas, hierba silvestre, con tallos espinosos, hojas lanceoladas, aserradas y flores blancas o azules en densas espigas terminales. Esta especie no tiene que ver con el orégano europeo. Es medicinal.

Origanum vulgare Lin. Familia Labiadas. El verdadero orégano de Europa ha sido cultivado en la Estación Experimental Agronómica desde 1953, pero no había llegado a florecer hasta 1960. La planta es muy parecida a la mejorana y se multiplica bien de estacas, pudiendo durar en campo abierto hasta dos años a pesar de las lluvias, y el calor del verano.

ORÉGANO CIMARRÓN: Nombre de varias Labiadas, del género *Hyptis*, y más particularmente del *H. suaveolens* (L.), Poit., que es una hierba muy abundante en todos los terrenos fértiles, principalmente en los rojos y en los arenosos. Es erecta de 3 a 8 dm. de altura, peluda, con hojas

pediceladas, ovas y las inferiores acorazonadas, duplicado-aserradas o subsinuosas; las flores diminutas, cerdosas; flores en cimas contraídas de cabezuelas paucifloras, cortamente pedunculadas o subsesiles; cáliz subsésil o muy cortamente pedicelado, con diez costillas; dientes aleznados, al fin más cortos que el tubo, rígidos, corola azul pálido. Se emplea como medicinal y el ganado come sus hojas cuando escasean los otros pastos. En la provincia de Matanzas le dicen sargazo y en la de Las Villas, Sandoval.

En los Remates de Guane llaman orégano cimarrón impropriadamente al *Lantana reticulata*, Sw., arbusto silvestre de las Verbenáceas que en otros lugares se llama FILIGRANA. V.

ORÉGANO DE CARTAGENA (Maza): V. ORÉGANO FRANCÉS.

ORÉGANO DE PLAYA: *Croton linearis* Jacq. Nombre comunicado por el Sr. Luis C. Scaramuza como empleado en la playa de Varadero, Cárdenas. V. ROMERO DE COSTA.

ORÉGANO FRANCÉS: *Coleus amboinicus*, Lour. Planta nativa del Asia sudoriental, cultivada en los jardines por sus hojas aromáticas, usadas como condimento. También le dicen orégano de Cartagena y Orégano de España. Pertenece a la familia de las Labiadas y es un arbusto ramoso, como de un metro de alto, algo carnoso, tomentoso-peludo y fragante. Las hojas son anchamente ovado-deltoides, crenadas, de 4-10 cm. de largo, peludo-tomentosas en ambas caras, el ápice agudo u obtuso, la base subtruncada o subcordada, decurrente en el peciolo rígido; verticilos de flores formando racimos alargados interrumpidos, de 13 cm de largo; tubo de la corola como de doble longitud, su labio inferior poco más o menos del mismo largo del tubo. Toda la planta tiene un olor muy penetrante a orégano y se la emplea como condimento para sazonar el potaje de frijoles negros, y en remedios caseros.

OREJA DE BURRO: En El Junco, montañas de Trinidad, aplican este nombre al *Ocotea leucoxydon* (Sw.) Mez., árbol de las Lauráceas. V. OJANCHA.

OREJA DE ELEFANTE: *Coccoloba pubescens* L. (*C. grandifolia* Jacq.) árbol de la familia de las Poligonáceas, escasamente cultivado en Cuba. Es una especie de Uva caleta, pero de hojas enormes hasta de 2 pies de diámetro, orbiculares, que abrazan al tallo como un escudo, pubescentes debajo. El árbol alcanza hasta 80 pies de altura; sus flores son verdosas, en racimos solitarios, erectos. Es nativo de las Antillas y de la Guayana británica.

También llaman Oreja de elefante a un helecho de la

familia de las Polipodiáceas, *Hymenodium crinitum* Fel., que crece en las grandes alturas de la Sierra Maestra y en la Loma del Gato, Oriente. Sus hojas son simples, grandes y velludas.

OREJA DE GATO: Nombre que aplican en Viñales, Pinar del Río, al *Peperomia verticillata* (L. Dietr. (*Peperomia roigana* Trel.), planta carnosa de la familia de las Piperáceas, que constituye una especie nueva para la ciencia; colectada por el que esto escribe en los mogotes de aquella localidad. Tiene las hojas verticiladas, pequeñas, que recuerdan en la forma la oreja de un gato.

OREJA DE JUDÍO: *Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.), Gris. Gran árbol de la familia de las Mimosáceas, uno de los más empleados para el arbolado de nuestras carreteras. Es originario de Jamaica y de la América tropical continental y crece hasta 20 m. de altura o más; sus grandes hojas bipennadas, lampiñas tiene muchos foliolos oblongo-lineales, glaucos por debajo, de 8 a 13 mm. de largo; las pequeñas flores están dispuestas en cabezuelas axilares pedunculadas; la corola como de 5 mm. de largo; el fruto es una gran vaina o legumbre aplastada, encorvada generalmente formando un círculo completo, de 8 a 10 cm. de ancho.

Sobre otras aplicaciones de este árbol ha publicado el Sr. Teodoro Cabrera, un interesante trabajo en la Revista de Agricultura, Comercio y Trabajo.

OREJA DE LA MADERA (Maza): V. OREJA DE PALO.

OREJA DE NEGRO: *Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Gris. V. ÁRBOL DE LAS OREJAS, OREJA DE JUDÍO y OREJÓN.

OREJA DE OSO (Maza): Planta cultivada de la familia de las Primuláceas, *Primula auricula*, Lin. V. AURÍCULA y MOTEZUMA.

OREJA DE PALO: Nombre que dan a varios hongos que viven sobre troncos de árboles muertos o en vías de descomposición y sobre los postes de cercas y del teléfono y telégrafo. En su mayoría pertenecen a la familia de las Poliporáceas y su aparato reproductor, aéreo, simula el pabellón de una oreja. Algunas especies son: *Coriolus maximus* (Mont.), Murrill, *Coriolus merbranaceus* (Sw.), Pat., *Favolus tenuis* (Hook), Murrill, *Pogonomyces hydnooides* (Sw.), Murrill y *Pycnoporus sanguineus* (Lin.), Murrill.

OREJA DE PALO CARMESÍ: El *Pycnoporus sanguineus* (L.), Murrill, hongo rojo de la familia de las Agaricáceas que vive en los troncos muertos.

OREJA DE RATÓN: En Cayo Ramones, Península oriental de Zapata, dan ese nombre al *Centella asiatica* (L.) Urb.,

hierba pequeña de la familia de las Umbelíferas, que vive en los lugares inundados, orillas de zanjas, cañadas, ciénagas. Tiene las hojas ovales a ovado-orbiculares, redondeadas en el ápice y anchamente acorazonadas en la base o casi truncadas, y las flores en umbelas acabezueladas, 2-4 floras, subtendidas por 2 brácteas ovales.

En Santiago de las Vegas llaman oreja de ratón a un hongo que se desarrolla en los troncos muertos que se parece mucho al órgano auditivo de aquel animal.

En Cabañas, Pinar del Río, dan ese nombre a la *Dichondra repens* Forst., hierba de hojitas redondeadas que se usa como césped en lugares sombreados.

En Jicotea, Las Villas, llaman así a un frijolito silvestre, *Macroptilium lathyroides* (L.) Urb., que en otros lugares conocen como *Contra maligna* y *Maribari*. V. CONTRA MALIGNA, MARIBARI y VIOLETA JAPONESA.

OREJÓN: V. ÁRBOL DE LAS OREJAS, OREJA DE JUDÍO y OREJA DE NEGRO.

ORGULLO DEL JAPÓN: Nombre anotado en la Escuela Tecnológica Agrícola de Matanzas, como aplicado a la *Lagerstroemia speciosa* Pers., árbol de la familia de las Litráceas, de bellas flores rosadas en grandes racimos. V. REINA DE LAS FLORES.

ORILLA DE ARROYO (Grisebach): Arbusto silvestre de la familia de las Ocnáceas. El *Ouratea alaternifolia*, G. Maza, que crece a orillas de los arroyos y ríos. V. GUANABANILLA.

ORIZA (Maza): V. ARROZ.

ORO AZUL: Lllaman así en Cabaiguán, Zaza del Medio y otros lugares de Las Villas, a la *Phylla strigillosa* (Mont. & Gal.) Moldenke, hierba rastrera de la familia de las Verbenáceas que forma extensos colchones en los lugares bajos y húmedos convirtiéndose en una hierba perjudicial para el cultivo. El nombre vulgar es una mala pronunciación del *orozuz*, que corresponde a otra especie de *Lippia*.

En Jicotea, las Villas, llaman *oroazul* a la *Lippia stoechadifolia* (L.) Urb., Verbenácea también, más conocida como AZULEJO. V.

ORO BLANCO: Otro nombre de la especie anterior empleado en El Caimito, Habana.

OROZUZ: "Planta silvestre de toda tierra, singularmente de los eriales; llega a la altura de tres pies; hojas ovales, terminadas en punta, de una y media pulgadas; florece todo el año y es aromática. Se emplea en decocción para las afecciones del pecho; sus raíces machacadas e infundidas en agua obran como poderoso tónico en las afecciones que

proviene de la debilidad de las fibras musculares del estómago". (Pichardo).

No conocemos este orozuz, mas por la descripción parece que se trata de una especie de filigrana (*Lantana*).

OROZUZ DE LA TIERRA: *Lippia dulcis*, Trev. Planta rastrera de la familia de las Verbenáceas, que crece a orillas de los ríos, zanjas y otros lugares húmedos donde forma colchones. Las hojas son ovales, puntiagudas, de sabor dulce y aromático; las flores son blancas en capítulos cilíndricos. Se la estima mucho como pectoral empleándose en decocción contra la tos. Durante mucho tiempo estuvo en boga una clase de cigarrillos llamados pectoral de orozuz, cuyo papel era teñido con zumo de esta planta.

ORQUÍDEA ARAÑA: *Epidendrum cochlitatum* Lin. Nombre anotado por un coleccionista de orquídeas en el central España, provincia de Matanzas. V. CAÑUELA.

ORQUÍDEA DE HOMBRE: *Epidendrum phoeniceum* Lindl. Nombre empleado en el central España, provincia de Matanzas, para esta orquídea nativa de Cuba nombrada así por un coleccionista de orquídeas, V. SAN PEDRO.

ORQUÍDEA DE SAN MIGUEL: *Blettia purpurca* (L.) DC. Nombre empleado en el central España, Matanzas, para esta orquídea terrestre cubana. Probablemente el nombre se debe a haber sido colectada la planta en San Miguel de los Baños. V. CANDELARIA.

ORQUÍDEA SILVESTRE: Nombre que dan algunos a la *Bauhinia purpurca* Lin. de flores color lila o morado y matizadas de blanco. V. BAUHINIA.

ORTIGA: La ortiga europea, *Urtica urens* Lin., no existe en Cuba, pero llaman ortiga u ortiguilla a varias especies de la misma familia de las Urticáceas, que tienen pelos urentes, produciendo la misma sensación de ardencia y picazón que la verdadera ortiga. Estas especies son: *Fleurya cuneata* (A. Rich.) Wedd., que es sumamente común no sólo en los campos sino en las orillas de las aceras en las poblaciones y en todas partes. Tiene hojas aserradas, con la base cuneiforme, estípulas axilares bifidas; flores en cimas axilares o paniculadas, escorpoideas.

Según Maza esta planta se emplea "para golpear los miembros atacados de parálisis y de reumatismo, en la impotencia sexual, el cólera, etc. La raíz es excitante. Las semillas son diuréticas. Al interior esta planta se manifiesta como un poderoso hemostático".

Además, en muchos lugares llaman también ortiga a

otra planta urticante, de la familia de las Euforbiáceas, *Platyginé hexandra* (Jacq.) Müell. Arg., más conocida por PRINGA MOZÁ. V.

A la *Platyginé hexandra* (Jacq.) Müell. Arg. se le atribuye en Banes, Oriente la causa de la muerte súbita del ganado que otros atribuyen al *Bejuco marrullero*.

ORTIGA MORADA: Planta urticante de la familia de las Euforbiáceas, *Tragia volubilis* L., que también se llama *Ortiguilla* y *Pringamoza*.

En Firmeza, Oriente, usan el agua de la decocción de la hierba como detergente para lavar llagas. Con el polvo de la planta seca espolvorean las llagas y dicen que las cicatrizan.

ORTIGUILLA: *Fleurya cuneata* (A. Rich.), Wedd. V. ORTIGA.

ORTIGÓN (Pichardo): V. ORTIGA y PRINGAMOZA.

OSAR (Bachiller):

OSCAR: Nombre local empleado en La Yaya, Puerto Padre, para designar un arbusto de los arenales de la costa, *Mayerpea bumelioides* (Gris.) Kr & Urb., de la familia de las Oleáceas, que también llaman JIQUICILLO. V.

OSCAR DE COSTA: Nombre empleado en Puerto Padre, Oriente para designar a la *Banara reticulata* Gris., arbusto de la familia de las Flacurciáceas, de hojas brillantes, dentadas y con las venas muy marcadas.

OVA: Planta acuática propia de lagunas y ciénagas, muy común en la provincia de Pinar del Río. Es *Nymphaea amazonum* Mart. & Zucc., de la familia de las Ninfáceas. V. FLOR DE AGUA.

OVA BLANCA: Planta acuática común en arroyos y lagunas, es la *Nymphaea ampla* (Salisb.) DC., de grandes hojas flotantes aovadas o suborbiculares y grandes flores blancas. V. FLOR DE AGUA.

OVA CRIOLLA: *Nuphar advena* Ait., var. *cubense* P. de León, planta más conocida por MALANGUETA.

OVA DE GALLETA: Nombre consignado por el Hno. León en su Flora de Cuba como empleado para designar a la *Nymphaea odorata* Dryand, planta acuática común en lagunas y arroyos. V. FLOR DE AGUA.

OVIEDO AMARILLO: Según Maza es el *Clerodendron cubense*, Schau., arbusto silvestre de las Verbenáceas. Nosotros no le conocemos por este nombre. V. HIEL DE GALLINA, HIEL DE PERRO y MAGÜIRA CIMARRONA.

OVIEDO DE FLOR BLANCA (Maza): El *Clerodendron sagrei*, Schauer, arbustito de las Verbenáceas. No le conocemos por ese nombre.