

## Q

QUASI (Maza): V. QUASIA.

QUASIA: Árbol cultivado de la familia de las Simarrubáceas.

*Quasia amara*, Lin., que produce el leño de quasia usada en medicina como estimulante del apetito. Existían ejemplares en la Quinta de los Molinos y en algunos otros lugares de la Isla. Tiene las hojas con 3-5 folíolos elípticos-ovales u obovales, con el raquis y los pecíolos anchamente alados. Las flores son hermafroditas, en racimos terminales o panículas, con 5 pétalos de color escarlata muy vistosos. Los frutos son drupas ovales de 1 a 1.5 cm. de largo.

QUEBRACHO: En Mayarí y Santiago de Cuba dan este nombre al ROBLE PRIETO. V.

QUEBRACHO COLORADO: *Schinopsis Lorentzii* (Gris).

Engl. Familia Apocináceas. Este árbol de la Argentina y Paraguay fue introducido en Cuba mediante semillas recibidas de Buenos Aires en enero de 1949. Se han logrado varias plantas en la Estación Experimental Agronómica, una de las cuales tiene varios metros de altura, pero aún no han florecido. La madera de este árbol de color rojo intenso, es la que se utiliza en aquellos países para obtener el extracto de quebracho, curtiembre que se importa en grandes cantidades de la Argentina para nuestras tenerías. Viene en forma de grandes cantos de color rosado y semitransparente. El follaje es oscuro y la planta se parece mucho al copal (*Schinus terebinthifolius*). Las hojas son alternas y formadas por once pares de folíolos y uno terminal, lanceolados, agudos.

QUERENDONA: En Santiago de las Vegas han dado este nombre al *Clerodendron thomsonae*, Balf., planta ornamental trepadora de la familia de las Verbenáceas. V. CLARA LISA, CLEMÁTIDA, CLERODENDRON, CRENDOLIDA y JAMAÍQUINA.

QUIBEY: En Moa, Oriente, según Acuña llaman así al *Jacaranda arborea Urban.*, probablemente queriendo decir ABEY. V. ABEY DE MONTE MALO, REVIENTA CABALLO y TIBEY.

QUIEBRA HACHA: *Copaifera hymenaeifolis* Moric. Árbol silvestre de la familia de las Cesalpináceas, llamado así en las provincias occidentales, y en Oriente *caguairán*. Crece en los bosques en terrenos calcáreos montañosos. Es aún muy abundante en la zona de Guantánamo, pero va siendo raro en el resto de la Isla. Tiene las hojas pennadas con los foliolos ovales lustrosos; flores en racimos espiciformes, compuestos, pequeños, purpurescentes.

La madera de este árbol es una de las más valiosas de Cuba. Es incorruptible, compacta, pesada y de una dureza extraordinaria, como lo indica su nombre vulgar; es de un color rojo de vino. Se le emplea en horcones, pilotes, mazas, traviesas de ferrocarril y en puentes rústicos. Según Sauvalle sus coeficientes son: de elasticidad, 1,550: de rotura por tracción, 24; por compresión, 9; por flexión, 15; por torción, 5. Densidad, 1.27.

En Banes, Mayarí y Santiago de Cuba, el quiebra hacha es el *Ehretia tinifolia* Lin., árbol de las Borragináceas, que en la parte occidental se llama *Roble prieto*.

En Gran Tierra, Moa, provincia de Oriente, dicen *Quiebra hacha* al *Mayepea domingensis* (Lam.) Kr & Urb., árbol de las Oleáceas. V. BAYITO y ROBLE PRIETO.

QUIEBRA HACHA DE COSTA: Según Sauvalle es el *Celtis trinervia*, Lam., árbol silvestre de las Ulmáceas, al que conocemos por otros nombres. V. AGUEDITA, CAGADA DE GALLINA, GRACILIANO, GUASIRIANO, GUISACILLO, RAMÓN DE SIERRA.

QUIMBOMBÓ: *Hibiscus esculentus*, Lin. Planta alimenticia de la familia de las Malváceas, que constituye uno de los cultivos menores del país. Es una hierba anual, de hojas acozonadas, con 5 lóbulos obtusos, dentados; pecíolo más largo que la flor; involucre de 10 foliolos caducos; cáliz rompiéndose a lo largo, fruto piramidal, asurcado, viscoso. Las flores son de color amarillo de azufre y sus frutos o cápsulas son comestibles cuando tiernos, bien en ensalada o en un potaje especial llamado de quimbombó, que es un manjar de origen africano, que gusta mucho a los naturales del país.

QUIMBOMBÓ CHINO: *Hibiscus sabdariffa*, Lin. V. ALELUYA ROJA DE GUINEA y SERENÍ.

QUIMBOMBÓ CIMARRÓN: Según el Hno. León así llaman en Oriente al *Malvastrum cordiaefolium*, Urb., hierba silvestre de las Malváceas, con hojas parecidas a las del Quimbombó.

QUINA: Varias plantas indígenas reciben este nombre debido al sabor amargo de su corteza y a sus propiedades febrífugo más o menos apreciables. En San Cristóbal, Pinar del Río, llaman quina al *Casearia praecox*, Gris., árbol que crece en las faldas de las lomas calcáreas y pertenece a la familia de las Flacurciáceas. Lo llaman también agracejo, agracejo de monte, aguedita y jía de monte.

Otra quina, según Maza, es el *Casearia sylvestris*, Sw., especie hermana de la anterior a la que conocemos por SARNA DE PERRO y SARNILLA. V., y también CHINCHONA y VIGUETA.

QUINA DEL PAÍS: Según Maza, así llaman a una Rutácea, *Galipea ossana* DC. (*Raputia ossana* Engl.), que crece en las provincias occidentales; y dos Simarrubáceas, *Picramnia pentandra* Sw. y *Picramnia reticulata* Gris., arbolito silvestre en toda la Isla. La *Galipea ossana* DC. es una especie muy rara recolectada en San Diego, Pinar del Río, por La Sagra y citada de La Habana por La Ossa.

QUINA DE LOS CARIBES (Dr. Cuesta): Esta es sólo la traducción al lenguaje vulgar del nombre latino del *Exostema caribaeum* (Jacq.), R. & S., árbol silvestre de las Rubiáceas. V. CAREY, CERILLO y LIRIO SANTANA.

QUINA PITÓN (Maza): No hemos oído emplear este nombre anotado por Maza para el *Exostema sanctae luciae* (Kenth), Britton, *E. floribunda* (Sw), (Roem & Schulz.), árbol silvestre de las Rubiáceas. V. VIGUETA NARANJO y VIGUETA NARANJO BLANCO.

QUINOA: El *Chenopodium quinoa*, Willd., planta de la familia de las Quenopodiáceas, introducida por la Estación Agronómica.

QUIQUE: Nombre local de La Yaya, Puerto Padre, Oriente para designar al *Phialanthus myrtilloides* Gris., árbol resinoso de la familia de las Rubiáceas.

QUISCUALIA: *Quisqualis indica* Lin. Corrupción del nombre genérico de esta planta, llamada así en Oriente. V. PISCUALA.

QUISQUALIS (Maza): V. PISCUALA.

QUITA DOLOR: Uno de los nombres vulgares de la *Lippia alba* (Y.) N.E. Brown, Verbenácea usada como medicinal. En la parte Sur de Camagüey se le encuentra en antiguos

bateyes. Su cocimiento se usa contra los dolores de estómago. Es silvestre en Imías, Oriente.

QUITA MERIENDAS (Maza): V. VILLORITA.

QUITA ZAPATOS: *Acanthospermum humile* (Sw.) DC. Nombre empleado en Alquizar, Habana, para esta hierba espinosa silvestre. V. PINEDO.

QUITASOL CHINO: *Cyperus alternifolius*, Lin. Hierba cultivada como ornamental de la familia de las Ciperáceas, que se usa en los jardines para sembrar en las fuentes, donde forma macizos de agradable aspecto; pero también vive perfectamente en la tierra aunque no sea muy húmeda. V. PARAGÜITA CHINO.

QUITASOLILLO: *Hydrocotyle umbellata*, Lin. Umbelífera común en los lugares húmedos y a la orilla de las zanjas y arroyos. La llaman también ombligo de Venus y es una hierba perenne, lampiña. Tiene las hojas peltadas, orbiculares, escotadas en la base, dentadas, comúnmente 11-12 nervias; escapo apenas más corto que el pecíolo; umbelas 20-30-floras; flores distintamente pediceladas.

También llaman quitasolillo en la Sierra de Guane, Pinar del Río, al *Miconia impetolaris* (Sw.), G. Don, arbusto silvestre de las Melastomatáceas. V. CORBOBÁN.

QUITIPÓN: Arbusto de cangrejas en el Cupey, Puerto Padre. Es *Bonania microphylla* Urb. de la familia de las Euforbiáceas.