

CATÁLOGO

DE LAS

PERIANTIADAS CUBANAS,

ESPONTÁNEAS Y CULTIVADAS,

POR

D. MANUEL GÓMEZ DE LA MAZA.

(Sesión del 4 de Junio de 1890.)

La subclase de las *Periantidas* está representada en Cuba por 101 familias, correspondiendo 66 al orden de las *Bialipétalas* y 35 al de las *Gamopétalas*.

De esas familias que tienen representantes en Cuba nos ocupan actualmente 70.

Nuestro trabajo se funda, sobre todo, en las *exsiccatas* de las plantas recolectadas en los campos cubanos por Mr. C. Wright, citando entre paréntesis los números de muchas de esas *exsiccatas*. Utilizamos también los datos que ofrecen las obras de M. A. Grisebach (1) y la del Sr. D. F. A. Sauvalle (2), y exponemos, en fin, cuantas especies, espontáneas ó cultivadas, hemos diagnosticado en nuestros estudios prácticos.

(1) *Plante Wrightiane e Cuba Orientali: ex Mem. Acad. Amer. Scient. et Artium*, n. ser., tom. vili, pars i, Dec. 1860; pars il, Nov. 1862. Cantabrigiaj Nod. Angl. *Catalogusplantarum Cubensium*. Lipsia?, 1866.

(2) *Flora cubana (Revisio Catalogi Grisebachianum vel Index plantarum Cubensium)*. Havana;, 18-3: publicado por la Real Academia de Ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana.

ORDEN I — DIALIPÉTALAS.

SUBORDEN I.—*Dialipétalas superovariadas.*

Ranunculáceas. — Magnoliáceas. — Berberídeas. — Ninféceas. — Malváceas. — Terns-tremiáceas. — Cisteas. — Hipericáceas. — Tamariscíneas. — Violáceas. — Droseráceas. — Nepenteas. — Resedáceas. — Capparídeas. — Papaveráceas. — Geraniáceas. — Lináceas. — Crassuláceas. — Elatíneas. — Cariófleas. — Portuláceas. — Zigofíleas. — Rutáceas. — Simarúbeas. — Malpiguiáceas. — Poligaleas. — Leguminosas. — Connareas. — Rosáceas. — Moríngas. — Celastráceas. — Dicapetáneas. — Ilicíneas. — Pittospóreas. — Olacíneas. — Ramneas.

Ranunculáceas.

- Nigella Damascena* Lin. (Cult.)—*Arañuela, araña.*
Delphinium ajacis Lin. (Cult.)—*Espuela de caballero.*
Ranunculus recurvatus Poir.? (Sylv!). [*Ranunculus Cubensis* Gris.]—*Botón de oro.*
 — *Asiaticus* Lin. (Cult.)—*Marimona, francesilla.*
Anemone aestivalis G.-M., nomen (Cult.) [*Adonis aestivalis* Lin.]—*Flor Adonis, gota de sangre*?"
 — *vernalis* G.-M., nomen (Cult.) [*Adonis vernalis* Lin.]
 — *Flor A donis.*
 — *coronaria* Lin. (Cult.)—*Anemone.*
 — *hortensis* Lin. (Cult.)—*Anemone.*
Clematis dioica Lin. (1, 2) [*Clematis Havanensis* Kth., Rich.;
Clematis pallida Rich.]—*Cabello de angel.*
 — *sericea* Kth. (Sylv.)—*Cabello de ángel.*
 — *Flammulastrum* Gris. (1561).—*Flámula.*

Magnoliáceas.

- Illicium parviflorum* Mich.¹ (3).—*Anís, badiana.*
Magnolia Plumieri Sw. (1100) [*Talauma Cand.*]—*Magnolia.* '
grandiflora Lin. (Cult.)—*Magnolia.*
Liriodendron Tulipifera Lin. (Cult.?)—*Tulipero.*

Berberídeas.

Berberís Praxinifolia Hook.? (1855) [Mahonia Cubensis Rich.]
—*Cerillo de loma.*

Ninfeáceas.

Cabomba Piauiensis Gardner?

Brasenia Nymphseoides H. B." [Brasenia peltata Pursh.; Hydro-
peltis purpurea Michx.; Menyanthes peltata Thunb.; Me-
nyanthes Nymphseoides Thunb.; Villarsia peltata Roem. &
Schult.; Limnanthemum peltatum Gris.]

Nymphsea ampia Cand. [Excl. j§, Cand.]—*Flor de agua, nefam-
Mo Manco.*

— Rudgeana Mey. [Nymphsea ampia Cand.; ß, Rud-
geana Cand.]—*Ninfea.*

— odorata Ait.—*Nenúfar blanco.*

— Jamesoniana Planch.—*NelumMo.*

— cserulea Sav. (Cult.)—*Nenúfar azul.*

— alba Lin. (Cult.!)—*Nenúfar, ninfea.*

Nuphar advena Ait.—*Ova.*

Nelumbo lútea H. B." [Nelumbium luteum Willd.; Nelumbium
pentapbyllum "Willd.; Nelumbium codophyllum
Rafin.; Nelumbium Jamaicense Cand.]—*NelumMo
amarillo.*

— nucífera Gsertn. (No lo hay en Cuba.) [Nelumbo In-
dica Poir.; Nelumbium speciosum Willd.; Nelum-
bium Asiaticum Rich.]; 0, Támara G.-M. (Cult.!)
[Nelumbium speciosum Willd.; j§, Támara Cand.]
—*NelumMo.*

Malváceas.

Berrya (1) Cubensis G.-M., nomen (1117) [Carpodiptera Cuben-
sis Gris.]—*Majagua de costa, majagua del pinar.*

(1) Sección *Carpodiptera* G.-M., nombre.

- Muntingia Calabura Lin. {4&}.—*Memño, guásima, cerezo, capulinas.*
- Luhea platypetala Rich.—*Guásima amarilla, guásima varia.*
- Corchorus oltorius Lin.—*Gringuele, gregré, grengué, gr enguere.*
- pilolobus Link.
- siliquosus Lin. (45).—*Malva té.*
- hirsutus Lin.
- Trichospermum Mexicanum H.-Bⁿ [Belotia Grewisefolia Rich.]
— *Guasimilla, guacimilla, majagüilla llanca, majagüilla macho.*
- Triumfetta semitriloba Lin. (43) [T. heterophylla Lam.^k; T. Havanensis K.th; T. Ulmifolia Desv.; T. diversiloba Presl.; T. anculata Lam.^k]—*Guizazo.*
- Grossularisefolia Rich. (44).— *Guizazo lobo, Guizacillo.*
- rhomboidea Jacq.— *Guizazo de cochino.*
- hispida Rich.— *Guizazo.*
- Altseoides Lam.^k
- Prockia Crucis Lin. (11) [Trilix Gris.; Prockia tomentosa Rich.]
— *Guasimilla.*
- Sloanea Amygdalina Gris. (1119).—*Cresta de gallo.*
- Curatellifolia Gris. (1118).—*Cresta de gallo, pito.*
- longiseta Wr.— *Cresta de gallo.*
- Sterculia Carthagenensis Cav. (Cult.!)—*Camaruca.*
- Helicteres Guazumsefolia K.th
- semitriloba Bertero [H. furfuracea Rich.]
- trapezifolia Rich.—*Majagüilla de costa.*
- rotundata Gris.
- Jamaicensis Jacq.— *Majagüilla de costa.*
- Dombeya (1) penduliflora G.-M. (2) (Cult.!) [Astrapsea penduliflora Cand. (3); A. Wallichii Lindl., Ker.]
- Pentapetes Phcenicea Lin. (Sylv.)—*Cáñamo.*
- Melochia pyramidata Lin. (Sylv.)—*Malva común.*

(1) Sección *Astrapma* H. B.n

(2) Árbol bellissimo; ramos divergentes. Hojas de 0,22 m. á 0,24 m., acorazonadas, ampliamente dentadas; estípulas foliáceas, muy grandes, onduladas, ovales, acuminadas. Flores en número de 40 á 50, de corola purpúrea, reunidas en capítulos magnos y suspendidos de la extremidad de un pedúnculo largo y erizado. Iudía oriental, donde parece introducida; Madagascar.

(3) Especie no citada en el *Prodromus*.

Melochia tomentosa Lin. (40).

- *nodiñora* Sw. (39) [*Riedleia* Cand.; *Mougeotia* K.th; *Mougeotia* *Carpinifolia* Wendl.]—*Malva colorada*.
- *hirsuta* Cav. [*Riedleia* Cand.; *Mougeotia* K.th; *Riedleia serrata* Vent.; *Melochia serrata* Benth.; *Melochia vestita* Benth.; *M. Melissefolia* Gris, non Benth.]
- *manducata* Sauvai.

Waltheria Indica Lin. (Sylv.!) [*W. Americana* Lin.; *W. elliptica* Cav.]; β , *prostrata* G.-M., nomen (Sylv.!) [*W. Americana* Lin.; var. *Sauvai*; "*W. microphylla* Cav.?" (1).—*Malva llanca*.

Buettneria (2) *Euphrasifolia* G.-M., nomen (Sylv.!) [*Ayenia* Gris.]

- (3) *pusilla* G.-M., nomen (41) [*Ayenia* Lin.; *Buettneria microphylla* Gris.; non Lin.] (4).
- *Scorpiura* Wr. (Sylv.!)

Theohroma Guazuma Lin. (Sylv.!) [*Guazuma Ulmifolia* Lam.¹] —*Guásima*.

- *tomentosa* G.-M., nomen (47) [*Guazuma tomentosa* K.th; *G. polybotrya* Cav.; *G. parvifolia* Rich.] —*Guásima*.
- *Cacao* Lin. (Cuit.!)—*Cacao*.

Malva leprosa Ort. (Cuba, según Cand.)

- *tricuspidata* Ait. (Sylv.!) (5) [*Malva Americana* Cav.; Lin.; *M. Carpinifolia* Desvons.; *M. Coromandeliana* Willd.; *Sida Jamaicensis* Mill.; *Malva Ulmifolia* Balb.; *M. Curassavica* Desvons.; *M. Domingensis* Spreng.; *Malvastrum tricuspidatum* A. Gray] (6).—*Malva rizada*.
- *spicata* Lin. (27) (7) [*Malva polystachya* Cav. *Malva*

(1) ¿Qué es la *exsiccata* *Wrightiana* número 42?

(2) Sección *Ayenia*, G.-M., nombre.

(3) ídem.

(4) Es invención de Sauvalle la *Buettneria* que atribuye á Lam.¹ y que pone bajo el nombre erróneo de *Büttneria*, ó sea *Büttneria microphylla* Lam.¹

(5) Es exótica su var. /3, *sub-triloba* Cand. [*Malva Antillanum* Zuce]

(6) *Planta; Wrightianai Texano-Neo-Mexicanm*, pág. 16.

(7) Hay que elegir entre a Cand. [*Malva ovata* Cav.] y 5 Cand. [*Malva ipicata* Cav.; *Malva swb-lobata* Desrous.]

- Betulina Desvons; Malvastrum spicatum A. Gray] (1).
 Althsea rosea Cav. (Cult.)—*Varita de San José*.
 Sida Carpinifolia Lin. f. (1115) [*Si lanceolata* Roxb.; Rich.;
 S. acuta Burm.; Rich.]; y, brevicuspidata Gris. (1565).
 —*Malva de caballo*.
 — ciliaris Lin. (Sylv.) (2) [S. involucrata Rich.]
 — callifera Gris.
 — Jamaicensis Cav. (3) (29); £, glomerata G.-M., nomen
 (1566) [S. glomerata Cav.]
 — pyramidata Cav. (1570) (4).
 — phlebococca Gris.
 — paniculata Lin. (1569).
 — cordifolia Lin. (Cuba?) [S. multiflora Cav.]; *gj* Althaeifolia
 G.-M., nomen (31) [Sida Althseifolia Sw.] (5).
 — Hedersefolia Cav. (1567).—*Yedra terrestre*.
 — Linifolia Juss.
 — spinosa Lin. (28).—*Malva de calallo*.
 — rhombifolia Lin. (1116).—*Malva de cochino*.
 — urens Lin. (30; 1564).—*Malva peluda*.
 — supina L'Hérit.
 — Ulmifolia Cav.: forma sub-glabra (30).
 — nervosa Cand. (1568).
 — triquetra Lin. (Sylv.) [Abutilón triquetrum Rich.; S. tri-
 sulcata Jacq.; Bastardia triquetra S. A. de Morales].—
Escola cimarrona.
 — Occidentalis Lin. [Gaya affinis Rich.; G. Occidentalis
 Gris.]
 Bastardia viscosa K.¹⁸ (Sylv.)—*Escola de Iruja*-
 Anoda bastata Cav.
 Abutilón Indicum G. Don [A. Asiaticum W. & Arn.; non G.
 Don; non Sida Asiática Lin.; Sida Indica Lin.; Cav., *JDiss.*, i,

(1) *Boi. Paci. Bcopl.*, i, p. 147; y *Pl. Fendler*, p. 22. Es erróneo citar á Gris, como autor de este nombre.

(i) Generalmente crece asociada al *Stylosanthes procumbens* Sw., leguminosa papilionacea cubana.

(3) En Gris, *Plantie WrigJitians e Cuba Orientali*, p. 163, y en Sauval, *Flora cubana*, p. 11, se lee Lin., en vez de Cav.

(4) Especie omitida por Sauval; admitida por Gris., *Pl. Wright. Cuba*.

* (5). Las var. 7, *aristosa* G.-M., nombre [*S. Althmifolia* Sw.; /3, *aristosa* Cand.]; y 3, *Guadalupense* G.-M., nombre, son exóticas.

pág. 33, t. 7, f. 10?; *Abutilón elongatum* Moench?; *Sida cordifolia* Forsk.?; non Lin.]—*Botoncillo de oro, botón de oro.*

Abutilón pedunculare K.th [*Sida peduncularis* Cand.] *Abutilón.*

- *confertiflorum* Ricb. (1572).
- *permolle* G. Don (1571) [*Sida permollis* Willd.]
- *lignosum* Ricb. (Cuba! &") [*Sida lignosa* Cav.]
- *crispum* G. Don. [*A. trichodum* Ricb.; *Bastardia crispata* Rich.; *Sida crispata* Lin.]
- *striatum* Hortul. (Cult.!) (1). [*Sida picta* Hook.]

Wissadula spicata Presl.

- *rostrata* Planch.; Benth? (Exótica) [*W. Periplocifolia* Thw., Gris.; *Abutilón Periplocifolium* G. Don; *Sida Periplocifolia* Lin.]; 8, *Caribsea* G.-M. (Sylv.) [*Sida Caribaja* Sloane; *Sida Periplocifolia* Lin.; *e*, *Caribsea* Cand.]; *S*, *Wrightiana* G.-M. (Sylv.); *t*; *Hernandioides* G.-M. (Sylv.) [*Sida Hernandioides* L'Hérit.] (2).

Urena sinuata Lin. (1114).—*Escota, carapicho.*

- *lobata* Lin.
- (3) *capitata* G.-M. (4) (Sylv.!); *B*, *Alcesefolia* G.-M. (5) (36).—*Malva mulata.*
- (6) *Mcencbi* G.-M. (7).

(1) GRIS.: *Ble Qeographische Yerbreitmig der Pflanzen Westináieti*, p. 38, señala como cubano el *Abutilón striatum* Kuntli.

(2) Las var. ??, *Peruviana* G.-M. [*Sida periplocifolia* Lin.; 7?, *Peruviana* Cand.]; *r*, *Zeylanica* G.-M. [*W. Zeylanica* Medik.; *Sida Periplocifolia* Lin.; *a*, *Zeylanica* Cand.]; y *t*, *albicans* G.-M. [*Abutilón Periplocifolium* G. Don; §, *albicans* Eggers], son exóticas.—Ignoramos si son sinónimos de esta especie los nombres siguientes: *Abutilón lamiflorum* Guil.; *A. parviflorum* St.-Hil.; *Sida excelsior* Cav.; *S. heterosperma* Hochst.; *Wissadula excelsior* Presl.

(3) Sección *Malachra* G.-M. [Género *Malachra* Lin.] Cárpelos inermes.

(4) [*Sida capitata* Lin.; *Malachra capitata* Lin.] (J) Tallo escabroso. Hojas acorazonadas, sub-redondeadas, obtusamente angulosas, denticuladas. Involucros pedunculados, 3-flos, 7-flores.—Puntos pantanosos de algunas Antillas [Cuba, Puerto-Rico (*Malva de caballo*), Guadalupe, Islas Vírgenes, etc.], del Congo y de la India.

(5) [*Malachra Alcemfolia* Jacq.] Capítulos pedunculados, 5-flos, sub-10-flores.—Cuba, Islas Vírgenes, Caracas.—La var. *y*, *rotundifolia* G.-M. [*Malachra rotundifolia* Sebrank], del Brasil, es desconocida en Cuba. Sus caracteres son: hojas orbiculado-crenadas. Capítulos pedunculados, 3-flos, 5-flores. Foliólos del involucre reniforme-orbiculados.

(6) Sección *Malachra* G.-M.

(7) [*Malachra palmata* Moench]. (f) Tallo erguido, escabroso. Hojas palmado-lobadas; lóbulos 3-5, el intermedio dilatado en el ápice. Flores medianas, amarillas.—Cuba, Puerto-Rico, Trinidad.

- Urena (1) radiata G.-M. (2) (35; 1573).—*Malva mulata*.
 — (3) urens G.-M. (4).
 — (5) Texana G.-M., nomen (Sylv.) [Malachra Texana A. Gray].
 — (6) innominata G.-M., nomen (Sylv.) [Malachra (Especie núm. 197 de Sauvalle, *Flora cuíana*.)]
- Pavonia Typhalsea Cav. (33) [P. Typhalseoides K.^{1b}; P. Pseudo-Typhalgea Gris.]—*Tábano*.
 — spinifex Cav. (34); β , Grisebachi G.-M., nomen (1113).—*Majagüilla de costa, espinosa*.
 — racemosa Sw.—*Majagüilla*.
 — linearis Rich.
 — intermixta Rich.
 — hispida Sauval.
 — sub-pandurata Wr.—*Majagilin*.
 — cordifolia "Wr.—*MajagMn*.
 — meg'alophylla Wr.
 — Achanioides Gris.—*Majagüilla*.
- Malvaviscus arboreus Cav.—*Malvavisco, majagüillo*.
 — Drummondü Torrey & A. Gray.—*Malvavisco*.
 — pulvinatus Rich. (7).
- Hibiscus Sororius Lin.—*Majagüilla, Mlisco Manco*.
 — Bancroftianus Mac-Fadyen [H. truncatus Rich.]—*Hiisco silvestre*.
 — neglectus Sauval.
 — Phseniceus Jacq. (1574).—*Peregrina*.
 — Cannabinus Lin.—*Flor de San Juan*.
 — Cubensis Rich.
 — cryptocarpus Rich. (1575).—*Majagüilla de costa, hiisco de costa*.

(1) Sección *Malachra* G.-M:

(2) [*Sida radiata* Lin.; *Malachra radiata* Lin.] (T) Hojas palmado-lobadas. Capítulos pedunculados, 5-flos, oo-flores; involucros acuminados. Flores blanco-rosadas, ebracteadas.—Cuba, Puerto-Rico (*Malva blanca*), Santo Domingo, Guadalupe, Cayena.

(3) Sección *Malachra* G.-M.

(4) [*Malachra urens* Poit.] (J) Hojas lobadas, 5-nervias. Capítulos sub-sentados; folíolos del involucro dentados en la base. -Cuba, Santo Domingo, Saint-Thomas.

(5) Sección *Malachra* G.-M.

(6) ídem.

O) Especie admitida por Gris, *Cat. pi. Cub.*, p. 28, y omitida por Sauval.

- Hibiscus bifurcatus* Cav.—*Majagüilla del pinar, hibisco del pinar.*
- *costatus* Rich.—*Hibisco de sabana.*
 - *furcellatus* Desvons.
 - *Tiliaceus* Lin. (Sylv.!) [*Paritium Tiliaceum* Juss.; *Paritium elatum* G. Don].—*Majagua común.*
 - *Sabdariífa* Lin. (Cuit.!)-- *AUlwga, roja de Guinea, agrio de Guinea, serení, alehuya.*
 - *Syriacus* Lin. (Cuit.)
 - *Rosa-Sinensis* Lin. (Cuit.)—*Mar-Pacífico, Sangre de Adonis, amapola, Hércules.*
 - Var. de flores blancas (Cuit.)—*Leche de Venus.*
 - Var. de flores amarillas (Cuit.)—*Mar-Pacífico amarillo.*
 - Var. de flores rojas dobles (Cuit.)—*Mar-Pacífico moñudo.*
 - *esculentus* Lin. (Cuit.)—*Qtiimbombó.*
 - *Abelmoscbus* Lin. (Cuit.)—*Abelmosco, ambarina.*
- Gossypium herbaceum* Lin. (Cuit.)—*Algodón* (1).
- *Barbadense* Lin. (Cuit.)—*Algodón.*
 - *arboreum* Lin. (Cuit.)—*Algodón.'*
 - *hirsutum* Lin. (Cuit.)—*Algodón.*
 - *racemosum* Poir. (Cuit.)—*Algodón.*
- Tbespesia populnea* Corr. (1576).—*Majagua de Florida.*
- Kosteletzchya bastata* Presl. [*Hibiscus hastatus* Cav.]
- *pentasperma* Gris. [*Hibiscus pentaspermus* Bert.]
- Bombax emarginatum* G.-M. (2). [*Pachira emarginata* Ricb.]
- *Seibón, ceibón.*
- Eriodendron anfractuosum* Cand. (3); *p*, *Caribasum* Cand. (Sylv.!)—*Seiba, ceiba.*
- Pacbira aquatica* Aubl. (Sylv.!) (4).—*Carolinea, seibón de agua, seibón de arroyo, castaño silvestre, ceibón de agua, ceibón de arrogo.*

(1) En Cuba se usa más este nombre que el de *Algodonero*.

(2) *Diccionario botánico de los nombres migares cubanos y puerto-riqueños.* Artículo *Seibón*.

(3) Esta especie esté, dividida en tres var., *a*, 13,7, por Cand., sin admitir el *Eriodendron anfractuosum* Cand. como tipo, ni como tal la var. *a*. Tal vez cada var. sea una especie distinta.

(4) Véase G.-M., *Flora de Cuba*, tesis para el doctorado, Habana, 1887, p. 32.

Pachira insignis Savigny (Cult.)—*Carolinea*.

— *alba* Aubl. (Cult.)—*Carolinea Manca*.

— *minor* Aubl. (Cult.)—*Carolinea*.

Adansonia digitata Lin. (Cult.)—*Baobab*.

Ocroma Lagopus Sw. (38).—*Lanero, seibón botija*.

NOTA. Entiéndase que las especies citadas en esta familia son silvestres en Cuba, salvo indicación contraria. Hacemos esta advertencia porque en muchas de ellas no ponemos indicación alguna sobre su existencia en la isla.

Ternstremiáceas.

Hsemocharis Curtyana G.-M. (Sylv.) [Laplacea Eich.]—*Almendro*.

— "Wrighti G.-M. (Sylv.) [Laplacea Wrightii Gris.]
Almendro.

Ternstrsemia elliptica Sw. (Sylv.); & *Clusioidea* G.-M., nomen (Sylv.) [T. *Clusisefolia* Gris.; non K.^{h?}].

— *obovalis* Eich. (Sylv.)—*Copey ñera*.

— *albopunctata* Choisy (Sylv.)—*Copey vera*.

— *flavescens* Gris. (Sylv.)—*Copey vera*.

— *cernua* Gris. (Sylv.)—*Copey vera*.

Marila dissiliflora Sauval. (Sylv.) [Marila *racemosa* Gris.; non Sw.]

Eroteum Thseoides Sw. (Sylv.) [Cleyera Planch.]

— *hirsutum* G.-M. (49) [Freziera *hirsuta* Sm.]

Marcgravia umbellata Lin. (Sylv.)

— *oligandra* Yr. (Sylv.)

Cisteas.

Lechea minor Lin. (Sylv.!)

Hypericáceas.

Hypericum Crux-Andrese G.-M. (2129) [A. *scyrum* Crux-AndreEe Lin.; A. *multicaule* Mich.*; A. *stans* Mich.†; A. *Hypericoides* Lin.]

- Hypericum amplexicaule* G.-M. (2128) [*Ascyrum amplexicaule* Mich.¹; *A. Cúbense* Gris.]
- *Arenarioides* Eich. (Cuba!).—*Mazorquilla de costa*,
 - *hecatophyllum* Sauval.
 - *Styphelioides* Eich. (2127).
 - *Galioides* Lam.³ [*H. axillare* Lam.³; *H. fasciculatum* Lam.³; *H. limosum* Gris., p. p.]
 - *Diosmoides* Gris. (2124).
 - *limosum* Gris.
- Vismia Guianensis* Pers. (Cult.)—*Lacre*.

Tamariscineas.

- Tamarix Gallica* Lin. (Cult.)—*Talaya*, *tamariz*.

Violáceas.

- Hybanthus strictus* H. B.² (20) [*Ionidium strictum* Vent.]—*tyecacuanha de Méjico*.
- *procumbens* G.-M. (1898) [*Ionidium* (ó *Jonidium*) Gris.]—*Violeta silvestre*.
 - *lineatus* G.-M., nomen (Cuba!) [*Ionidium lineatum* Ging-.; *Viola lineata* Ortega]; β , *dubium* G.-M., nomen (Cuba) [*Viola lineata* Herb., Host., Monsp.]—*Violeta silvestre*.
 - *Havanensis* Jacq. (114) [*Ionidium Havanense* Benth. & Hook.]
- Viola odorata* Lin. (Cult.)—*Violeta*.
- *tricolor* Lin. (Cult.)—*Pensamiento*.
- Sauvagesia pulchella* Planch. (Sylv.)
- *erecta* Lin. (Sylv.)—*Hierba de San Martín*.

Droseráceas.

- Drosera intermedia* Drev. & Hayn. (Exótica); *Y*, *Americana* Cand. (1899) [*Drosera Americana* "Willd.; *D. longifolia* Sm.; *y*, *Americana* Gris.]
- *communis* St.-Hil. (1900); β , *Cubensis* G.-M. nomen (1901); $r?$, *breviscapa* Wr. (1902).

Nepenteas.

Nepenthes distillatoria Lin. (Cult.)—*Nepentes*.

Resedáceas.

Reseda odorata Lin. (Cult.!)—*Reseda*.

Capparídeas.

Cleome pung-ens Willd. (1865).—*Volatína*..

— *polygama* Lin. (9; 1866).—*Volatína*.

— *Houstoni* R. Br. (1864) [*C. Cubensis* Rich.]— *Volatína*.

— *procumbens* Jacq. (1868).— *Volatína*.

— *macrorhiza* Sauval (!).— *Volatína*.

— *Guianensis* Aubl. (1867).

Gynandropsis pentaphylla Cand. [*Cleome* Lin.]— *Volatína*.

Capparis frondosa Jacq. (1871).

— *Jamaicensis* Jacq. (9; 1870) [*C. emarginata* Rich.]—
Carbonero.

— *Cynopballopbora* Lin. (10).—*P deperro, mostaza,*
Palo diablo.

— *Grisebachii* Eichler (9") [*C. Amygdalina* A. Gray,
Pl. Wright. Tex., 155; non Lam.^s].—*Alcaparro*.

— *ferruginea* Lin. (1869) (1).

Papaveráceas.

Argemone Mexicana Lin. (Silvestre!).—*Cardo santo*.

Bocconia frutescens Lin. (6); *r*, subtomentosa L'Hérit (Cuba?).

—*Palo amarillo, palo amargo*.

Papaver rhoeas Lin. (Cult.!)—*Camelia, amapola*.

— *somniferum* Lin. {*Cult.*—*Adormidera*.

(1) Sauval. la omite, al menos aparentemente; por esta razón la citamos con reserva.

Geraniáceas.

Oxalis corniculata Lin. (55); /3?, *microphylla* G.-M., nomen (56) [*Oxalis microphylla* Poir.]; 7, *pyg'msea* Gris. (2178).—*Vinagrera*, *vinagrillo*.

— *frutescens* Lin. (2177).

— *violácea* Lin. (1579) [*Oxalis intermedia* Rich.]—*Vinagrillo*.

Impatiens Balsamina Lin. (Cuit.)—*Madama*.

Tropaeolum majus Lin. (Cuit.)—*Marañuela*.

Pelargonium odoratissimum Ait. (Cuit.)—*Geranio rosa*.

Averrhoa Bilimbi Lin. (Cuit.)—*Calamias*, *Camias*.

Linaceas.

Linum usitatissimum Lin. (Cuit.)—*Lino*.

Erythroxyllum minutifolium G.-M., nomen (2133) [*Erythroxyllum minutifolium* Gris.]—*Arabo de piedra*, *sibanicú*, *cubanicú*, *cubainicú*.

— *brevipes* G.-M., nomen (Cuba!) [*Erythroxyllum brevipes* Oand.]; /3, *spinescens* G.-M., nomen (2134) [*Erythroxyllum spinescens* Rich.]

— *alternifolium* G.-M., nomen (2136; 3138) [*Erythroxyllum alternifolium* Rich.]; /3?, *pedicellare* G.-M., nomen (2139) [*Erythroxyllum alterniflorum* Rich.; var.? *pedicellare* Gris.]—*Jibà*.

— *lineolatum* G.-M., nomen (Cuba) [*Erythroxyllum lineolatum* Cand.]—*Jibà*.

— *obovatum* G.-M., nomen (2140; 2141) [*Erythroxyllum obovatum* Macf.; *Erythroxyllum affine* Rich.]—*Arabo colorado*.

— *rufum* G.-M., nomen (Cuba!) [*Erythroxyllum rufum* Cav.]—*Arabo colorado*.

— *squamatum* G.-M., nomen (Cuba?) (1) [*Erythroxyllum squamatum* Vahl].

(1) Gsia.: *Cat.pl. Oiti.*, p. 42, lo admite como de Cuba.

- Erythroxyton Havanense G.-M., nomen (2137) [Erythroxyton Havanense Jacq.]—*Jila*.
- obtusum G.-M., nomen (86; 1149) [Erythroxyton obtusum Cand.; Erythroxyton Havanense K.¹⁰; non Jacq.; Erythroxyton areolatum Poepp.; non Lin.]—*Jibá*.
- Coca H. B.⁹ (Cult.) [Erythroxyton Coca Lam.⁴]—*Coca del Perú*.

Crassuláceas.

- Bryophyllum calycinum G.-M., nomen (Sylv.!) [Bryophyllum calycinum Salisb.]—*Prodigiosa, víbora, hoja bruja, inmortal, pólipo herbáceo, siempreviva*.

Elatíneas.

- Bergia sessiliflora Gris. (2542).

Cariofileas.

- Arenaria serpens K.¹¹
- Drymaria cordata Willd. (Cuba?); /3, diandra Gris. (24).
- Ortegioides Gris. (2019).
- Dianthus Sinensis Lin. (Cult.!)—*Clavel de la China*.
- barbatus Lin. (Cult.!)—*Clavel depoeta*.
- Lychnis Cceli-Rosa Desr. (Cult.)—*Rosa del cielo*.
- Chalcedonica Lin. (Cult.)—*Cruz de Jerusalem, cruz de Malta*.

Portuláceas.

- Talinum patens Willd. (26).—*Verdolaga francesa*.
- Claytonia perfoliata Donn (Sylv.) [C. Cubensis Bonpl.]—*Verdolaga de Cuba*.
- Portulaca olerácea Lin. (Sylv.)—*Verdolaga verdadera*.
- lanceolata Engelm. (2026).

- Portulaca pilosa Lin. (2023; 2025); var. (2024).—*Salta-Perico, diez delfdia, verdolaga de sabana.*
 — grandiflora Lindl. (Cult.!); s, Thomburnii Hort. (Cult.!)—*Verdolaga.*
 — Halimoides Lin. (Sylv.)— *Verdolaga.*
 — quadrifida Lin. (Sylv.)— *Verdolaga.*
 — microphylla Rich. (Sylv.)— *Verdolaga.*

Zigofileas.

- Tribulus maximus Lin. (Sylv.)—*Abrojo.*
 — Cistoides Lin. (Sylv.)—*Abrojo.*
 G-uaiacum officinale Lin. (57).—*Guayacán.*
 — sanctum Lin. (Sylv.)—*Cfuayacancillo.*

Rutáceas.

- Ruta graveolens Lin. (Cult.)— *Ruda.*
 Galipea Ossana Cand. (Sylv., sec. de la Ossa).—*Quina delpais.*
 Ravenia spectabilis Planch. [*Lemonia spectabilis* Lindl.]—*Lemonia.*
 Pilocarpus heterophyllus A. Gray [*Ràputia?* heterophylla Cand.]
 Casimiroa heptaphylla Llav. & Lex. (Cult.)—*Sapote blanco.*
 Xantboxylon emarginatum G.-M., nomen [*Zantboxylum emarginatum* Sw.; *Pagara emarginata* Sw.; *Tobinia emarginata* Desv.; *Zantboxylum coriaceum* Ricb.; *Tobinia coriacea* Desv.]—*Bayúa, bayuda.*
 — dumosum G.-M., nomen [*Zanthoxylum dumosum* Ricb.; *Fagara dumosa* Gris.]
 — spinosum G.-M., nomen [*Zanthoxylum spinosum* Sw.; *Fagara spinosa* Sw.; *Tobiniaspinosa* Desv.]
 — ternatum G.-M., nomen [*Zanthoxylum ternatum* Sw.; *Fagara ternata* Sw.]—*Mate árbol.*
 — /3?, tediosum G.-M., nomen [*Zanthoxylum taediosum* Ricb.]
 — stenopterum G.-M., nomen [*Zanthoxylum stenopterum* Sauval., nomen.; *Fagara stenoptera*

Gris.] — *Chivo, humo, limón café, limoncillo, tomeguín.*

Xanthoxylon Ayua G.-M. (1)(1132; 1132^a) [Zanthoxylum Clava-Herculis Cand. non Lin. (2); non Lam.^k; Zanthoxylum Caribseum Lam.^k; non Gasrtn. (3); Zanthoxylum Carolinianum Gsertn.; non Lam.^k (4); Zanthoxylum lanceolatum Poir (5). — *Ayúa, ayuda.*

— phyllopterum G.-M., nomen [Zanthoxylum phyllopterum Sauval., nomen; Pagara phylloptera Gris.]

— Pterota G.-M., nomen [Zanthoxylum Pterota Cand.; Zanthoxylon Pterota K.th, p. p.?.; Fagara Pterota Auct. non Lin.; Schinus Fagara Lin.? Fagara Lentiscifolia Willd.: es invención de Sauval. la Fagara Lentiscifolia Gris.]— *Ayúa cayutania?, espino, limoncillo, tomeguín.*

— ? gracile G.-M., nomen [Zanthoxylum? gracile Sauval., nomen; Fagara gracile Gris.]

— afomaticum G.-M., nomen [Zanthoxylum aromaticum Willd.; Zanthoxylum Elephantiasis Mac fad.]

— Juglandifolium G.-M., nomen [Zanthoxylum Juglandifolium Willd.]— *Ayuda Nanea, ayuda hembra.*

— /3?, Berterianum G.-M., nomen (Cuba?) [Zanthoxylum Juglandifolium'Willd.; j§?, Berterianum Cand.]

— duplicipunctatum G.-M., nomen [Zanthoxylum duplicipunctatum Wr.]— *Ayuda varia.*

(1) Árbol aguijonoso. Hojas impari-pinnadas y 4-10 yugadas; foliólos oval-oblongos ó elíptico-lanceolados, lampiños ó pubescentes por arriba, pelúcido-punteados por debajo ó in-punteados [?]; peciolo común aguijonoso. Cimas axilares y terminales, sub-apanojadas Flores de tipo quinario, con cáliz y corola; 5 ovarios 11-oculares, coherentes inferiormente.

(2) El *Zanthoxylum Clava-Herculis* Lin. corresponde por completo al *Xanthoxylon Fraxineum* G.-M., nomen {*Zanthoxylum Fraxineum* Willd i *Zanthoxylum Clava-ferculis* Lam.k; *Zanthoxylum Caribceum* Gsertn.; non Lam.k *Zantlioxylum America' nutrí* Mili.; *Zanthoxylum ramijlomm* Mich.}, exótico.

(3) V. la nota anterior.

(4) El *Zanthoxylum Carolinianum* Lam.[^] es sinónimo de una especie exótica.

(5) Es la §.

- Xanthoxylon Pistaciasfolium G.-M., nomen [Zanthoxylum Pistaciasfolium Gris.]
- Bombacifolium G.-M., nomen [Zanthoxylum Bombacifolium Ridi..]—*Ayuda 'prieta, ayuda sin espinas.*
- Amyris sylvatica Jacq.—*Guabilla.*
- 6, Plumieri G.-M., nomen [Amyris Plumieri Cand.]—*Cimba de monte.*
- balsamifera Lin. [A. pinnata K.th; A. sylvatica Ricb.; non Jacq.; A. sylvatica Jacq.; var. Gris.]—*Cuabà blanca, palo de roble, sasafràs del país.*
- lineata "Wr.
- axilliflora Gris.
- marítima Jacq. [Amyris saussa Fernández, non Brus.?]—*Cuaba amarilla de costa, cuabà de costa, incienso, incienso de costa, palo de incienso, palo de resina.*

NOTA. En Cuba no existen el *Amyris Floridana* Nutt., ni el *Amyris diatrypa* Spreng., ni se llaman, por consiguiente, *Cuabà blanca*.

- Limonia trifoliata Lin. (Cult.?) [Tripbasia Cand.]—*Limonato de Cubai, limonato de China, limonato de Batavia.*
- Citrifolia Willd. (Cult.?) [Glycosmis Citrifolia Lindi.; Glycosmis heterophylla Rich.]
- Murraya exótica Lin. (Cult.!)—*Murray a, muralla.*
- Citrus medica Lin. (Cult.!) [Citrus medica Lin.; «, medica proper Hook., *The Flora of BritishIndia*, 1, 514].—*Cidra.*
- 0, Limonum Hook. (Cult.! sylv.?) (1).—*Limón* (agrio).
- Sub-var. *b*, Gallo-Limonum G.-M., nomen (Cult.!)—*Limón francés* (agrio).
- Sub-var. *c*, Peretta G.-M., nomen (Cult.!) [C. Limetta Risso; var. Peretta Cand.]—*Limón de ombligo* (agrio).
- Limetta Hook. (2) (Cult.!) [C. Limetta Risso; var. Limetta Cand., p. p.]—*Lima, lima criolla, lima de la tierra, lima de piquito.*

(1) Creemos que es el *Limón* citado por Sauyal. bajo el nombre de *O. Limonum* Cand.

(2) Sección *Limetta*.

- X hybr.? (Cult.!)—*Naranja lima*.
 Sub-var. *b*, G-allo-Lumia G.-M., nomen (1) (Cult.!)
 [C. Limetta Risso; var. Limetta Cand., p. p.]—*Limón dulce, limón francés dulce*.
 Citrus Aurantium Lin. (Cult.!) [C. Aurantium Lin.]
a, Aurantium proper Hook.—*Naranja de China*.
 Sub-var. *b*, melitense G.-M., nomen (Galt.)—*Naranjita de Malta, naranjita de sangre*.
 Sub-var. *c*, nobile G.-M., nomen (Cult.!) [C. nobile Lour.]—*Naranja mor eira*.
 j3, Bigaradia Hook. (1127).—*Naranja agria*.
 Sub-var. *b*, pulpse-dulci G.-M., nomen (Cult.! sylv.?)
 —*Naranja de Cajel*.
 Sub-var. *c*, Myrtifolia G.-M., nomen (Cult.!)—*Naranjita de San José, naranjito del Obispo*.
 Sub-var. *d*, macrocarpa G.-M., nomen (Cult.!)—*Toronja*.
y, Bergamia Hook. (Cult.)—*Bergamota*.

NOTA. En las especies donde no ponemos indicación alguna se sobrentenderá el término silvestre.

Simarúbeas.

- Castela erecta Turp. (2193).
 Simaruba glauca Cand. (2) (1159; 2187).—*Palo blanco*.
 — lsevis Gris.
 Spathelia simplex Lin. (2192).
 — vernicosa Tul. (2191).
 Tariri pentandra H. B.^o (64; 65) [Picramnia Sw.; P. micrantha Tul.]—*Aguedita, quina de la tierra, qtbina del país*.
 — Antidesma H. B.^o [Picramnia Sw.]—*Brasilete falso, brasilete bastardo*.
 — reticulata G.-M. (2188) [Picramnia Gris.]—*Marigoncillo*.
 Picrodendron Jugians Gris. (2274; 2275) [P. arboreum Planch.; Schmidelia macrocarpa Rich.]—*Yanilla*.

(1) Sección *lumia*.

(2) Sinónimo de *Simaruba officinalis* Cand.?

Suriana maritima Lin. (2028).—*Ciitabilla*.

Quassia amara Lin. (Cult.)—*Quasia*, *quasi*.

Malpigiáceas.

Galphimia glauca Cav. (2159. Cult.1)

Byrsonima cinérea Cand. (Sylv.)—*Peralejo blanco*.

— crassifolia K.»¹ (Sylv.); y, glabrata Gris. (2142); S, lanceolata G.-M., nomen (Sylv.); e?, Pinetorum G.-M., nomen (Sylv.) [Byrsonima Pinetorum Wr.] —*Peralejo*.

— Cubensis Juss. (2143).—*Peralejo de monte*.

— spicata Cand. (82).—*Peralejo de pinares*.

— chrysophylla K.^{1b} (Cuba?); P, lancifolia Gris. (2145).

— lucida Cand. (84; 2150) (1).—*Carne de doncella*.

— biflora Gris. (84).—*Sangre de doncella*.

Buncbosia nítida Cand. (87; 88; 89; 2149) [B. media Cand.?.; B. glandulosa Cand.?.; B. Swartziana Gris.?.]—*Airan de costa*.

Spachbéa parviflora Juss. (Sylv.)

— Ossana Juss. (Sylv.)

Malpigbia glabra Lin. (90).—*Cerezo*.

— urens Lin. (2) [M. Martinicensis Jacq.]; y, A. Juss. (2147) [M. lanceolata Gris.; M. urens Lin.; var. angustifolia Ricb.]; S, grossa G.-M., nomen (2146) [M. Cubensis K.^{1b}; M. angustifolia Gris., non Lin.; var. Cubensis Gris., *Cat. pl. Cub.*, non K.^{1b}]—*Palo bronco*.

— Punicifolia Lin. (85. Cult.) — *Cerecero*.

— oxycocca Gris. (83; 1583; 2148).—*Palo bronco de monte*.

— cnida Spreng. (100).—*Palo bronco*.

— setosa Spreng. (99) [Malpighia setosa Bert., non Malpighia Martinicensis Jacq.]—*Palo bronco*.

(1) Es erróneo el núm. 1150 citado en este punto.

(2) El tipo parece desconocido en Cuba. Sauval., *Fl. cui.*, 16., admite *MalpigMa urens* Lin. [*M. lanceolata*; var. *Cuàensis* Gris.]; esto es erróneo, pues Gris. no consideró la *U. Cnbensis* K.^{1b} como var. de la *M. lanceolata* Gris., sino de la *M. angustifolia* Lin., que para Cuba, donde no existe, empieo mal.

- Malpighia coccigera* Lin. (2150); β , *Ilicifolia* Wr. (2151)—*Palo bronco del pinar*.
- Henleophytum plumiferum* (1) [*Henleophytum echinata* Karst. *Henlea echinata* Gris.]
- Brachypterys Borealis* Juss. (2157).
- Stignaphyllon microphyllum* Gris. (93).—*San Pedro*.
- *faustinum* Sauval. (Sylv.)—*Bejuco San Pedro, de flor amarilla*.
- *diversifolium* Juss. (2153) [*Banisteria diversifolia* K.th]; β ?, *sericeum* G. M., nomen (2155) [*Stignaphyllon sericeum* Wr.]—*San Pedro*.
- *rhombofolium* Sauval. (Sylv.) [*S. puberum* Juss.?]—*Bejuco de San Pedro, de flor amarilla*.
- *Periplocifolium* Juss. {215i}.—*Bejuco San Pedro*.
- *Sagrasanum* Juss. (97).—*Bejuco San Pedro*.
- *lineare* Wr. (2156).—*Bejuco San Pedro*.
- Banisteria Ledifolia* K.th (Spec. dub.)
- *pauciflora* K.th (95; 1584; 2158.)
- Heteropterys Laurifolia* Juss. (92) [*Heteropterys pubiflora* Bello; *Triopterys pubiflora* Wickstr.; *Triopterys Guadalupensis* Wickstr.; *Banisteria?* *pubiflora* Cand.]—*Vergajo de toro*.
- Triopterys rigida* Sw. (96) [*T. lucida* K.th; *T. Havanensis* K.th]; β , *cerulea* G.-M., nomen (96) [*T. Jamaicensis* Lin.; non Sw.]—*San Pedro, de flor azul*.
- Tetrapterysequalis* Sauval. (Sylv.)

Poligaleas.

- Polygala longicaulis* K.th (1908).— *Polígala*.
- *brachyptera* Gris. (1912).
- *squamifolia* Wr. (1909).
- *Galioides* Poir. (1911) [*P. Saginoides* Gris.]
- *glochidata* K.th (1904th; 1905; 1907) [*P. Galioides* Gris.; non Poir.]
- *gracilis* K.th [1904?].—*Plumerito*.

(1) Autor? Sauval. no le asigna ninguno.—Es silvestre en Cuba.

- Polygala paniculata Lin. (1903; 1906).
 — spathulata Gris. (1910).
 — angustifolia K.th (112).
 — Planellasi Mol.' & G.-M. [P. peduncularis Rich.]
 — Domingensis Jaq. (115; 1914; 1915) [Badiera Cand.]—
Badiera.
 — diversifolia Lin. (1913); [Badiera Cand.]—*Badiera*.
 Phlebodeenia cuneata Gris. (113); obovata G.-M., nomen
 (1917).—*Flelotenia*.
 Securidaca virgata Sw. (1175).—*Flor de la cruz*.
 — Lamarckii Gris. (116; 1918).—*Flor de la cruz*. •
 — erecta Lin. [S. volubilis Rich.]—*Flor de la cruz*.

Leguminosas.

- Adenantha Pavonina Lin. (Cult.!)—*Coralillo, doja*.
 Entada scandens Benth.
 Prosopis Juliflora Cand.
 Neptunia plena Benth. [Mimosa plena Lin.; Desmanthus plenus Willd.; Desmanthus comosus Rich.; Neptunia Surinamensis Anders.]
 — pubescens Benth.
 Mimosa viva Lin.—*Dormidera*.
 — Ceratona Lin.
 — asperata Lin.
 — Fagaracantha Gris.
 — púdica Lin. (152).—*Sensitiva, vergonzosa*.
 — diplotricha Sauval.—*Sensitiva trepadora*.
 Leucsenia glauca Benth. [Acacia leucocephala Link; Rich.]—
Aromo Manco.
 Desmanthus virgatus Willd. (Cuba); /3, strictus Gris. (Cuba)
 [Desmanthus strictus Benth.]
 Acacia paniculata Willd. [A. microcephala Rich.]—*Tocino*.
 — Arábica Willd. (Cult.?)
 — maschalocephala Gris.—*Tocino*.
 — cornígera Rich. (!).—*Árbol del cuerno*.
 — villosa Willd.? [A. Valenzuelana Rich.]
 — Insularis Rich.
 — Farnesiana Willd.—*Aromo amarillo, cuji*.

- Albizzia Lebeck Benth. [acacia Lebeck Willd.; Acacia propinqua Rich.]—*Forestina, faurestina, cabellos de ángel?*
- Calliandra prehensilis Sauval.
- Porto-Riccensis Benth. [Acacia Porto-Riccensis Willd.; Acacia littoralis Rich.]—*Moruro de costa.*
 - Colletioides Gris. (153).
 - pauciflora Gris. [Acacia Rich.]
 - comosa Benth. (151; 154) [C. gracilis Gris.]
- Lysiloma Sabcu Benth.—*Sabicú, jigüe.*
- latisiliqua A. Gray.—*Júcaro bravo.*
- Pithecolobium Lentiscifolium Sauval., nomen [Acacia Lentiscifolia Rich.; Pithecolobium Vincentis Benth.; Acacia Vincentis Gris.]—*Humo.*
- cercinale Benth.
 - obovale Sauval., nomen [Inga obovale Rich.; Calliandra revoluta Gris.]—*Humo de sabana, cenizo.*
 - Saman Benth. [Calliandra Gris.]—*Algarrobo del país.*
 - Unguis-Cati Benth.—*Manca-montero.*
 - Asplenifolium Gris.
 - Calliandraeflorum Wr. [Inga hystrix Rich.; Calliandra hystrix Gris.?]—*Inga.*
 - Filicifblium Benth. (Cuba); var. (1191; 1191").
Moruro prieto.
- Enterolobium cyclocarpum Gris. (Cult.)—*Oreja de judío, árbol de las orejas.*
- Csesalpinia Jayabo G.-M., nomen (Cuba!) [Guilandina Bonduc Lin.; Guilandina Bonduc Ait.; a, majus Cand. Csesalpinia Bonduc Roxb.]—*Jayabo, güicalote amarillo.*
- p*, cyanosperma G.-M., nomen (Cuba!) [Guilandina Bonducella Lin.; Guilandina Bonduc Ait.; /3. minus Cand.; Glycyrhiza aculeata Forsk.; Csesalpinia Bonducella Flem.] (1).—*Guacaloteprieto.*
 - crista Lm.—*Brasílete colorado.*

(1) Esta especie tiene, además, las dos variedades siguientes: *y, microphylla* G.-M., nomen [Guilandina Cand.]: exótica. *J?*, *gemina* G.-M., nomen [Guilandina Lour.]: exótica.

- Caisalpinia pectinata Cav. [Coulteria tinctoria K.th Cassalpinia tinctoria Domb.; Poinciana Tara R. & Pav.; 'Coulteria Chilensis Cand.; Tara tinctoria Molin.; Poinciana spinosa Feuill.]—*Brasilete*.
- hórrida Rich. [C. Sepiaria Roxb.]
- pauciflora Sauval., nomen [Lebidibia Gris.]—*Di-
UdiM, guatapaná?*
- pinnata Sauval., nomen [Lebidibia Gris.; L. pauciflora Gris.; var. puberula Gris.]—*Cacalote, di-
Mdibi, ffuatapaná.*
- bijug-a Sw.—*Guacamaya de costa, palo de campeche.*
- coriaria Willd.—*Dibidibí, guaracabuya.*
- echinata Lam.^s (Cult.)
- pulcberrima Sw. (Cult.) [Poinciana Lin.]—*Gtiacamaya.*
- adnata G.-M. [Peltophorum adnatum Gris.]—*Moruro abey.*
- Pnrkinsonia aculeata Lin.—*Espinillo, junco amarillo, junco marino?*
- Haematoxylon Campechianum Lin. (Cult.; 143).—*Palo de campeche.*
- Colvillea racemosa Boj. {Gvlt.V)—*Flamboyant.*
- Pceppigia procera Presl. (145; 1596) [P. excelsa Rich.; Ramirezia Cubensis Rich.]—*Aley hembra, tengue.*
- Brownea grandiceps Jacq. (Cult.)
- Tamarindus Indica Lin. (Cult.!)—*Tamarindo.*
- Hymensea Courbaril Lin.—*Curbaril, algarrobo.*
- floribunda K.th (Cult.)—*Nazareno amarillo.*
- Bauhinia porrecta Sw. [Casparia Gris.] (1).
- megalandra Gris.—*Flor de azufre, malvira.*
- excisa G.-M., nomen (Cult.) [Schnella excisa Gris.]—*Bejuco tortuga.*
- variegata Lin. (Cuba?) [Omitida por Sauvalle].
- microphylla Vogel.
- heterophylla K.th—*Bejuco tortuga.*
- Cercis siliquastrum Lin. (Cult.!)—*Árbol del amor.*

(1) Kth es el autor? También son sinónimos suyos *Bauhinia awita* Ait. y *B. divaricata*, β, Lin.

- Cassia Fístula Lin. (*Culti*)—*Caña fístula*.
- grandis Lin. f. [C. Brasiliana Lam.¹; C. mollis Vahl.]—*Casia del Brasil*.
 - bicapsularis Lin. [Cassia bicapsularis Lin.; *P*, aristata Cand.; C. Berteri Collad.; C. bicapsularis Lin.; y, quadrijuga Cand.; C. Alcaparillo K.th; C. Limensis Lam.¹; C. pentagonia Mili.; C. innata Spreng.; C. Sennoides Jacq.]—*Sen del país*.
 - chrysotricha Collad. [C. chrysocarpa Desv.; C. virgata Rich.]—*Bejuco de la Virgen*.
 - ..emarginata Lin. [C. grísea Rich.?)
 - biflora Lin.— *Carbonero*.
 - glauca Lam.¹ [C. Surrattensis Burm.]—*Frijol de gallina*.
 - Ligustrina Lia. (149; 1190).—*Sen del país*.
 - decipiens Desv. (1601).—*Casia*.
 - Domingensis Spreng. (150).
 - chrysophylla Rich. [C. chrysotricha Rich.?.; non Collad.]
 - alata Lin. [Cassia herpetica Jacq.] (1). — *Guacamaya francesa, hierba de los herpes, hierba de los empeines*.
 - hirsuta Lin. f. [C. Caracasana Jacq.]—*Hierba hedionda mlluda*.
 - Occidentalis Lin. (Cuba!) [C. planisiliqua Lin.; C. fetida Roxb.; C. Caroliniana Walt.?.; C. Occidentalis Burm.]; *P*, glabra Cand. (Cuba) [C. geminiflora Schrank]; r, aristata Cand. (Cuba).—*Hierba hedionda, brusca, martinica*.
 - obtusifolia Lin. (Cuba); . (1602).—*Eierba guanina?, hierba hedionda, guanina*.
 - sericea Sw. (148) [C. ciliata Hoftmansegg?].— *Guanina, hierba guanina?*
 - diphylla Lin.
 - rotundifolia Pers.
 - pilosa Lin.
 - serpens Lin. (147).
 - lineata Sw. (Cuba); var. brachyloba Gris. (146).—*Platinino*.
 - cuneata Cand. [C. polyadena Gris.; non Cand.]

(1) Es var. exótica la *Cassia bmeteata* Lin. f.

- Cassia glandulosa Lin. [C. Chamsecrista Lin.; β , stricta Schrank.;
 C. pulchella Salisb.; C. virgata Sw.; C. ramosa Gris.;
 C. Swartzii Wickstr.]
- brevipes Cand.? [C. cuneata Gris.; non Cand.]
 - flexuosa Lin.
 - pygmaea Cand.
 - nictitans Lin. (1599).
 - patellaria Cand. (1600).
 - grammica Spreng.
 - Cubensis Hoffmansegg.
 - frondosa Ait. (Exótica); *a*, tenuissima Zuce. (Habana,
 según Cand.)
- Copaifera offleinalis Lin. (Cult.)—*Bálsamo de Copaiba*.
- Hymenoclea Moric. [Hymenoclea Courbaril Gris., non
 Lin.]—*Quiebra-hacha*.
- Cynometra Cubensis Rich.—*Pico de gallo*.

NOTA. Solamente presentamos el catálogo de todas las Leguminosas Mimoseas y Cesalpinieas de Cuba. Las leguminosas papilionáceas de esta isla nos ocupan en nuestro *Estudio sobre la representación de las Leguminosas papilionáceas en Puerto-Rico y en Cuba*.—En las especies donde no hacemos indicación alguna se sobrentenderá el término silvestre.

Connareas.

- Rourea glabra K. (2408).—*Mata-negro*.
- frutescens Aubl. (2407).
- Connarus reticulatus Gris. (59).

Rosáceas.

- Rubus durus Sauval. (Cuba); var. (Cuba).—*Zana*.
- ferrugineus Wickstr.—*Zana*.
- Spiraea Chamedyfolia Lin. (Cult.)
- Douglasii Hook. (Cult.)
- Eriobotrya Japonica Lindl. (Cult.)—*Nispero del Japón*.
- Prunus Occidentalis Sw. (156).—*Cuajaní*.

Prunus sphserocarpa Sw. (1193) [P. *Samydoides* Cham.] (1192)
[P. *pleuradenia* Gvis.]^h-*Cuajanicillo*.

Chrysobalanus montana G.-M. (Cult.) [Parinari *montana* Aubl.
Parinarium montanum Cand. (1). *Petrocarya montana* Willd.]—*Hicaco de montaña*,
icaco de montaña.

— *incana* G.-M. (Cult.) [*Licania* Aubl. *Hedycrea* Willd.]—*Hicaquillo*, *icaquillo*.

— *Icaco* Lin. (1607).—*Hicaco*, *Mcaco de costa*, *hicaco de playa*, *Mcaco dulce*, *icaco*, *icaco de costa*, *ficaco*.

— *mollicoma* G.-M. [*Hirtella mollicoma* K.th]; *H. nitida* Rich., non Lam.^h (2), non Gris. *H. glandulosa* Spreug^l.]—*Hicaco de aura*, *Mcaco negro*, *Mcaco peludo*, *Mcaco prieto*, *icaco de aura*, *icaco negro*, *icaco peludo*, *icaco prieto*, *palo mulato*.

— *triandra* Moral. (155) [*Hirtella triandra* Sw.; *H. Americana* Jacq.; *H. paniculata* Lam.^h; *H. punctulata* Miq.]—*Hicaco de aura*, *Mcaquillo peludo*, *icaco de aura*, *palo mulato*, *tela de yegua*.

— *Americana* Moral. [*Hirtella Americana* Aubl.; *H. nitida* Willd., Lam.^h, Gris.; *H. racemosa* Lam.^h; *H. hexandra* Willd.; *H. oblongifolia* Cand.; *H. rosea* Fl. Méx. icón, ined.; *H. filiformis* Presl.; *H. coriácea* Mart. & Zuce] — *Hicaco de aura*, *icaco de aura*, *siguapa*, *teta de yegua*.

NOTA Omitimos las especies, variedades é híbridos del género *Rosa* que se cultivan en Cuba. Véase nuestro *Diccionario botánico de los nombres migares cubanos y puerto-riqueños*, Habana, 1889. *Rosa*.

(1) Es erróneo el *Parinarium montanum* Aubl.

(2) Entiéndase *Hirtella nitida* Willd., planta cubana según Lamarck; especie que es actualmente el *Chryso oalanus Americanus* Moral.

Moringeas.

Moringa pterygosperma Gsertn. (1588).—*Palo jeringa, íen, paraíso francés.*

Celastráceas.

Evonymus cuneifolius Wr. (1140) [Maytenus Gris.]—*Quairaje de sierra.*

Celastrus lineatila G.-M. (2216) [Maytenus Wr.]—*Nazareno.*

- *Richardi* G.-M. (2213) [Maytenus Buxifolius Gris.; *Monteverdia Buxifolia* Rich.]; β , *parvifolius* G.-M. (2215) *Celastrus parvifolius* Rich.] (1); γ , *latifolius* G.-M. (2214^b); δ , *Cochlearifolius* G.-M. (2212) [Maytenus Gris.]; ϵ , *Elseodendroides* G.-M. (2214^c) [Maytenus Gris.; *Rhamnus polygamus* Vahl].—*Boje.*

Elfeodendron attenuatum Rich. (1144; 2206, p. p. 2207) [E. dioicum Gris.] —*Piñipiñi.*

Rhacoma integrifolia G.M., nomen (81) [Myginda Lam.¹]

- *Uragoga* G.-M., nomen (2208) [Myginda Jacq.]—*Mierda maravedí.*
- *pungeus* G.-M. (2211) [Myginda *Ilicifolia* Gris.; non Lam.¹; *M. pungens* Sauval.]
- *nana* G.-M., nomen (2210) [Myginda *Ilicifolia* Lam.¹; *M. Aquifolia* Gris. ?]
- *Vildosolseanum* G.-M. (Sylv.) [Myginda *latifolia* Sw.]
- *Crossopetalum* Lin., p. p. (2209) [Myginda *Rhacoma* Sw.]
- *pallens* G.-M., nomen (81^o) [Myginda Sw.]

Schsefferia frutescens Jacq. (77).

Hippocratea scandens Jacq. (1147) (Cult.!)

- *Malpighifolia* Rudg.—*Castaña purgante.*
- *ovata* Lam.¹ (80); β , *Sancta-Cruce* G.-M., nomen (1148).—*Bejuco de cruz.*
- *coriacea* Wr. (1585).—*Almendro.*

Salacia verrucosa Wr. (1146) [Anthodon verrucosus Gris.]

(1) Es erróneo el *Celastrus Buaifoliüs* Ricu., que cita Gris., *Cat. pl. Cub.*

Dicapetáleas.

Dichapetalum Cúbense G.-M., nomen [Chailletia Cubensis
Poepp. & Endl.]

Tapura Cubensis Gris. (1299; 2220).—*Vigueta naranja*.

Ilicineas.

Ilex minutiflora Ricb. (1) (2218).

— Dahoon "Walter (2217) [I. lanceolata Gris.]

— montana Gris. (78; 79?) [I. Cassine Rich.; non Ait.; Prinos
montanus Sw.; P. Sideroxyloides Sw.]—*Acelo de Sierra,*
acelo eulano.

— repanda Gris. (1142; 1143) [I. dioica Gris.; Prinos dioicus
Vani].

— Celastroides Kl.? (Sylv.)

— Occidentalis Macf. (79?; 1141) [I. Celastroides Gris.; non
Kl.]—[^]*celo*.

Pittospóreas.

Pittosporum undulatum And. (Cult.)

Olacineas.

Ximения Americana Willd. (2642).—*Tana, jia manzanilla, ci-*
ruelo cimarrón.

Schcepfia Chrysophylloides Planch. (2637) [Diplocalyx Rich.]

— didyma Wr. (2641).

— obovata Sauval.

Mappia racemosa Jacq. (1389, posterior); β , brachycarpa Gris.
(1389, prior; 1578); γ ?, angustifolia G.-M., nomen (2638)
[M. angustifolia Gris.]

Poraqueiba Cubensis ¥ r. (2639).

(1) Es errata /. *minuti/olia* Rich.

Ramneas.

- Rhamnidium revolutum "Wr. (2206, p. p.; 2097) [Elteodendron xylocarpum Gris., para las exsiccatas cubanas; non Cand.!]—*Almendrillo de costa, piñipiñi de sabana.*
- retusum Gris. (Sylv.)—*Almendrillo.*
- reticulatum Gris. (Sylv.)—*Almendrillo.*
- Sarcomphalus Havanensis Gris. (1298) [Zizyphus Havanensis K.^{1b}]—*Anofaifa de costa.*
- divaricatus Gris. (Sylv.)—*Azofaifa de playa.*
- acutifolius Gris. (Sylv.)—*Azofaifa de costa.*
- Colubrina reclinata Brongn. (76) [Ceanothus reclinatus L'Hérit.~\—*Bijàgura?, jayajadico.*
- acuminata Gris. (Sylv.)—*JayajaMco.*
- Cubensis Brongn. (1139) [Ceanothus Cubensis Lam.⁴]—*Bijàguara, palo mali.*
- ferruginea (1) Brongn. (Sylv.) [Ceanothus Colubrinus Lam.⁵; Ceanothus arborescens Mili.]—*Fuego, bijàguara.*
- Zizyphus Spina-Christi Willd. (Cult.)—*Azofaifa de la espina de Cristo.*
- rugosa Lam.⁶ (Cult.)
- Condalia latifolia G.-M., nomen (Sylv.) [Reynosia latifolia Gris.]
- mucronata G.-M., nomen (Sylv.) [Reynosia mucronata Gris.]
- retusa G.-M., nomen (Sylv.) [Reynosia retusa Gris.]
- Gouania Domingensis Lin. (Sylv.)—*Bejuco leñatero, jaboncillo "bejuco.*
- tomentosa Jacq. (Cuba?); \ddagger , pubescens Gris., *Pl. Wright. Cuba (75).*

(1) Muchos autores admiten *ferruginosa.*

SUBORDEN II.—**Dialipétalas inferovariadas.**

Cáceas. — Saxifragáceas. — Litráceas. — Combretáceas. — Mirtáceas. — Loáceas.—
Umbelíferas.—Araúceas. — Córneas.

Cáceas.

- Rhipsalis Cassytha Gsertn. (206).—*Disciplinaria, disciplinilla.*
Opuntia vulgaris Mill. (Cult.)—*Tima brava, luna silvestre.*
— Cochinchinifera Mill. (Cult.)—*Tuna mansa.*
— Tuna Mili. (Sylv.)— **Tum.**
— dejecta Salm-Dyck (Cult.)
— triacantha Cand. (Sylv.) [Cactus triacanthus Willd.]
— macrantha Gris. (2625).
— hystrix Gris. (Sylv.)
Pereskia aculeata Mill. (2626. Cult.)—*Grosellero.*
— Portulacsefolia Haw. (205).—*Abrojo de la Florida.*
Melocactus communis Link & Otto (2618).—*Cardón, tuna ca-*
bezuda.
Cereus senilis Salm-Dyck (Cult.)—*Cabeza de viejo.*
— assurgens Yr. (2622).
— triangularis Haw. (Cult.)—*Flor del cáliz.*
— Royeni Haw. (2621).
— eburneus Salm-Dyck (Sylv.)
— pellucidus Pfeiff. (2623).—*Jijira.*
— Pitajaya Cand. (2624).—*Pitahaya, pitajaya.*
— eriophorus Link & Otto (207).—*Patana.*
— nudiflorus Engelm. (3570).
Mammillaria pusilla Cand. (2619).
Epiphyllon Phyllanthoides G.-M., nomen (Cult.) [Epipliylum
speciosurn Haw.; Cereus Phyllanthoides Cand.]— *Pluma*
de Santa Teresa.

Saxifragáceas.

- Weinmannia pinnata Lin. (1250) [*W. glabra* Cand., p. p. non Lin.]
 Brunellia Comocladifolia K.th (60; 1133).
 Hydrangea Hortensia Cand. (Cult.)—*Hortensia, rosa delJapón*.

Litráceas.

- Lytbrum virgultosum Gris. (Sylv.)
 Ginora Americana G.-M., nomen (160) [*Ginoria Americana* Jacq.]—*Rosa del rio, clavellina*.
 — spinosa G.-M., nomen (2545) [*Ginoria spinosa* Gris.]—*Cuaresmilla espinosa, clavellina espinosa*.
 — glabra G.-M., nomen (2544) [*Ginoria glabra* Gris.]—*Cuaresmilla de paredón, clavellina de paredón*.
 Cuphea Swartziana Spreng. (2535) [Sinónima de *Cupbea* Par-,
 , *sonsia* R. Br. & Steud.?
 — Pseudo-Silene Gris. (2534).
 — Pseudo-Melanium Gris. (161^o p. p.; 1236).
 — Parsonsia R. Br. & Steud. (161^b, p. p.; 2540) [*G. Swartziana* Rich. non Spreng.?
 ; *C. Hyssopifolia* Gris.; non Kunth],
 — virgata Cav. (Cult.)
 — Ranunculoides Gris. (2538).
 — Lobelioides Gris. (2539).
 — Gratioloides Gris. (2537).
 — decandra Ait. (334).
 Lagerstrœmia Indica Lin. (Cult.)—*Júpiter*.
 Lawsonia alba Lam.^b (Cult.) [*L. inermis* Lin.; *L. spinosa* Lin.]
 —*Reseda francesca*.
 Diplusodon Ginorioides Gris. (2546).—*Cuaresmilla áriol*.
 Ammania longipes G.-M., nomen (!) [*Ammannia longipes* Sauvai.]
 — lingulata G.-M., nomen (161^o, p. p.) [*Ammannia lingulata* Gris.]
 — latifolia G.-M., nomen (161^b, p. p.) [*Ammannia latí-*

- folia Lin. ; *Ammannia ramosior* Lin., p. p.; *Ammannia octandra* Lin.; *Ammannia coccínea* Pers.;; *Ammannia?* *sagittata* Cand.? (1); *Jussisea sagittata* Poir.?.; *Ammannia sanguinolenta* Rich., non Sw.]
- Ammania humilis* G.-M., nomen (2541) [*Ammannia humilis* Mich.⁴; *Ammannia ramosior* Lin., p. p.; *Ammannia purpurea* Lam.⁴; *Ammannia Occidentalis* Cand.; *Peplis Occidentalis* Spreng.]
- *Spruceana* G.-M., nomen (2543) [*Ammannia Spruceana* Benth.]

Combretáceas.

- Combretum eriopetalum* Don [*Poivreia eriopetala* Cand.]
- *viscidum* "Wr. (Sylv.)
- Quisqualis ebracteata* P. Br. (Sylv.)
- *Indica* Lin. (Cuit.!)—*Quisqualis, Pisquala.*
- Laguncularia racemosa* Gasrtn. f. (Sylv.)—*Pataián.*
- Terminalia eriostachya* Rich. (Sylv.)—*Almendo de la India**
- *Catappa* Lin. (Cuit.!)—*Almendo de la India.*
- *Chicharronia* Sauvai., nomen (Sylv.) [*Chicharronia intermedia* Rich.; *Chuncoa Chicharronia* Gris.]—*Chicharrón.*
- *arbuscula* Sw.? (Cuba); /3, *Xanthonia* G.-M., nomen (Sylv.) — *Chicharrón amarillo, chicharrón de monte.*
- *capitata* Sauvai., nomen (Sylv.) [*Bucida* Vahl.; *Buchenavia* Eichl.]—*Júcaro amarillo.*
- *Molineti* G.-M. (Sylv.) [*Bucida angustifolia* Rich.; non Cand.; *Terminalia angustifolia* Sauvai., nomen; non Jacq.]—*Arará de hojas angostas, júcaro bravo, júcaro espinoso, júcaro prieto.*
- *Buceras* H. B.⁴, nomen; Sauvai., nomen (Sylv.) [*Bucida Buceras* Lin.; *Bucida angustifolia* Cand.] —*Arará, mangle prieto?, júcaro de playa.*

(1) Sauval. da & entender que es sinónima de la *Ammania latifolia* G.-M., nomen la *Ammania sagittata* Rich.!, no Cand.; lo que no rarece cierto, y sí que esta última especie de Cand. es sinónima de aquella.

Terminalia erecta G.-M. (Caba!) (Y).—Zaragoza, yana.
procumbens G.-M. (Cuba!) {2}.—Mangle lotón.

Mirtáceas.

Myrtus elliptica Sauval.

- *communis* Lin. (Cúit.!)— *Arrayán*.
- *leriocarpa* Sauval. nomen [Anamomis ferruginea Gris.]
 — *Pimiento cimarrón*.
- Guayavillo Sauval., nomen [Eugenia Guayavillo Ricb.; Eugenia granulata Berg.; Anamomis Guayavillo Gris.].—*Pimiento cimarrón, de arroyo*.

Pimenta communis Lindl. (Cult. 479) [P. officinalis Berg.; Lindl. ?; P. vulgaris W. & Arn.; Eugenia Pimenta Cand.; *Myrtus Pimenta* Lin.].—*Pimienta de Jamaica*.

Myrcia.—4 especies cubanas (3).

Calyptrantbes Syzygium Sw.—*Mirto de rio*.

- *calyptrata* Gris. (165).
- *gracilipes* Sauval.
- *micrantha* Y r. [C. Thomasiana, var. obscura Gris.; non Berg.]
- *punctata* Gris. (1204).
- *capitulata* Wr. [*Marlieria* (4) elliptica Gris.]
- *rostrata* Gris. (174; 1216).
- *Chytraculia* Sw. (163; 172) [*Calyptrantbes pal-lens* Gris.]

(1) Sección *Conocarpus* H. B." *Hist. displ.*, vi, 26i [*Conocarpus* Gsertn.]

Sub-sección *Euconocarpus* G.-M. [*Conocarpus*, sect. i *Euconocarpus* Cand., *Prod.*, ni, 16]. Especie americana y africana [Senegal, etc.]

T. erecta G.-M. Hojas enteras, alternas, generalmente biglandulosas en la base, sub-carnosas. Estambres 5; anteras versátiles. Flores pequeñas en capitulos globulosos, reunidos en panojas. Tallo arbóreo. Hojas oblongas, generalmente acuminadas, lampiñas ó sub-pubescentes en la juventud. ¿ *Conocarpus erecta* Jacq.; *C. erecta* K."; a, *arbórea* Cand.

• (2) Tallo ramosísimo; ramas erguidas ó rampantes. Hojas ob-ovadas ó sub-redondas, acuminadas, lampiñas. 5 *Conocarpus procumbens* Jacq.; *C. acutifolia* Willd.; *C. erecta* K."; j3. *procumbens* Cand.

(3) Véase nuestro *Ensayo de Farmacología cubana*.

(i) Esta especie no es realmente una *Marlieria*, sino el *Cahjpranthes* indicado; como no lo es tampoco la *Marlieria glomerata* Gris., non Berg., sino tal vez una *Eugenia*: la *Eugenia? discolorans* Sauval., nomen. El género *Marlieria* quizá no sea mas que una simple sección del *Calyptranthes*.

- Calyptrantbes rigida Sw. (166).— *Mije*.
 — rotundata Gris. (1215).
 — Ottonis Sauval., nomen [Mitrantbes Ottonis-Berg.]
 — Cubensis Berg.
 — enneantba Sauval.
- Psidium.— 8 especies cubanas (1).
- Eugenia revoluta Berg. (2).
 — sylvicola Sauval., nomen (3) (167; 1212) [E. revoluta Gris.; non Berg.]
 — Actiniflora Gris. (4).
 — megalopetala Gris.—*Cerezo del pinar*.
 — rigidifolia Ricb.—*Biriji de Jiojas menudas', tomillo de costa*.
 — Pbillyreifolia Ricb.
 — ramosa Sauval., nomen [Myrtus Sagraa Berg-.]
 — tuberculata Cand.?— *Cfrajo*.
 — macrostemon Berg.
 — Baruensis Jacq. [E. glabrata Cand. (5); E. montícola Cand.]—*Guairaje*.
 — Matanzencis Berg.
 — Yumuriensis Berg.
 — Ligustrina Willd. (169; 1208).—*Biriji*.
 — retivenia Sauval.' [E. mucronata Gris.; non Berg.]
 — uniflora Lin.—*Cerezo de Cayena*.
 — Jambosoides Wv.—*Poma rosa, cimarrona*.
 — floribunda "West.? (1209) [Myrciaria floribunda Berg?]
 — procera Poir. (173?; 1612) (91; 1211) [E. pallens Gris.; non Cand.]—*Biriji*.
 — retinadenia Sauval.
 — Faramoides Rich. (6).
 — Gregii Cand. (7).

(1) Véase nuestro *Ensayo Se Farmacología cubana*.

(2) Véase la nota 3.

(3) ¿De qué especie — *E. revoluta* Berg.; *E. sylvicola* Sauval., nomen — es sinónimo la *E. heteroptlylla* Rich.?

(4) Será *E. Catingiflora* Gris.?

(5) Véase la nota de la *Eugenia Poiretii* Cand.

(6) Sauval. no la cita. .

(7) ídem.

- Eugenia cyphophlasi* Gris.—*Biriji*.
 — *sessiliflora* Cand.
 — *Buxifolia* "Willd. (1) (1613) [E. *laterifolia* Gris., non Willd.; E. *sessiliflora* Ricb.?.; non Cand.]—*G-uairaje de hojas omladas*.
 — *Poiretii* Cand. [E. *Buxifolia* Gris., *Pl. Wnglit. Cuba*, pág. 182 (2); non Willd.; E. *glabrata* Gris.; non Cand.]—*Biriji*.
 — *crenulata* Willd. (Cuba?); var. (!).
 — *disticba* Cand.—*Guairaje*.
 — *Vitis-Idasa* Sauvai.
 — *brevipes* Ricb.
 — *Camarioca* Sauvai.
 — *cincta* Gris. (1205).—*Pimiento de costa*.
 — *Jambos* Lin. (!).—*Poma-rosa*.
 — *Rosmarinifolia* Poir.
 — *Xystopbylla* Berg.
 — *Àsterifolia* Berg.
 — *Coffeifolia* Cand. (Cul.?)
 — *plicatula* Sauvai.
 — *virgultosa* Cand. (171).
 — *lineata* Cand. (1194; 1200) [E. *Bergiana* Gris.; *Stenocalyx Pseudo-Psidium* Bérq.]—*Gfuairajecillo, guairajillo*.
 — ? *discolorans* Sauvai., nomen [Marlieria (3) *glomerata* Gris.; non Berg.]
 — *cristata* Sauvai., nomen [Myrcia'coriacea Cand.; var. *Swartziana* Gris.; non Cand.] (1203) [*Calyptranthes decandra* Gris.]
 — *Domingensis* Berg? (164; 1202).
 — *scapbepbylla* Sauvai.

NOTA. El *Aulacocarpus WrigMii* Gris., *Cal. pl. Cui>*., página 99, es una melastomácea cubana, el *Mouriri spatmlata*

(1) Véase nota 2.

(2) La sinonimia de la *E. Buxifolia* "Willd. y *E. Poiretii* Cand. es la que admite Salival., í7. *Cub.*, páginas 42 y 43. Gris., *Pl. Wright. C«ía*, p. 182, admite: *E. Buxifolia* Willd., exsiccatas Wrig'htianas números 168,1210,1213,1214. Todos estos números ¿sonde la *Eugenia Poiretii* Cand.? Gris., *loe. cit.*, admite: *E. glabrata* Cand., exsiccatas Wrightianas números 1206, 1207. Ambos números ¿son de la *E. Poiretii* Cand.?

(3) Véase la nota del *Calyptranthes capitulata* Wr.

G.-M., nomen, de la que es también sinónimo el *Mouriria spatulata* Gris. En la isla se dice *Mirto del país* (1).

Calycorectes Cubensis Gris.

— procratus Gris. •

Púnica Granatum Lin. (Cult.)— *Granado*.

— nana Lin. (Cult.)— *Granado enano*.

NOTAS. Se trata de aclimatar algunas especies de *Eucalyptus*, dando basta la fecha mejor resultado el *E. resinífera* Sm. —En las especies que no tienen indicación alguna se sobrentenderá el término silvestre.

Loáceas.

Mentzelia áspera Lin. (208).

Umbelíferas.

Hydrocotyle umbellata Lin. (214).—*Omblijo de Venus, quitasolillo*.

r* Ranunculoides Lin. f. (2635) [H. natans Cyr.?]—
Sombrerillo de agua.

— leptostachya Rich. (2634).

•*r spicata Lam.^k (213).

— Asiática Lin. (3572).

— pygmea SauvaL (3571).

Asciadium coronopifolium Gris. (2633).

Eryngium foetidum Lin. (215).—*Culantro cimarrón, hierba del sapo*.

Ammi Visnaga Lam.^k (Cult.)—*Viznaga, perlas?*

Carum Petroselinum Bentb. & Hook. (Cult.)—*Peregil*:

Feniculum vulgare Gsertn. (Cult.)—*Hinojo común*.

(Enantbe Peucedanifolia Poli (Cult.)—*Perejil isleño?*

Peucedanum graveolens Benth. & Hook. [(Cult.)— *Eneldo*.

— Assa-fetida H. B.ⁿ, nomen (Cult.?)—*Asa-fétida*.

Apium leptophyllum G.-M., nomen (Cult.) [Helosciadium leptophyllum Cand.]

(1) Véase nuestro *Ensayo At Farmacofitología cubana*.

Apium graveolens Lin. (Cult.!)—*Apio*.

Daucus Carota Lin. (Exótica); /3, sativa Cand. (Cult.!) (1).—*Zanahoria*.

Aralieas.

Didymopanax undulatum Dec.^{***} & Planch. (211) [*Panax speciosum* Willd.~\—*Yagruma macho*, *f adero*, *Fauruma?*]

— *Morototoni* Dec.^{***} & Planch. (2) [*Panax* Aubl.]

-*Panax fruticosum* Lin. (Cult.)

Heteropanax fragrans Seem. (Cult.) [*Panax* Roxb.]

Hederá elegans G.-M., nomen (Cult.) [*Aralia elegans* Lindl.; *Oreopanax elegans* Dec.^{***} & Planch.]—*Aralia elegante*.

Schefflera Samydsifolia G.-M., nomen (2632) [*Sciadophyllum Samydidifolium* Wr.; *Dendropanax Samydsifolium* Sauval.] (3).

— *cuneifolia* G.-M. (4) (2631) [*Hederá cuneifolia* Wr.; *Dendropanax cuneifolium* Sauval.?] (5).—*Vibona*.

— *arbórea* G.-M., nomen (212) [*Hederá arbórea* Sw. *Dendropanax arboreum* Dec.^{***} & Planch. *Sciadophyllum Jacquini* Gris.]—*Vibona*, *palo cachimba*, *ramón de vaca*.

Córneas.

Garrya Fadyenii Hook. (492) [*Fadyenia Hookeri* Endl.]

<1) Presenta muchas sub-variedades, délas cuales algunas se cultivan en Cuba.

(2) Parece una especie mal empleada por Rich., el cual usa el nombre de *Panas* *Morototoni* Aubl.

(3) Esta especie no es de Wr., sino de Sauval., careciendo de descripción.

(4) Sección *Dendropanax* *Y. B.nffist. pl.*, vn, 162. [Hojas simples, enteras ó 3-5 Adas. Flores 5-meras, con las divisiones estilares en gran parte independientes ó reunidas én un cono apenas almenado en elápice, ofreciendo todos los grados intermediarios. Arboles y arbustos.]

S. cuneifolia G.-M. Hojas enteras, cuneado-espataladas, lampiñas, superiormente vesiculoso-punteadas. Pedúnculos comprimidos, mayores ó casi iguales que las hojas: pedicelos patentes. Cáliz de limbo sub-integro, tubo turbinado. Estambres exsertos, doble más largos que la corola. Cuba.

(5) Esta especie no es de Wr., sino de Sauval., careciendo de descripción.

ORDEN II. — **GAMOPÉTALAS.**SUBORDEN I. — **Gamopétalas Superovariadas.**

Ericáceas. — Ciríleas. — Primuláceas. — Plurnbagíneas. — Mirsíneas. — Sapoteas.— Ebenáceas. — Estiráceas.—Borragíneas. — Hidrofileas. — Polemoniáceas. — Genciáneas.—Loganieas.— Oleáceas.— Labiadas. — Dtricularieas. — Bignoniáceas. — Selagináceas.—Plantagíneas.

Ericáceas.

Clethra Cubensis Rich. (343) [C. *Byrsonimoides* Gris.]

Andrómeda glandulosa Sauval., nomen (2195) [*Leucothoe glandulosa* Rich.; *Lyonia glandulosa* Gris.]; β , *ovatifolia* G.-M., nomen (2196) [*Lyonia Myrtilloides* Gris.]—*Clavellina*.

— *obtusa* Sauval., nomen (2203) [*Lyonia* Gris.]—*Clavellina*.

— *Jamaicensis* S/w. (Cuba) [*Lyonia* Don.; *Leucothoe* Rich.]; *s*, *Myrsinifolia* G.-M., nomen (1635) [*Leucothoe* Rich.]—*Clavellina*.

— *latifolia* Sauval., nomen (2197) [*Leucothoe* Rich. *Lyonia* Gris.]—*Clavellina*.

— *lacustris* Sauval. (3664).—*Clavellina*.

— *Cubensis* Gris. (2198).—*Clavellina*.

Kalmia Ericoides Wr. (2199).

Befaría Cubensis Gris. (2200).

Vaccinium Cúbense Gris. (342) [*Thibaudia Cubensis* Rich.]; β , *Ramoni* G.-M., nomen (2201; 2202) [*Vaccinium Ramonii* Gris.]

— *assimile* Sauval., nomen [V. "Wrig-htü Gris.; non A. Gray].

Ciríleas.

Cyrilla Antillana Mich.¹—*Llorona*.

Costtea Cubensis Rich. (1) (2204) [*Purdisea monodynamia* Gris.]

(1) Omitida por Sauval., lo mismo que la especie siguiente.

Costsea stenopetala G.-M., & Mol.* (1) (341) [Purdisea Gris.];
JS angustifolia G.-M. & Mol.* (2205) [Purdisea Wr.]

Primuláceas.

Centunculus pentandrus R. Br. (2889).
Samolus floribundus K.th (2887).
 — *ebracteatus* K.*^b (2888).
Cyclamen Europasum Lin. (Cult.)—*Pan-porcino*, *solitaria*.

Plumbagíneas.

Plumbago scandens Lin. (4672).—*Jazminillo*, *mala-cara*.
 — *Capensis* Thunb. (Cult.)—*Embeleso*, *jazmín azul*,
azulejo, *velesa*.
 — *casrulea* K.*^b (Cult.)—*Velesa*.
 — *rosea* Lin. (Cult.)—*Velesa morada*.

Mirsíneas.

Myrsine leeta A. Cand. (350).
 — *coriácea* Rcem. & Schult. (2) (3622).
 — *Rapanea* Rcem. & Schult. (2906) [*M. floribunda* R. Br.
M. Cubana A. Cand.]
Cybianthus Bumelioides G.-M. & Mol.' (351) [*Ardisia* Gris.
Conomorpha Gris.]—*Curiana macho*, *suriana*
macho.
 — ? *Jacquinoides* G.-M., nomen (349) [*Ardisia* Jac-
quinoides Gris. *Conomorpha Jacquinoides*
 Gris.]

(1) *C. stenopetala* G.-M. & Mol.¹ Sépalos exteriores 3, aovado-oblongos, obtusos, igualando á la corola en longitud, pero más anchos; los dos interiores menores, aovado-lanceolados, agudos, la mitad del largo de la corola. Pétalos oblongos, obtusamente apiculados. En los demás caracteres esta especie se parece á la *Costma nutans* [Purdima.] Cuba.

¡5, *angustifolia* G.-M. & Mol.¹ Sépalos exteriores desiguales. Cuba.

(2) Sauval. la asigna como autor & R. Br.

- Wallenia Clusisefolia Gris. (352; 460; 1332; 2908).— *Casmagua, Quacamari.*
- Laurifolia Sw. (Sylv.!)—*QuacamaH comen.*
- Ardisia acuminata Willd. (2909) [Icacorea dentata A. Cand.]—
Tapa-camino.
- multiflora Gris. (1334).
- Pickeringia Torrey & A. Gray (2911).
- Parathesis Cubana Mol.' & G.-M. (Sylv.!) [Ardisia A. Cand.]—
Agracejo de sabana.
- Jacquinia linearis Jacq.? [Jacquinia aristata Jacq.?] (1).—*Espuela caballero, de costa.*
- Ruscifolia Jacq. (2) (Cuba!); ß, velutina A. Cand. (Cuba!)—*Espuela caballero, rosetillo.*
- Berterii Spreng. (2914; 2915).—*Espuela caballero, del pinar.*
- Teophrasta Americana Sw.?(2916).—*CMcharroncillo de paredón.*

Sapoteas.

- Chrysophyllum argenteum G.-M., nomen? (Cult.? sylv.?) [Chrysophyllum argenteum Jacq.] (3).—*Caimito blanco:*
- Caimito G.-M., nomen (344, p. p.) [Chrysophyllum Cainito Lin.]— *Caimito.*
- 7, cseruleum G.-M., nomen (Silv.!) [Chrysophyllum Cainito.Lin.; y, cseruleum Jacq.]—
Caimito morado.
- monopyrenum G.-M., nomen (344, p. p.; 1322) [Chrysophyllummonopyrenum Sw.; Chrysophyllum Oliviforme Lam.¹; excl. ß, Lam.¹]; ß, microphyllum G.-M., nomen (Sylv.!) [Chrysophyllum microphyllum A. Cand.] — *Caimitillo.*

(1) A la *J. linearis* Jacq. ¿corresponden las exsiccatas Wrightianas números 2912 y 2913? No creemos que sea sinónimo de esa especie la *J. aristata* Jacq. que hemos encontrado en el Vedado, Marianao, etc.

(2) ¿Es el tipo el número Wrightiano 353?

(3) Creemos que es un mal empleo de la esp. de Jacq. en vez de la de Lin. (*Caimito*).

- Chrysophyllon g-labrum G.-M., nomen (345; 1328; 1636?) [Chrysophyllum glabrum Jacq.]—*Caimitillo*.
- Lúcuma nervosa A. Cand. (Cuba!)—*Canistel, canisté, macuá*.
- Mammosa Geertn. f. (Cult.);/?/, Bonplandi G.-M., nomen (Cult.) [Lúcuma Bonplandii K.th]—*Mamey colorado, mamey japote*.
 - dictyoneura G.-M. (1329; 1330, sec. Gris.; 1830, sec. Sauval., 2923) [Bumelia nigra Sw.; Dipholis nigra Gris.; Labatia dictyoneura Gris.; Sideroxylon dictyoneurum Gris.]—*Cocuyo de fruto chico*.
 - Chrysophyllifolia G.-M. (2929) [Labatia? Cbrysophyllifolia Gris.]—*Sapote culebra de costa*.
 - Serpentaria K.th (2924; 2925); % pauciflora G.-M., nomen (Sylv.) [L. pauciflora A. Cand.]: forma latifolia Gris. (346; 346^o); y, elliptica G.-M. (Cuba) [L. pauciflora A. Cand.; 0, elliptica A. Cand.]—*Sapote culebra*.
 - "Valenzuelaca Ricb. (2926).—*Sapote culebra, siguapa*.
- Achras Sapota Lin. (Cuba!)—*Sapote, níspero, zafóte*.
- forma asperma G.-M. (1) (Cuba!).—*Sapote sin semillas*.
- Sideroxylon Masticbodendron Jacq. (Exótica); j3, pallidum G.-M., nomen (1324) [S. pallidum Spreng.; Bumelia pallida &*w.]—*Jocumaprieto, jocuma amarilla, ébano amarillo, caguani*.
- polita Mart. (1323) [Sapota Gris.]—*Sapotillo árbol*.
 - confertum Sauval. (3920) [Bumelia cuneata Gris., *Cat. pl. Cub.*; non *H. Br. W. Ind. Islands*; non Sw.]—*Cocuyo*.
 - ? species Sauval., *Fl. cub.*, 86.
- Dipholis Salicifolia A. Cand. (1325).—*Jocuma amarilla, jocuma blanca, Carolina, cuya*.
- Bumelia Cubensis Gris. (1326; 1327?; 1637; 2921) [Dipholis montana Gris., non Bumelia montana Sw.?^o]
- glomerata Gris. (347).
 - parvifolia A. Cand.

(1) Semillas abortadas por el cultivo ó espontáneamente, según la naturaleza del terreno.

- Bumelia hórrida Gris. (2922).—*Jiqui espinoso, jequi espinoso, sapote espinoso.*
 — tortuosa Sauvai. (3623). " "
 — microphylla Gris. (2922). "
 — retusa Sw. (2928).—*Cocuyo.* "
- Labourdonnaisia albescens Benth. (2919) [Bassia albescens Gris.; Sapota Ácana Moral; Sapota Marta Moral].—*Ácana.*
 Bassia latifolia Roxb. (Cuba? cult.?)
 Mimusops dissecta R. Br. (2927).—*Ácana de costa.*
 — Jaimiqui Yr. (2918).—*Jaimiqui.*
 Henoonia Myrtifolia Gris. (2940, sec. Gris.; 3930, sec. Sauval. (1).

Ebenáceas.

- Diospyros tetrasperma Sw. (348).—*Ébano real, ébano carbonero.*
 — Halesioides Gris. (2936, Q; 2937).
 — Laurifolia Rich. (Cuba!).—*Sapote negro.*
 Maba Caribfea G.-M., nomen (1331) [Maccreightia Caribsea A. C&Yl.][^] *Vigueta hembra.*
 — Grisebacbi G.-M. (2938) [Maccreightia Buxifolia Gris.]

Estiráceas.

- Styras obtusifolius Gris. (2931).—*Azulejo de loma, aceituno silvestre.*
 Symplocos Martinicensis Jacq. (2932).—*Azulejo del pinar.*
 — Cyponimoides Gris. (2933).
 — Cubensis Gris. (1135; 1321).—*Azulejo de sabana.*
 — Salicifolia Gris. (2934).—*Azulejo déla isla de Pinos.*
 — ovalis Wr. (2935).—*Azulejo del Rosario.*

Borragíneas.

- Cordia angustifolia Rctn. & Scbult. (Sylv., sec. Gris.)

(1) Creemos que el último número es el verdadero, siendo erróneo el citado en este punto por Gris., *Caf. pi. Cut.* En realidad el número 2910 es una oleácea cubana, la *Forestiera Cassinoides* Poir.

- Cordia speciosa* Willd. (3654) [C. Sebestén» Lin., p. p.]—*Vomitel sebestenaf, vomitel encarnado, wmitel colorado*.
- *rotundifolia* R. & Pav. (Cult.!) [Varronia Cand.]—*Ateje amarillo, par aiso de Méjico, uva gomosa*.
- *alba* Roem. & Scbult. (425) [Varronia calyprtrata Cand.]—*Varia Manca, ateje Manco, capa blanca, uva gomosa*.
- *scabrifolia* Cand.? (Cuba).—*Fornii amarillo, vomitel sei estena?*
- *Gerascanthus* Jacq. (1644).—*Varia, baria?, capa rota, cafa prieta, palo de rosa del pais*.
- *bracteata* Cand. (Cuba, sec. Cand.)
- *Gerascantboides* K.th (424; 1369).—*Varia, daría?*
- *adnata* Cand. (Cuba?).
- *nitida* Willd.!! (Sylv.!! 1368).—*Vomitel Manco, ateje hembra, ateje macho, atej ilio*.
- *tremula* Gris.? (Sylv.)—*Ateje*.
- *angiocarpa* Ricb. (3653).—*Carey, carey de costa, carey vegetal*.
- *Galeottiana* A. Ricb. (3110).—*Vomitel Manco*.
- *Leuco-Sebestena* Gris. (3111).—*Vomitel Manco, Merro de costa*.
- *Callococca* Lin.? (3652).—*teje*.
- *sulcata* Cand. (427).
- *Ulmifolia* Juss. (423); *r, lineata* Cand. (Sylv.)
- *erythrococca* Wr. (3112).—*Hierro de costa*.
- .— *cylindristachya* R. & Schult. (3651).
- *cinerascens* Cand. (Cuba, sec. Cand.)
- *microphylla* Roem. & Scbult. (421).—*Hierba de la sangre, cimarrona*.
- *intricata* Sauval. (3650).
- *globosa* K.th (422).—*Hierba de la sangre, M de gallina*.
- *pedunculosa* Wr. (3113).—*Hierro de costa*.
- *bullata* Lin. (3116).
- Ehretia Bourreria* Lin. (Sylv.) [Beurreria succulenta Jacq. (sec. Buek; Gris.) Bourreria succulenta Jacq. (sec. Cand.; Sauval.); /3?, para-calophylla G.-M., nomen (3119; 3124^r) [Beureria calophylla Gris., p. p., non Ehretia calophylla Ricb.]—*Aleje de costa, roble negro*.
- *spinifex* Roem. & Scbult. (Sylv.) [Beureria spinifex

- Gris. (1) (2).—*Hierro de sabanas, de hojas mentidas; capa rota.*
- Ehretia calophylla Rich. (3124) [Beureria calopliylla Gris., p. p. (Es erróneo el Bourreria calophylla Gris, que se lee en Sauval.) Bourreria reticulata Gris. (sec. Sauval.)]—*Agalla, árbol de lafruticaj agua-j agüito, jagua-yagilita, roble agalla, roble amarillo.*
- divaricata Cand. (1365; 3118; 3136) [Beureria G. Don (sec. Gris.) Bourreria G. Don (sec. Sauval.) Beurreria G. Don (sec. Cand.)]—*Hierro de costa.*
- Tinifolia Lin. (1366; 1370).—*Roble prieto.*
- virgata Sw. (426; 3121) [Ehretia virgata Cand., p. p. Beureria G. Don (sec. Gris.) Beurreria G. Don (sec. Sauval.) Beurreria G. Don (sec. Cand.)]—*Hierro de costa, de sabanas.*
- Grisebachi G.-M., nomen (3655) [Beureria microphylla Gris.] (3).
- species (3122) [Bourreria grandiflora Gris. (sec. Sauval.)]
- tomentosa Lam.^h (3120) [Beurreria G. Don. (sec. Cand.) Bourreria G. Don (sec. Sauval.); *0*, Havanensis G.-M., nomen (3117) [Ehretia Willd.; Bourreria Miers.; Bourreria tomentosa G. Don ; & Havanensis Sauval., nomen].—*Hierro peludo.*
- Tournefortia bicolor Sw. (Exótica); *β*, hevigata G.-M., nomen (Sylv.) [T. lasvigata Lam.^h]; sub-var. latifolia G.-M., nomen (Sylv.) [T. lsevigata Lam.^h; % latifolia Cand.]; *r*, brachycephala Gris. (420).
- Astrotricha Cand. (Sylv., sec. Rich.)
- fruticosa Ker (Exótica); *β*, angustifolia Cand. (Sylv., sec. Rich.) [T. angustifolia Roerá. & Schult.]—*Nigua.*
- scabra Lam.^h (3128; 3129).—*Nigua.*

(1) Es erróneo el *Bourreria spinifex* Gris, que se lee en Sauval.

(2) Hay que precisar si son sinónimos de esta especie ó si constituyen var. el *Beureria Cassinifolia* Gris. [*Ehretia Cassinifolia* Rich. (sec. Gris.); *Ehretia virgata* Cand. (en lo referente al ejemplar de Bertero solamente); no Sw. Es erróneo el *Bourreria Cassinefolia* Gris, que se lee en Sauval.], y el *Bourreria montana* Wr. (según Sauval.) — ¿Qué es la exsiccata Wriglitiana núm. 3123?

(3) Es erróneo el *Bourreria microphylla* Gris, que se lee en Sauval.

- Tournefortia Laurifolia Vent. (417; 417"; 418; 1646).—*Nigua de*
 • *paredón*.
 — volubilis Lin. (1) (Sylv.); /5, oblongifolia Cand.
 (Sylv.); hirsuta Cand. (Sylv.)—*Nigua*.
 — polyochros Spreng. (Sylv., sec. Eich.)—*Nigua*.
 — incana Lam.^k (1364) —*Nigua*.
 — Gnaphalodes R. Br. (3127).—*Alhucema de costa,*
balsamillo, incienso de playa.
 — hirsutissima Lin. (419; 1362).—*Nigua, cayaya*.
 — cymosa Lin. (1645).— *Nigua*.
 — Sagrseana Cand. (Sylv., sec. Cand.)
 Heliotropium Indicum Lin. (Sylv.!)—*Alacrancillo*.
 — parviflorum Lin. (3133).—*Alacrancillo*.
 — filiforme K.th (Sylv.)—*Alacrancillo*.
 — inundatum Sw. (3134); /?, Cúbense Cand. (Sylv.)
 —*Alacrancillo*.
 — Curassavicum Lin. (3138).—*Alacrancillo deplaya*.
 — fruticosum Lin. (3135); i, angustilobum Cand.
 (Sylv.)—*Alacrancillo*.
 — bursiferum Wr. (3137).—*Alacrancillo llanca*.
 — imbricatum Gris. (3140).—*Alacrancillo blanco*.
 — microphyllum Sw. (3139).—*Alacrancillo Mancó*.
 — bumifusum K.th (3141).—*Alacrancillo blanco*.
 — Serpylloides Gris. (3142).—*Alacrancillo blanco*.
 — pauciflorum Gris. (3143).—*Alacrancillo Manco*.
 — Peruvianum Lin. (Cult.!) —*Vainilla, heliotropio*
de olor de vainilla.
 Borago officinalis Lin. (Cult.!)—*Borraja*.

Hidrofileas.

- Hydrolea spinosa Lin. (3109).—*Tabaco, tabaco cimarrón*.
 — nigricaulis Wr. (3108).
 Ñama Jamaicensis Lin. (416).

(1) Hay que determinar con precisión si corresponden al tipo ó á alguna var. las *exsiccatas* Wrightianas 3130 y 3131. También hay que fijarse Tar. de esta especie la *Tournefortia ferruginea* Lam.k (1363, según Gris., Pl. Wright. Cuba; 3132, según Sauval.)

Wigandia Kunthii Choisy (1); j̄, macrophylla Choisy (Cult.!)
[W. macrophylla Cham. & Schlecht.]

Polemoniáceas.

Phlox Drummondii Hook. (Cult.!)—*Flox*.
Cobcea scandens Cav. (Cult.)—*Yedra morada*.

Gencianeas.

Sabbatia gracilis Salisb. (Exótica); j̄, Cubensis Gris. (412).
Lisianthus Thamnoides Gris. (1347).
Eustoma exaltatum Gris. (414).—*Genciana delpais*.
Voyria uniflora Lam.^s (2982); 0, pallida G.-M. (2) (415 (3); 1373)
[Voyria pallida Garcke].—*Genciana de la tierra*.
— Mexicana Gris. (2985).
— brachyloba Gris. (2984).
— disadenantba Gris. (2983).
Leianthus longifolius Gris. (Exótico); y, gracilis Gris. (413).
— ? Silenifolius Gris. (Sylv.)
Zonanthus Cubensis Gris. (1346).
Schultesia stenophylla Mart. (2981) [Exacum Cúbense Poepp.]
— *Tabaco de sabana, flor rosada*.
— • heterophylla Miq. (2980).—*Genciana de Cuba*.
Erythraea ramosissima Pers. (Sylv., sec. Rich.)—*Genciana del país*.
Enicostema littorale Blume (Sylv.!) [Slevogtia Occidentalis
Gris.; S. Orientalis Gris. ?; Hippion Oriéntale Vera. ?]—*Genciana de la tierra, de costa*.
Goepertia volubilis Gris. (1372) [Coutoubea Mart.]
— gracilis Wr. (2979).
Limnanthemum Grayanum Gris. (2988).—*Trébol criollo, irébol de agua*.
— Humboldtianum Gris. (2986; 2987).—*Trébol criollo, trébol de agua*.

(i) El tipo no lo hay en Cuba.

(2) Escamas todas oopuestas. Lóbulos de la corola aovado-oblongos y obtusitos.

(3) Es erróneo el número 414 que Sauval. asigna en lugar del 415.

Loganieas.

- Spigelia Anihelmia* Lin. (390) (1).—*Hierba de las lombrices, Hierba lombricera.*
 - *ambigua* Sauval. (3595) [S. *humilis* Sauval.; non Benth.]
 - *spbagnicola* Sauval. (1701) (2) [S. *Spartioides* G-ris.; non Cham. & Schlecht.]
- Buddleia Americana* Lin. (Sylv.!).; *a, albiflora* G.-M. (3) (1297).—*Tabaco cimarrón.*
- Strycnos Grayi* Gris. (432; 1304).—*Manca-montero, mata-montero.*

Oleáceas.

- Jasminum gracile* Andr. (Cult.)—*Jazmín café.*
 - *molle* R. Br. (Cult.)
 - *Azoricum* Lin. (Cult.)—*Jazmín de las Azores.*
 - *grandiflorum* Lin. (Cult.)—*Jazmín de España, jazmín de la tierra, jazmín oloroso.*
 - *revolutum* Sims (Cult.)—*Jazmín amarillo.*
 - *confusum* Cand. (Cult.)
 - *pubescens* Willd. (Cult.)—*Jazmín de España.*
 - *Sambac* Ait.
 - a, verum* Cand. (Cult.)—*Jazmín de Francia.*
 - verticillatum* G.-M. (4) (Cult.) [*Jasminum Sambac* Ait.; S, *trifoliatum* Cand.]—*Diamela, jazmín de Arabia.*
- Syringa vulgaris* Lin. (Cult.)—*Lila.*
- Fraxinus viridis* Mich.¹ (Exótico); var. *Berlanderiana* A. Gray (3624) [*Fraxinus* Cand.; F. *Cubensis* Gris.]— *Búfano.*
- Linociera compacta* R. Br. (408).
 - *Ligustrina* Sw. (409, del año 1859; 410; 1387; 1387²).

(1) Es erróneo el núm. 370 que le asigna Sauval., *Fl. cub.*, 71.(2) En Sauval., *loc. cit.*, se lee 2701.

<3) Flores blancas.

<4) *Diccionario botánico de los nombres vulgares cubanos y puerto-riqueños [Diamela].*

- Linociera Bumelioides Gris. (2941).
- axilliflora Gris. (1388: es erróneo el núm. 1338 que cita Gris., *Plantee WrigMianm e Cuba Orientali*, pág. 519).
 - Salicifolia G.-M., nomen (409, del año 1856) [Hsenianthus Salicifolius Gris.]—*Bayito*.
 - ?incrassata G.-M., nomen (citada como de Cuba por Gris., *Catalogus planiarum Cibensmm*, pág. 169; omitida por Sauval., *Flora Cuítana*) [Chionanthus incrassata Sw.; Hsenianthus incrassatus Gris.]
- Olea Europea Lin. (Exótico); *P.* sativa Cand. (Cult. en el Jardín Botánico, donde no llega á fructificar).— *Olivo*.
- Forsoleaco Páeudo-Excsecaria G.-M. (2008) [Exctecaria polyandra Gris.; Drypetés lsevigata Gris.] (Lo hay también en Saint-Croix y Saint-Jan).—*Yaití*.
- Forestiera Rhamnifolia Gris. (2939).
- Cassinoides Poir. (2940) (1).
 - porulosa Poir. (411).

(1) V. la nota de la *Hensonia üyrt'folia* Gris, en las Sapoteas.

Nosotros dividimos la familia de la manera siguiente:

- 1.º diandras,
 rara vez tetrandras, y
 Generalmente pentamero. Jasmíneas.
MEOSUBA / " (Semilla anembriobronada) Quionanteas (1).
MEOSUBA / " / Generalmente \$ (Semilla anembriobronada) Quionanteas (1).
 Flores. ^A MEOSUBA ^W r á m e r o Oleas. Flores. ^I MEOSUBA embriobronada.... ^ u t o ^ Fraxíneas (3).
 Cáliz / (polígamas ó dioicas)
 12.º tetrandras ' Salvadoreas.
 \3.º poliandras y polígamas Forsoleáceas (4).
 Género dudoso: *Balangwe* Gaírtn.
 Especie excluida: *Boaria Molina* Cand.=*Celastrus* species [Celastráceas].

- (1) Género *Tetrapilus* Lour : flores dioicas.
- (2) Género *Manjepa* Aubl.: flores tetrandras. Género *Kellana* A. Cand.: flores dioicas.
- (3) Género *Forestiera* Poir.: flores monandras, triandras y tetrandras?, dioicas.
- (4) Tribu nueva. Género único: *Forsoleaco* G.-M.: caracteres de la tribu. Especie única, endémica en Cuba: *F. Pseu&o-ExcteCaria* G.-M.

Labiadas.

- Ocimum canum* Sims [O. *Americanum* Lin.]—*Attahaca cimarrona*.
- *Basilicum* Lin. (Cuba?).
 - js , *Anisatum* Benth. (Cult.í)—*Attahaca anisada*.
difforme Benth. (Cult!)—*Attahaca de hojas anc7ias*,
attahaca mondonguera.
 - ? *Lactucifolium* (Cult.?)—*Attahaca de hojas de lechuga*.
 - *minimum* Lin. (Cult.)—*Attahaca de hojas finas*.
 - . *Sanctum* Lin. (Cuba?); 7, *Cubensis* G.-M., nomen (3155).—*A ttahaca cimarrona*, *attaharpiilla*.
 - *micranthum* Willd. (Silvestre!).—*Attahaca de clavo?*
attahaca cimarrona.
- Orthosiphon g-labratum* Benth. (Cult.?)—*Allahqca aromática*.
- Coleus Blumei* Benth. (Cult.!)—*Manto de la Virgen*.
- Marsypianthes Hyptoides* Mart. (3051).
- Hyptis g-onoccephala* ¥r. (3154).—*Orégano*.
- *uliginosa* S.VEil.? (3148) [H. *Eriocauloides* Rich.]
 - *pedalipes* Gris. (3152).
 - *capitata* Jacq. (443).—*San Dieguillo*, *San Diego cimarrón*.
 - *brevipes* Poit. (Cuba?); var. (3144; 3145).
 - *actinocephala* Gris. (3146).
 - *Lanceséfolia* Schum. (3656).
 - *minutifolia* Gris. (3147).
 - *ammotropha* "Wr. (3153).
 - *spicata* Poit. (441 ó 444).
 - *suaveolens* Poit. (445; 446).—*Orégano cimarrón*.
 - *pectinata* Poit. (3149).—*Alhucema delpais*.
 - *scoparia* Poit. (1608).—*Ajedrea?*
 - *verticillata* Jacq. (3150) [H. *stellulata* Benth; var. Gris.]
- Mentha Piperita* Lin. (Cult.)—*Menta inglesa*, *hierba Mena de olor de cimienta*.
- *silvestris* Lin. (Cult.)—*Menta silvestre*, *hierba hiena-silvestre*.
 - *sativa* Lin. (Cult.)—*Hierba buena*.
- Thymus vulgaris* Lin. (Cult.!)—*Tomillo*.

- Micromeria obovata Benth. (1643).
 Salvia Occidentalis Sw. j ð, obscura G.-M. [Salvia obscura Benib.]—*Salvia*.
 — tenella Sw. (Cuba?); ð, albiflora Mol.* & G.-M. (Silvestre!); var. (1361) [S. micrantha Vabl].
 — serótina Lin.—*Hierba buena cimarrona*.
 — splendens Sellow. (Cult.!)—*Banderilla*.
 — patens Benth. (Cult.?)
 — coccinea Lin.
 — microphylla K.th
 — Strobilanthoides Wr. (3156).
 — Speirematoides Sauval. (3657).
 Monarda punctata Lin. (Cult.)—*Orégano francés*.
 Cedronella Mexicana Benth. (Cult.) [Gardoquia Betonicoides Lindl.]—*Cedronela de Méjico*.
 Glecboma Hederacea Lin. (Cult.) [Nepeta glecboma Benth.]—*Hiedra terrestre*.
 Scutellaria purpurascens Sw. (461).
 — Havanensis Jacq. [S. Cubensis Ricb.]—*Escudo de la Habana*.
 Leonurus Sibiricus Lin.
 Leonotis Nepetsefolia R. Br. (3157).—*Bastón de San Francisco*.
 Teucrium Cúbense Lin.—*Agrimonia*.
 — inflatum Sw.—*Agrimonia*.
 — Canadense Lin. (Cuba?); var. hypoleucum Gris.
 * (3158) [T. argenteum Wr.]—*Agrimonia*.

Utricularias.

- Genlisea luteoviridis Sauval. (3621).
 Pinguicula filifolia Wr. (2886).— *Grasilla*.
 — albida Wr. (2885).
 Utricularia porphyropbylla Wr. (2890).
 — breviscapa Wr. (2893) [Drosera incisa Ricb.?]
 — spirandra Wr. (2897).
 — obtusa Sw. (2896) [U. gracilis K.th]
 — vaga Gris. (2892).
 — foliosa Lin. (2895); ð, oligosperma G.-M. (2895*)
 [U. oligosperma S.'-Hil.]

- Utricularia purpurea* Walt. (2894; 2900).
 — *olivácea* Wr. (2891).
 — *simplex* Sauval. (3619).
 — *sclerocarpa* Sauval. (3620).
 — *subulata* Lin. (2901).
 — *pusilla* Vahl? (2902; 2903).
 — *cornuta* Mich.¹ (2899); & Michauxi G.-M., nomen (2898).
 — *longeciliata* A. Cand. (2904; 2905, p. p.) [*Polypompholix laciniata* Benj.]; **O**, *rubrocalcarata* G.-M. (2905) [*Polypompholix laciniata* Benj.; var. *rubrocalcarata* Gris.]

Bignoniáceas.

- Jacaranda cterulea* Gris. (Sylv.) [*Bignonia* Lin.; *J. Babamensis* Cand.; non R. Br.]—*Aiey macho*.
 — *Sagrasana* Cand. (Sylv.!, 3034) [*J. Babamensis* R. Br. non Cand.; *Tansecium paniculatum* Sieb.]; *P*, arbórea Gris. (360).—*Aiey*.
Bignonia JEquinocialis Lin. (3046).
 — *Sagrseana* Cand. (3049).
 — *unguis* Lin. (349; 1340).—*Bejuco perdiz rosado, uña de gato*.
 — *Gnapbalantba* Ricb. (3050).
Macfadyena podopogon Gris. (3052) [*Spathodea* Cand.]
Pitbecoctenium bexagonum Cand. (1337; 3051) [*P. muricatum* Moc. (1). *P. Aubletii* Gris.; non Splitg.]—*Bejuco deperdiz, lejuco peludo*.
Catalpa purpurea Gris. (Sylv.) (2).
 — *punctata* Gris. (3035); j3, *pubescens* G.-M., nomen (3036) [*C. pubescens* Gris.]—*Roile de olor*.
Tansecium parasiticum Sw.? (434) [*Schlegelia parasitica* Miers.; *S. brachyantba* Gris.]—*Güira macho*.
Tecoma leucoxyton Mart. (1339?; 1838; 3041; 3043); fi, *Miquelii* Cand. (Cuba?); **y**, *minus-lepidota* Gris., *Pl. Wright*.

(1) Es erróneo Macf. dado por Sauval. como autor de esta especie.

(2) Sauval. omite esta especie.

Cuba, fol. 524 (1338).—*Ébano amarillo, palo blanco, leño blanco.*

S?, pentaphylla G.-M., nomen (3042) [T. pentaphylla Juss.]—*Roble de yugo, roble blanco.*

Tecoma stans Juss. (3046) [T. Sambucifolia Gris.; non K.⁽¹⁾]—*Saúco amarillo.*

- *dubia* Sauval., *loe. cit.*, fol. 95.
- *setulosa* Gris. (3040).
- *sanguínea* Sauval., *loe. cit.*, fol. 96.
- *lepidota* Cand. (1341, p. p.) [Bignonia K.⁽¹⁾ T. tracbycarpa Gris.]; /3?, *Myrtifolia* G.-M., nomen (Sylv. sec. Rugel) [T. Myrtifolia Gris.]
- *lepidopylla* Gris., *Pl. Wriglit. Cuba*, fol. 524, p. p. (1341, p. p.) [Bignonia Ricb.]—*Rompe-ropa, roble sabanero, sabanero.*
- *hypoleuca* Sauval., *Fl. cub*, fol. 94 (1341, p. p.) [T. lepidopylla Gris., *loe. cit.*, p. p.]
- *bibracteolata* Gris. (Sylv.)
- *bEemantba* Gris. (3047).
- *spiralis* Wr. (3038).
- *actinopylla* Gris. (3045).
- *longiflora* Gris. (3044).—*Roble real.*
- *Jasminoides* Lindl. (1) (Cuba?).—*Jazminillo.*

Selagináceas.

Bontia Daphnoides Lin. (Cult.!)—*Aceituna americana, bontia.*

Plantagináceas.

Plantago major Lin. (3711).—*Llantén.*

(1) Hay autores que admiten esta especie con Don; otros con K!->

SUBORDEN II.—Gamopétalas inferovariadas.

Lobelieas.— Goodenieas.— Caprifoliáceas.—Valerianeas.—Dipsáceas.—Compuestas.

Lobelieas.

Lobelia Cliffortiana Willd. (340).—*Lobelia*.

Isotoma longiflora Presl. (337).—*Revienta caballos, quibey, Tibe*].

• *Sipbocampylus Manettiflorus* Hook. (339; 2881).

— *patens* Gris. (2883).

— *cernuus* Gris. (2882).

Tupa ensifolia A. Cand. (2879).

— *montana* Wr. (2880).

— *assurgens* A. Caud. (338).

— *imberbis* Gris. (1319).

Goodenieas.

Scsevola Plumieri Vabl (Cuba!).

— *Wrightii* G.-M., nomen (2884) [*Scsevola Plumieri* Vabl; var. *Wrightii* Gris.]

Caprifoliáceas.

Viburnum Opulus Lin. (Cuba?); β , *sterilis* Cand. (Cult.)—*Bola de nieve, mundillo, rosa de Gueldres*.

Sambucus nigra Lin. (Cult.)—*Saúco blanco*.

Lonicera Caprifolium Lin. (Cult.)—*Madreselva*.

Valerianeas.

Valeriana scandens Lin. (Cuba?); β , *dentata* Gris. (277; 278); γ , *indivisa* Gris. (276).

Dipsáceas.

Scabiosa atropurpúrea Lin. (Cult.)—*Escabiosa*, *viuda*, *ambarina*, *escobilla morisca*.

Compuestas.

Carduus Mexicanus Moric. (3615) [*Cirsium Mexicanum* Cand.]
Chuquiraga Pardoiana G.-M. & Mol.* (1) (2875) [*Anaethropia*
Illicifolia Don].— *Cardoicillo*.

— Mantuensis G.-M. & Mol.* (2876) [*Anaethropia*
Wr.].—*Cardoncillo*.

— intertexta Mol.* & C.-M. (2877) [*Anaethropia* Wr.]
—*Cardoncillo*.

Gerbera obovata G.-M. & Mol.* (2) (3617) [*Chaptalia* Sauval.]

— nutans G.-M. (3) (331) [*Leria nutans* Cand.; *Leria in-*
tegrifolia Cass.; *Leria sinuata* Cand.]; β , *leiocarpa*
G.-M. (2872) [*Leria leiocarpa* Cand.]

— albicans G.-M., nomen (2873) [*Leria albicans* Cand.]

— pumila G.-M., nomen (333) [*Leria pumila* Cand.];
 β , *stenocephala* G.-M., nomen (2874) [*Leria* Gris.]

(1) Sección *Anaethropia* H. B., *Hist. pl.*, v m, 91. [Lóbulos de las corolas largos, rígidos, sub-iguales. Brácteas del involucreo agudas ó espinositas. Pajas del vilano 1-2 seriadas, ásperas. Hojas espinoso-dentadas.]

(2) Sección *Chaptalia* H. B., *loe. cit.*, 95. [Hojas íntegras, dentadas ó liradas. Escapo 1-cefalo, sub-desnudo. Corolas del radio comunmente liguladas.]

G. obovata G.-M. & Mol. 'Planta perenne? Tallo sub-confertifolio. Hojas ob-ovales ó espatulado-oblongas, íntegras ó dentadas, interiormente leonado-lanudas, superiormente aracnoideo-tomentosas. Escapo terminal comunmente más largo que la hoja. Involucreo blanco-tomentoso, con escamas agudas. Corolas exteriores con una lígula breve, exserta, oblongo-linear, más larga que las ramas del estilo. Corolas intermedias sub-bidentadas. Corolas centrales sub-igualmente-5-fldas, estilo incluso, estigmas breves, carnositos. Ácanas estriadas, peludas. Cuba.

13) *O. [Chaptalia] nutans* G.-M. 2j. Hojas sub-liradas ó espatuladas las inferiores; mayores y liradas las superiores, con el segmento terminal ancho, óvalo-oblongo; todas son sentadas, arrosadas, verdes y lampiñas por encima y blanco-afelpadas por debajo. Involucreo 3-i-seriado, con escamas lanceolado-lineares, las exteriores menores, apretadas, agudas. Receptáculo desnudo, plano. Flores del radio 1-3, liguladas, Q; en el disco varias series de flores Q; en el centro algunas Q. Ácana sub-comprimida, estriada, rostrada é igual al vilano velludo. En toda, la América tropical, desde Tejas hasta Uruguay.

- Gerbera media G.-M., nomen (332) [Leria Gris.]
- Trixis frutescens P. Br. (1) (330?); β , angustifolia Cand. (Cuba)
[Perdicium Havanense K.^{1b}; Trixis Havanensis Spreng.]
- Perezia(2) Vanillosma Mol.'A G.-M. (3) (3616) [Proustia Sauval.]
- Catanance caerulea G.-M., nomen (Cult.) [Catananche Lin.—
Hierla Cupido, flor de Cupido, cupidona.
- Lactuca intybacea Jacq. (2878) [Bracbyrliamphus intybaceus
Cand.]
- olerácea G.-M. (Habana!; 3618?) [Soncbus oleraceus,
a, β , Lin. Siciliatus Lam.^k—*Cerraja.*
- capitata Cand. (Cult:!)—*Lechuga.*
- Vernonia complicata Wr. (2790).
- Ottonis Schult.
- stictophylla Sauval. (3596).
- (4) Mentheefolia Less. (282 ¿ó 382?); β , Grisebachii
Schult. (1305; 2792).
- Hieracioides Gris. (1306); β , Cubensis G.-M., nomen
(2791) [V. Cubensis Gris.]—*Lagaña de aura, rom-
pesaragüey morado.*
- Havanensis Cand.—*Rompesaragüey.*
- arborescens Sw. (Exótica); β , ovatifolia Cand. (Cuba);
 ϵ , Wrighti G.-M. nomen (1309) [Vernonia Wri-
ghtii Schult.]
- rigida Sw. (Cuba?); β , Sagrasana G.-M., nomen (281)
[Vernonia Sagrasana Cand.]; r, Valenzuelana
G.-M., nomen (2785) [Vernonia Valenzuelana
Rieh.]—*Lagaña de aura.*
- inasquiserrata Schult. (285, prior) [Vernonia rubri-
caulis Gris., *Pl. Wright. Cula*, 511; non K.^{1b}];
 β , obtusifolia Gris. (285, posterior); γ , angustifo-
lia Gris. (2784).—*Lagaña de aura, de paredón.*

(1) Es erróneo R. Br., en Sauval., *Fl. Cub.*, 84.

(2) Sección *Proustia* H. B.", *loc. cit.*, 101.= Sub-sección *Vanillosma* G.-M. Ácanas lineal-oblongas, mazudo-glandulosas. Vilano leonado, 1-serial, igualmente aserrado en el ápice. Especie 1, cubana.

(3) Arbusto sub-trepador, ramosísimo. Hojas elíptico-oblongas, sub-sentaclas. Capítulos 9 ó más, en el ápice de pedúnculos simples ó brevemente ramosos, 5-floros. Escamas del involucreo 8-12, agudas, las exteriores ovales, las interiores oblongo-lineares. Anteras larguísimas.

(4) Según Gris., *Pl. Wright. Cuba*, p. 510, esta especie debe colocarse en la sección *Lopidaploa* Cand., § 1, y no en el §2, como hace este último autor, *Prodr.*, v, p. 38.

- Vernonia remotiflora Rieh. (286; 2786); β , divaricata G.-M., nomen (2787) [Vernonia divaricata Sw. V. arborescens Sw.; β , *äiva.ric&ta.Gris.*]—*Jiompesaragüei/lagaña de aura*.
- membranacea Gris. (Sylv.)—*Lagaña de aura*.
 - ? lepidota Gris. (2789).
 - (1) Piloselloides G.-M. (Cuba) [Lachnorhiza (2) Piloselloides Rieh]; β , Asteroides G.-M. (2835) [Lachnorhiza Asteroides Gris.]
- Elephantopus tomentosus Lin. (280) [E. mollis K.th]—*Lengua de vaca*.
- spicatus Juss. (281).—*Lengua de vaca*.
 - pratensis Sauval. (2793) [E. scaber Gris.; non Lin.]—*Lengua de vaca*.
- Sparganophorus Vaillantii Gsertn. (279); var. long-ifolius Gris. (2783).
- Eupatorium diffusum Vahl (293) [Bulbostylis diffusa Cand.] (3).
- Orinocenses G.-M. (4) (3599) [Mikania Orinocensis K.th Mikania deltoides Pcepp.]; β , Batatasfolius G.-M. (2814) [Mikania Batatsefolia Cand.]; r, Tamoides G.-M. (3600) [Mikania Tamoides Cand.]—*Guaco*.
 - Houstonis Sw. (303) [Mikania Swartziana Gris.]—*Guaco*.
 - Anethifolium Raddi (Cuba?).
 - nudosum G.-M., nomen [Mikania nodosa Spreng.-]

(1) Sección *LaclMórtiim* H. B.ⁿ, *loe. cit.*, 25.

(2) Es erróneo *Lachnorrhiza*.

(3) Es erróneo el *Brickellia diffusa* Cand. que cita Sauval., *Fl. cu!*, 76.

(4) Sección *Mikania* H. B.n, *loe. cit.*, 12a. [Capítulos 4-floros, rara vez 3-5-floros Involucro con 4 ó 3-5 br cteas. Ácana 5-angular. Vilano con pajas ásperas ó brevemente barbadas, 1-2 seriadas Tallo comunmente voluble, rara vez erguido. Hojas opuestas.]
§ Acorazonados.

E. Orinocensis G.-M. 6 O Leñosa, voluble, lampiña; ramos estriados. Hojas pecioladas, sub-redondo-ovales, acorazonadas, acuminadas, anguloso-dentadas hacia la base, reticulado-5-nervias. Corimbos apanojados; capítulos pedicelados, solitarios. Escamas del involucro oblongo-lanceoladas. Ácana lampiña. Cuba; Orinoco.

\$. O Trepadora. Involucro compuesto de 4 escamas acuminadas y una 5." exterior más corta que las otras y estrecha. Cuba.

•y. n Trepadora. Involucro con 4 escamas oblongo-lineares, agudas, y una 5." exterior linear y más corta. Cuba.

- Eupatorium Borregoianum G.-M. (299; 2813) [*Mikania Corydalifolia* Gris.]—*Guaco*.
- hastatum G.-M., nomen (302) [*Mikania hastata* Willd.]—*Guaco*.
- Trinitarium G.-M., nomen (2818) [*Mikania Trinitaria* Cand.]; ζ , volubilis G.-M. (301) [*Mikania volubilis* Pcepp.; *Mikania attenuaía* Rich.; non Cand.]—*Guaco*.
- » reticulosum Mol.* & G.-M. (2815) [*Mikania reticulosa* Sauval.; *Mikania contesta* Cand.; var. Gris.]—*Guaco*.
- Marquezianum G.-M. (1) (Cuba!) [*Mikania mollis* K.ⁿ]—*Guaco*.
- Ranunculifolium G.-M., nomen (3601) [*Mikania Ranunculifolia* Richard].—*Guaco*, *guaquillo*.
- nervosum S\|v.? (2804); β , nudiflorum Rich. (Cuba!); *r*, Celtidifolium G.-M. (Cuba?) [E. *Celtidifolium* Rich.; non Lam.¹?]; *y*, quintuplinerve G.-M. (2805) [E. *Celtidifolium*, yar[^] quintuplinerve Gris.]—*Rompesaragüey*.
- Cowleyanum G.-M. & Mol.* (2) (300; 2817) [*Mikania gonoclada* Cand.; excl. ζ 3, ambigua; M. Pceppigii Spreng.]—*Guaco*.
- crispiflorum Mol.* & G.-M. (3) (2816) [*Mikania crispiflora* Sauval.; *Mikania Convolvulácea* Gris.; non Cand.; *Mikania congesta* Cand.]— *Guaco*.
- multicaulum G.-M., nomen (2795; 2796; 2797) [*Phania multicaulis* Cand.; P. *Matricarioides* Gris.]

(1) E. [*Mikania*. § Acorazonados] *Marquezianum*, G.-M. ò 1-8 Leñosa, voluble; ramas 6-angulares, cano-tomentosas. Hojas pecioladas, sub-redondo ovals, acorazonadas, sub-acuminadas, sub-integras, reticulado-5-nervias, superiormente pubescente-erizadas, inferiormente apenas cano-tomentosas. Corimbos apañados. Capítulos sentados, solitarios; bracteola acuminada, más corta que el involucre. Las escamas de este son linear-oblongas, obtusas, pubescentes externamente. Ácana lampiña. Cuba; Perú.

(2) G.-M., 'Ensayo cie Farmaco fitología cubana, Habana, 1889, p. 84.

(3) E. [*Mikania*. % Acorazonados] *crispiflorum* Mol.* & G.-M. b ^ Trepadora. Tallo estriado, ramas erizado-pubescentes- Hojas largamente pecioladas, membranosas, 3-5-nervias, acorazonadas, 3-lobadas, con el lóbulo terminal triangular, agudo. Panojas terminales más largas que las hojas Escamas del involucre linear-oblongas, acuminadas. Pajas del vilano ásperas, leonadas. Ácana 5-gona. Cuba.

- Eupatorium (1) Planellasianum G.-M. & Mol.⁴ (2798) [Phania Domingensis Gris.]
- Ossíeanum C&ná.—*Rompesaragiiey*.
 - Conyzoides Vahl (295); β , heterolepis Gris. (294).
—*Rompesaragiiey*.
 - odoratum Lin. (Cuba?); β , Cúbense Cand. (Cuba).
—*A lba7iaquillo, filigrana de sabana*.
 - repandum Willd.—*Rompesaragiiey*
 - Ivasfolium Lin. (2799); β , serratum Gris. (2800).—
Rompesaragiiey.
 - Lantanifolium Gris. (1307; 1308); var.? (1629)
[E. bypoleucum Gris.]; var.? (287) [E. Plucbeoides Gris., p. p.; E. beteropbyllum Rieb., non Cand.]; var.? (2801) [E. Pluöbeoides Gris. p. p.; E. Libanoticum Scult.; E. reticulatum Rieb.; non Desv.]—*Rompesaragiiey*.
 - grandiceps Sauval. (2788) [Vernonia arborescens Gris., p. p.; non S\;v.; V. Gnaphbalifolia Rieb.—
Rompesaragiiey.
 - — aromatisans Cand. (Cult.!) [E. triplinerve Guib.; Piqueria trinervia Guib.; non Cab.]—*Trébol de olor*.
 - canescens Vabl (2802).— *Rompesaragiiey*.
 - Cselestinum Lin.; *k* (2811).—*Rompesaragiiey, cestina*.
 - Ageratifolium Cand. (297?) (1633; 2803) [E. Havanense K.⁴¹]—*Rompesaragiiey*.
 - incisum Gris. (2806).—*Rompesaragiiey*.
 - Ayapanoides Gris. (2807).—*Ayapana*.
 - Lindenianum Rieb.—*Rompesaragiiey*.
 - villosum Sw. (296); var.? (2808) [E. Cúbense Cand.]
—*Rompesaragiiey, albahaca de sabana, rompesaragiiey de sabana*.
 - Cynancbifolium Cand. (1632) [E. Poeppigii Spreng.?]; var (2809).—*Rompesaragiiey*.
 - glumaceum Cand.—*Rompesaragiiey*.

(1) Sección *Phania* H. B.n, *loc. cit.*, 129. [Anteras apenas ó nada apendiculadas. Ácana 5-gona ó 5-angular, lisa entre las costillas. Vilano compuesto de unas 5 pajas. Tallo herbáceo, erguido ó trepador. Hojas opuestas, 3-sectas ó inciso-dentadas.]

- Eupatorium coronopifolium* Willd.—*Bompesaragüey*.
 — *Feniculaceum* Willd. (2810).—*Hinojo de sabana*.
 — *Dalea* Lin. (1311, p. p.) [*Critonia Dalea* Cand.]
 — *Pseudo-Dalea* G.-M. & Mol.* (2812) [*Critonia Pseudo-Dalea* Cand.; *Eupatorium Dalea* K.th; *Eupatorium tricbosantbum* Ricb.]
 — *Grisebacbi* Mol.' & G.-M. (1311, p. p.) [*Critonia imbricata* Gris.]
 — *macrophyllum* Lin. (298) [*Hebeclinium* Cand.]
Ageratum Conyzoides Lin. (1310).
 — *muticum* Gris. (1631).
 — *maritimum* K.th
 — *cseruleum* Lin. (Natural!); forma *albiflora*! (Natural! *Celestina, celestina ami, celestina Manca*.
Adenostemma Swartzii Cass. (291) [*Lavenia decumbens* Sw.]
 — *Berberii* Cand. (292) [*A. triangulare* Gris.; non Cand.]
Kuhnia Rosmarinifolia Vent.—*Lengua de mea*.
Áster carneus Nees.? (2827).
 — *Linifolius* Lin. (2828).
Erigeron lyratum G.-M., nomen (2834) [*Conyza lyrata* K.th]
 — *obtusum* G.-M., nomen [*Conyza obtusa* K.th]
 — *Jamaicensis* Lin. (305; 2826).
 — *Thrincioides* Gris. (2824); var.? (2822) [*E. Bellioides* Gris , p. p.; non Cand.]
 — *Hyoseroides* Gris. (2823).
 — *Bellioides* Cand.? (304).
 — *Bellidiastroides* Gris. (2825).
 — *rivularis* Sw. (Cuba?); var. (306; 1312).
 — *Canadensis* Lin. (1313).—*Achicoria silvestre*.
Baccharis Halimifolia Lin. (Cuba?); β , *angustior* Cand. (2831).
 — *Bajaquillo*.
 — *Scoparioides* Gris. (2832).—*Hinojo*.
Solidago virgata Micb.' (3602).—*Plumerito*.
 — *Domingerjsis* Spreng-. (1314) [*Baccharis Ptarmicifolia* Gris., *Pl. Wriglit. Cnla*, 513; non Cand.]
Hysterionica (1) *marginata* G.-M. (2830) [*Haplopappus marginatus* Gris., *Cat.pl. Cui.*, 149].

- Gnaphalium albescens Sw. (Cuba?); var. Cúbense Gris. (322).
 — purpureum Lin. (2866).
 — Americanum Mill. (323).— *Verbasco*.
 Helycbrysum macrantbuni Benth. (Cult.!)—*Inmortal de Australia*.
 — Orientale Gsertn. (Cult.!)—*Inmortal, siempreviva, eterna*.
 Grangea Domingensis G.-M. (2865) [Egletes Cass.]; β , viscosa G.-M. (3614; [Egletes Less.]—*Manzanilla del pais*.
 Placus purpurascens G.-M., nomen (2841) [Pluchea purpurascens Cand.]; ϵ , glabratum G.-M., nomen (Cuba!) [Pluchea glabrata Cand.]—*Salvia colorada*.
 — bifrons G>M. nomen (2833) [Pucbea bifrons Cand.]—*Salvia macho, salvia morada*.
 — odoratus H. B.^o (308) [Pucbea odorata Cass.]—*Salvia de playa, salvia cimarrona, salvia del pais*.
 •ni (1) polycephalus G.-M. (2837; 2838; 2839) [Sachsia polycephala Gris.; S. divaricata Gris.]
 . — tricephalus G.-M. (2836) [Sachsia tricephala' Gris.]
 — (2) coronopifolius G.-M. (2840) [Rbodogeron Gris.]
 Pterocaulon virgatum Cand. (Cuba?); var (307) [P. Alopecuroideum. Cand.]—*Siempreviva*.
 Helianthus annuus Lin. (Cult.!)—*Girasol, mirasol*.
 — speciosus Hook. [Titbonia speciosa Hook.; Leighia Cand.]
 — Baillonianus G.-M. (3) (2853) [Viguiera Helianthoides K.^o; V. Sagraeana Cand.]
 — microclinus G.-M., nomen [Viguiera microcline Cand.]

(1) Sección *SacJisia* G.-M. [Géneros *Sachsia* Gris., y *RlwaZogeron* Gris.] Corolas femeninas, filiformes ó liguladas, limbo 2-3-dentado ó diminutamente dentado. Tallo perenne. Hojas basilares, rosetadas Capítulos remotamente cimosos.

(2) Sección *SacJisia*. [V. (1)].

(3) Sección *Viguiera* H. B.^o, *loc. cit.*, 47. [Pajas del vilano persistentes ó caducas, acompañadas de escamitas persistentes. Brácteas exteriores del involucre secas en su base ó herbáceas. Hojas superiores generalmente alternas, las inferiores opuestas. Capítulos poco voluminosos, casi iguales á sus pedúnculos.]

U. Baillonianus G.-M. (1). Tallo lampiño. Hojas ovales, acuminadas, íntegras, trinervias, superiormente ásperas, inferiormente pobladas de pelos; peciolos velludociliados. Brácteas del involucre uniseriadas, lineares, erizadas, con el ápice dilatado-sub espatulado. Receptáculo largamente cónico, excavado. Cuba.

Wulffla Havanensis Cand.

- angustifolia G.-M., nomen (3607) [Melanthera angustifolia Rich.]
- deltoidea G.-M. (1) (3609) [Melanthera deltoidea Rich. M. Urticifolia Cass.; M. Linnasi K.^{1b}]
- hastata G.-M., nomen (3608) [Melanthera hastata Rich.] (2).

Verbesina Encelioides G.-M., nomen (3611) [Ximenesia Encelioides Cav.]

- arborescens G.-M. (3) (2849); /3, argentea G.-M. (4) (Cuba!).
- carnosa G.-M., nomen; ¿3, triloba G.-M., nomen (2851) [Wedelia carnosa Rich.; 3, triloba Cand.]
- gracilis G.-M., nomen (2852) [Wedelia gracilis Rich.]
- reticulata G.-M., nomen (1634) [Wedelia reticulata Cand.]—*Careicillo amarillo*.
- Veronicifolia G.-M., nomen [Wedelia Veronicifolia Rich.]
- Forso-Cubana G.-M., nomen [Wedelia acuminata Cand.]
- Spilanthoides G.-M., nomen (313) [Wedelia serrata Rich.; Tilesia Spilanthoides Gris.; Calydermos? Spilanthoides Gris.]

(1) Sección 'Melunthcm H. B.', *loe. cit.*, 203. [Pajas del -vilano 00, 02-3, rara vez 0. Ácana carnosa.] = *W. deltoidea* G.-M. 2j. 0 1; en su patria, generalmente (1) en los jardines europeos. Hojas opuestas, áspero-pubescentes, óvalo-deltoideas ó sub-alabardadas, agudas, cuneiformes en la base, aserrado-dentadas, 3-nervias y pecioladas. Escamas del involucre 2-seriadas, oval-oblongas, pubescentes, agudas. Receptáculo con pajas obtusas, sub-mucronuladas. Cuba [Habana!], Puerto-Rico, otras Antillas; Nueva-Granada, etc.

(2) Es erróneo el *Melanthera Jiastata* Mich.x de Sauval., *loe. cit.*, 80.

• (3) Lampiña. Hojas espatuladas ó espatulado-oblongas, enteras, carnosas, lampiñas, sentadas, semiabrazadoras, mucronuladas, cubiertas de polvo blancuzco; estípulas pegadas al tallo, escamiformes. Involucre formado de series de brácteas: la externa, carnosa, comprende dos brácteas oblongas ó espatulado-oblongas y dos ovales, mucronuladas; la interna comprende 8 brácteas membranosas en el ápice, carnosas en la base. Capítulos terminales, con el pedúnculo tan largo como las hojas. Ácanas del radio 3-gonas, las del disco 4-gonas; todas coronadas de 4 dientes, f) ¿. Cuba, Puerto-Rico, Sainte-Croix, Bahamas, Bermudas; *BorrieMa*, Cand.; *Bnphthalmum* Lin.. *Diomedea indentata* Cass.; *D. glairala* K.^{1a}

(4) Sericeo-lanuda, argentada. 1; 0\il)a; Perú. **JBorr/éMrCána;** *Buphthalmum camini* L'Hérith.; *Diomedea argentea* K.*

- Vcrbesina alata Lin. (Cuba!); var. hispida Gris. (1316).—*Botoncillo*.
 — Wrightii Scmlt. (1317) [Ancistrophora A. Gray.]
 — serrata Cav.
 — Chinensis Lin. (*Cxut.*?)—*Salvia de Cul/a*.
 — Persicifolia Cand.
- Spilanthus Beccabunga G.-M., nomen (Svlv.!) [Spilanthus Beccabunga Cand.]—*Botón de oro*.
 — ? insipida G.-M., nomen (Habana!; ¿3610?) [Spilanthus insipida Jacq.]
- Salmea pauciceps Gris. (2854).
 — glaberrima Wr. (2855).
 — scandens Cand. (309; "771) [S. grandiceps Cass.]
 — Caleoides Gris. (2856).
- Eleutherantbera ruderalis G.-M. (310; 2842) (1) [Melampodium ruderale Sw.; Kegelia ruderalis Scmlt.; Tetranthus ruderalis Gris.; Ogiera ruderalis Gris.; O. triplinervis Cass.; s, leiocarpa Cand.]
- Eclipta erecta Lin. (2848).
- Enhydra sessilis Cand. (Cuba?); var. (2850) [E. subeuneata Cand.; E. marítima Less.]
- Isocarpba Atriplicifolia R. Br. (2857); var. Wrightii Gris. (2858).
- Zinnia elegans Jacq. (Cuit.!)—*Cagigal, reina Luisa*.
- Bidens leucantha Willd. (317); Ç>, pilosa G.-M., nomen (316) [B. pilosa Lin.]—*Romerillo, romerillo Manco*.
 — bipinnata Lin. (Cuba?); y, Cynapiifolia G.-M., nomen (315) [B. Cynapiifolia K.¹⁸]—*Romerillo de loma*.
 — Coreopsidis Cand. (Cuba!); var. Gris., *Pl. Wright.*, 514 (314) [Cosmos luteus, *Bol. Mag.*, t. 1689].—*Romerillo de costa*.
 — Rubifolia K.¹⁸
 — variabilis G.-M., nomen (Cuit.!) [Dahlia variabilis Desf.]—*Dahlia*.
 — coccínea G.-M., nomen (Cuit.!) [Dahlia coccinea Cav.]—*Dahlia*.
 — Berteriana Spreng. (Cuba!) [Cosmos caudatus K.¹⁸]; var. (318) [Cosmos sulphureus Cav.]

(1) *E. rudemlis* G.-M. (i) Ascendente. Hojas ovales, pecioladas. Pajas escarosas, ciliadas, acuminadas. Ácana lisa ó tuberculosa. Cuba y Guayana francesa.

- Chrysanthellum procumbens Rich. (319).—*Manzanilla delpais*.
 Trichospira Menthoides K.th (4597).
 Synedrella nodiflora Gaertn. (320).
 Tridax procumbens Lin. (2861).—*Romerillo*. >
 Melampodium liumile Sw. (311) [Acanthospermum Cand.]—
Pinedo.
 Parthenium hysterophorus Lin.—*E&coba amarga*, *artemisillo*,
confinilo.
 Lag-ascea mollis Cav. (2794) —*Romerillo cimarrón*.
 Pinillosia? Bellioides Gris. (2844) [Tetracanthus humüis Wr.]
 — Tetranthoides Cand. (2843).
 — repens Scbult. (312) [Microcecia Hook, f.]
 Clibadium Havanense Cand.
 — hispidulum G.-M. & Mol.' (1315) (1) [Lantanopsis
 , hispidula Wr.] ;
 Heptanthus Cochlearifolius Gris, (2819); var. (2820) [H. Ra-
 nunculoides Gris.]
 — brevipes Wr. (2821).
 Elvira biflora Cand.
 Gaillardia pietà Sw. (Cult.!) . . .
 Flaveria Contrayerba Pers. (2860).(?).—*Contrahierba*.
 — linearis Lag-, (2859).
 — repanda Lag". (Sub-natural !) [Broteroa trinervata
 . . ' Pers.; Brotera Contrayerba *Spveng.*]—*Contrahierba*.
 Thymopsis Wrig-btii Benth. (3603) [Tetranthus Thymoides
 G" s.]
 Tagetescancellatus G.-M., nomen (1304) [Lebetina cancellata
 CaS.S.j (3).
 i. —/ erecta.Lin. (Cult.\)—*Flor de muerto*, *clavelón*, *copete*.
 — patula Lin. (Cult.!)—*Damasquina*, *cagigala*.
 Pectis ciliaris Lin. (2862).—*Romero cimarrón*. ; ;
 . — prostrata Cav. (2862; 2863).—*Romero macho*.

(1) Sección *Lantanopsis* H. B *loe. cit.*, 238. [Involucro ovoideo, poseyendo hasta 4 brácteas. Capítulos diminutos, bifloros (salvo en los casos de aborto), con una flor O y otra Ü, y dispuestos en cimas terminales. Una especie de Cuba y Santo Domingo.]

C. hispidulum G.-M. & Mol.' Hierba sub-leñosa, delgada, ma'ciento-erizada. Hojas opuestas, rombo-lanceoladas, triplinervias.

(2) Es del todo erróneo *Broteroa Contrahierba* Spreng., que cita Sauval., *loe. cit.*, 81.

(3) Parece erróneo *lebetinia cancellata* Cav. en Gris., *Cat.pl. Cub.*, 156. y Sauval., *loe. Cit.*, 82. - .

- Pectis Cubensis* Gris. (3613).—*Romero cimarrón*.
 — *pratensis* Sauval. (3612).—*Romero cimarrón*.
 — *costata* Ser. & Merc. (Cuba, sec. Cand.; • omitida por Sauval.) [*Lorantea prostrata* Lag-asca].
 — *punctata* Jacq. (290; 1630).—*Romero cimarrón*.
 — *Plumieri* Gris. (2864) [*P. floribunda* Rich.].—*Romero cimarrón*.
- Porophyllon Equisetiforme* G.-M. & Mol.* (2868) (1) [*Lescaillea Equisetiformis* Gris.]
 — *ruderales* G.-M., nomen (321) [*Porophyllum* Cass.]
- Senecio polyphlebius* Gris. (329).
 — *vulgaris* Lin. (Cuba?); £, *Filise-Cubas* G.-M., nomen (1318).—*Hierba cana*.
 — *plumbeus* Gris. (328; 2869).—*Retama árbol*.
 — *trineurus* Gris. (327).
 — *Almironcillo* G.-M., nomen (2870) [*Cacalia discolor* Gris.].—*A Imironcillo*.
 — *Hieracifolius* Lin. (Cuba?) [*Erechtites Hieracifolia* Raf.]; ß, *Carduifolius* G.-M. (324) [*Senecio Hieracifolius* Meyer; *Erechtites Carduifolia* Cand.; *Erechtites Hieracifolia* Raf., ß, *Carduifolius* Gris., *Fl. Br. W. Ind.*, 381]; *r*, *Cacalioides* G.-M. (Silvestre!) [*Senecio Cacalioides* Fischer; *Erechtites Cacalioides* Less.].
 — *Sonchifolius* Mench (326, p. p.) [*Emilia Sonchifolia* Cand.]
- Liabum Wrightii* Gris. (288; 2871).
 — *Bro-wnei* Cass. (289).
 — *Cúbense* Schult.
- Neurolama lobata* R. Br. (325; 772).—*Retama arbusto, romerillo*.
Chrysanthemum Indicum Thunb. (Cult.!)—*Flor de Roma*.
 — *coronarium* Lin. (Cult.!)—*Moya*.
 — *Santa-Maria* G.-M., nomen (Cult.!) [*Pyrethrum Tanacetum* Cand.].—*Santa Maria, hierba de Santa Maria, hierba romana*.
- Ambrosia Artemisiifolia* Lin. (2846).—*Artemisa*.

(1) Sección *Lescaillea* G.-M. Ramas del estilo aguditas ú obtusitas en el ápice. Fruto lampiño. Vilano setoso. Tallo sub-leñoso, sub-año y opuestamente escamífero. Una especie de Cuba.

P. Equisetiforme G.-M. & Mol. Caracteres de la sección. Cuba occidental.

Ambrosia psilostachya Cand.

— Crithmifolia Cand. (2845).—*Carquesa*.

Xanthium strumarium Lin. (3604) [X. Canadense Lin.?.; X. macrocarpum Eich.?.; Cand.?.; X. Oriéntale Lin.?.]—*Guizazo de caiallos, lampurda*.

Iva Cheirañthifolia K.th (2847).—*Artemisa de playa*.

- imbricata Walt. (3605).