

Lámina 33

- 1 Pitirre Tropical *Tyrannus melancholicus* Página 181
23 cm (9,25"). Cabeza gris. Pico grande, garganta blanca. Pecho oliváceo amarillento, vientre de un amarillo vivo. Cola escotada.
- 2 Pitirre Americano *Tyrannus tyrannus* Página 182
22 cm (8,5"). Cabeza negra. Viso gris pálido en el pecho. Cola cuadrada, con una muy visible banda blanca en su extremo.
- 3 Pitirre Real *Tyrannus cubensis* Página 184
26 cm (10,25"). Pico grande y grueso. Cabeza negruzca y partes ventrales blancas. Cola ligeramente escotada, y puede tener algunas veces el borde extremo blancuzco.
- 4 Pitirre del Oeste* *Tyrannus verticalis* Página 181
22 cm (8,5"). Vientre amarillo. Cola cuadrada y negra, con estrechos bordes blancos.
- 5 Pitirre Abejero *Tyrannus dominicensis* Página 182
23 cm (9"). Parche negro en el oído. Partes ventrales por lo general blancas. Cola escotada.
- 6 Pitirre Guatíbere *Tyrannus caudifasciatus* Página 183
23 cm (9").
- 6a Adulto: El gris oscuro de la espalda y la cola contrasta con la coloración negra de la cabeza. Cola cuadrada, con una banda terminal blancuzca.
- 6b Juvenil: Barras del ala parduscas y sin el parche de la corona.




Lámina 34

- 1 Verdón de Cabeza Gris *Vireo solitarius* Página 188
14 cm (5,5"). Cabeza gris azulada. Anillo ocular y loreal, blancos. Blancos la garganta y el centro del vientre, costados amarillos. Barras amarillentas o blancas en el ala.
- 2 Vireo de Ojo Rojo *Vireo olivaceus* Página 190
15 cm (6"). Blanco por debajo; algunos individuos con el costado amarillento. Casquete gris y marcada ceja blanca bordeada de negro. Ojo rojo.
- 3 Verdón de Pecho Amarillo *Vireo flavifrons* Página 188
14 cm (5,5"). Oliváceo por encima. Garganta de un amarillo intenso, al igual que el pecho, anillo ocular y loreal. Vientre y barras del ala blancas.
- 4 Bien-te-veo *Vireo altiloquus* Página 190
17 cm (6,5"). Verde oliváceo por encima, blancuzco por debajo, con el costado amarillento. Casquete gris con la ceja blanca bordeada por dos estrechas líneas negras, y estrechas líneas a ambos lados de la garganta del mismo color. Ojo rojo.
- 5 Vireo de Ojo Blanco *Vireo griseus* Página 186
13 cm (5,25"). Blanco por debajo, costado amarillo. Ojo blanco con anillo ocular y loreal amarillos. Barras blancas en el ala.
- 6 Vireo de Filadelfia *Vireo philadelphicus* Página 189
13 cm (5,25"). Sin barras en el ala, con el color amarillo de las partes inferiores más uniforme. Corona gris, ceja blanca y una línea oscura a través del ojo, que se extiende hasta el loreal.
- 7 Vireo de las Bahamas *Vireo crassirostris* Página 186
14 cm (5,5"). Amarillo pálido o blancuzco por debajo. Cabeza gris. Anillo ocular y loreal amarillos. Barras blanco amarillentas en el ala. Ojo pardo, pico grueso.
- 8 Juan Chiví *Vireo gundlachi* (ENDÉMICO) Página 187
13 cm (5,25").
- 8a Adulto: Amarillo pálido por debajo. Loreal y una medialuna postocular de coloración blanco crema. Ojo pardo, que puede parecer mayor en comparación con el de otros vireos. Barras en el ala poco marcadas.
- 8b Variación de la Isla de Pinos.
- 9 Vireo Cantor *Vireo gilvus* Página 189
14 cm (5,5"). Corona gris; blanco por debajo. Costados de color amarillo pálido. Ceja blancuzca, poco definida, sin borde negro por encima. Alas sin marcas.





Lámina 35

- 1 Cao Montero *Corvus nasicus* Página 192
46 cm (18"). Enteramente negro, con un ligero brillo metálico. Raramente se observa sobre el suelo.
- 2 Cao Pinalero *Corvus palmarum* Página 191
43 cm (17"). Enteramente negro, con un ligero viso metálico. A menudo se observa sobre el suelo.
- 3 Troglodita Americano *Troglodytes aedon* Página 198
12 cm (4,75"). De color pardo por encima, algo más pálido por debajo. Una tenue ceja. Alas, costados y cola finamente barrados en negro.
- 4 Fermina *Ferminia cerverai* (ENDÉMICO) Página 197
16 cm (6,25"). De color pardo, finamente barrada en negro por encima y pardo blanquizco por debajo. Cola larga.



1

2

3

4

Lámina 36

- 1 Golondrina de Árboles *Tachycineta bicolor* Página 194
14 cm (5,5"). Partes superiores de un metálico azul verdoso oscuro. Blanca por debajo. Cola ligeramente bifurcada.
- 2 Golondrina de Cuevas *Petrochelidon fulva* Página 196
14 cm (5,5").
2a Adulto: Azul lustroso por encima, con la rabadilla color canela. Vientre blanco. Frente, lados del cuello y garganta de color canela. Cola cuadrada.
2b Juvenil.
- 3 Golondrina Parda *Stelgidopteryx serripennis* Página 195
14 cm (5,5"). Pardo por encima, blanco por debajo; garganta y pecho con un viso pardo. Cola ligeramente bifurcada y corta.
- 4 Golondrina de Bahamas *Tachycineta cyanocephala* Página 194
15 cm (6"). Verde oscuro por encima; alas, rabadilla y cola de color violeta con viso azul. Blanca por debajo, incluyendo las coberteras bajo el ala. Cola muy bifurcada.
- 5 Golondrina de Farallón *Petrochelidon pyrrhonota* Página 196
14 cm (5,5"). Similar a la Golondrina de Cuevas, pero con la frente pálida.
- 6 Golondrina Azul Cubana *Progne cryptoleuca* Página 193
20 cm (8").
6a Macho adulto: Azul metálico con viso purpúreo.
6b Hembra: Garganta, pecho y costados de color pardo.
6c Hembra (*Progne subis*): Vientre rayado.
- 7 Golondrina Cola de Tijera *Hirundo rustica* Página 196
17 cm (6,75").
7a Adulto: Azul metálico oscuro por encima, acanelado por debajo. Frente y garganta de color terracota. Cola notablemente bifurcada.
7b Juvenil: Cola más corta, pero con las partes superiores en tono pardo.
- 8 Golondrina de Collar *Riparia riparia* Página 195
13 cm (5,25").
8a Adulto: Blanca por debajo, con una ancha banda parda en el pecho. Cola ligeramente bifurcada.
8b Vista en vuelo.








Lámina 37

- 1 Tordo de Espalda Olivada *Catharus ustulatus* Página 205
18 cm (7"). Pardo oliváceo por encima; parte superior del pecho, loreal y anillo ocular de color beige. Pecho manchado en pardo.
- 2 Tordo de Mejillas Grises *Catharus minimus* Página 204
19 cm (7,5"). Pardo oliváceo por encima, y pecho blancuzco con puntos pardos. Mejillas grises, con las auriculares rayadas en blanco. Anillo ocular poco visible y loreal blanco.
- 3 Azulejo Pechirrojo *Sialia sialis* Página 202
18 cm (7").
- 3a Macho: Azul por encima, rojizo por debajo. Ilustracione por Álvaro J. Serrano Gutiérrez.
- 3b Hembra: Más opaca.
- 4 Tordo Pecoso *Hylocichla mustelina* Página 206
20 cm (8"). Pardo rojizo por encima. Parte ventral marcada con puntos u ocelos negros.
- 5 Tordo Colorado *Catharus fuscescens* Página 203
18 cm (7"). Pardo rojizo uniforme por encima, garganta y parte superior del pecho con manchitas muy finas del mismo color.
- 6 Sinsontillo *Polioptila lembeyi* (ENDÉMICO) Página 200
11 cm (4,25").
- 6a Adulto: Azul grisáceo. Estrecha medialuna negra en la región auricular.
- 6b Juvenil: Viso oliváceo en el dorso y con la medialuna apenas visible.
- 7 Ruiseñor *Myadestes elisabeth* (ENDÉMICO) Página 202
19 cm (7,5"). Pardo oliváceo por encima, gris pálido por debajo. Un anillo ocular blanco cremoso, líneas pardas en la garganta.
- 8 Tordo del Ártico *Oenanthe oenanthe* Página 202
15 cm (5,75").
- Adulto en plumaje de invierno: Gris pardusco por encima y acanelado por debajo. Rabadilla blanca. Banda negra terminal de la cola.
- 9 Reyezuelo *Regulus calendula* Página 199
11 cm (4,5"). Muy pequeño y rollizo. Gris oliváceo por encima, gris amarillento pálido por debajo, con un prominente anillo ocular y barras blancas en el ala.
- 10 Rabuíta *Polioptila caerulea* Página 200
11 cm (4,5").
- 10a Macho: Algo parecido al Sinsontillo. Fina ceja negra. Anillo ocular blanco.
- 10b Hembra.
- 11 Picotero de Cedro *Bombcilla cedrorum* Página 210
18 cm (7"). Con cresta, a veces comprimida. Dorso pardo sedoso, con el vientre amarillo pálido. Cola con una banda amarilla.
- 12 Estornino *Sturnus vulgaris* Página 210
22 cm (8,5").
- Adulto en plumaje de invierno: Negruzco y moreado en blanco, con reflejos verdes y violáceos, y un largo, recto y oscuro pico.



6a



10a



Lámina 38

- 1 Zorzal Migratorio *Turdus migratorius* Página 206
25 cm (10").
Macho adulto: Gris oscuro por encima, con la cabeza negruzca y un marcado anillo ocular blanco incompleto. Por debajo es pardo rojizo.
- 2 Zorzal Gato *Dumetella carolinensis* Página 207
22 cm (8,5"). Gris pizarra oscuro, con la corona y la cola negras. Coberteras anales rojo canela.
- 3 Zorzal Real *Turdus plumbeus* Página 206
27 cm (10,5"). Gris pizarra. Anillo ocular y patas de color rojo anaranjado. Pico anaranjado o negro, garganta negra.
3a Adulto (*T. plumbeus rubripes*): Parte inferior pardo rojizo.
3b Adulto (*T. plumbeus schistacea*): Vientre gris.
- 4 Sinsonte *Mimus polyglottos* Página 208
25 cm (10").
4a Adulto: Gris por encima, blanco por debajo. Un notable parche blanco en el ala.
4b Juvenil: Rayado por debajo, con el ojo pardo.
- 5 Sinsonte Prieto *Mimus gundlachi* Página 209
28 cm (11"). Gris pardusco por encima, más pálido por debajo. Dorso, parte superior del pecho y costados con rayas de color pardo oscuro. La garganta bordeada por dos rayas negras. Carece del parche blanco del ala.
- 6 Sinsonte Colorado *Toxostoma rufum* Página 209
29 cm (11,5"). Rojizo por encima, con una larga cola del mismo color; blanco cremoso por debajo, rayado en pardo oscuro.




Lámina 39

- 1 Bijirita Peregrina** *Vermivora peregrina* Página 213
12 cm (4,75"). Pico muy fino. Barras poco visibles. Cola sin marcas.
1a Plumaje de cría: Cabeza gris, área ventral blanca.
1b Plumaje de invierno: Verde oliváceo por encima, amarillo pálido por debajo; usualmente las coberteras inferiores de la cola, blancas. Una fina y marcada ceja blanca. Línea ocular oscura.
- 2 Bijirita de Pecho Negro** *Vermivora bachmanii* Página 211
11 cm (4,5"). Pico largo, visiblemente curvo. Alas sin barras. Cola con marcas blancas.
2a Macho adulto: Corona negra y la frente amarilla. Parte ventral amarilla, con un gran parche negro en la garganta y pecho.
2b Hembra adulta: Similar al macho, sin marcas negras, pero puede tener un tenue parche gris en el pecho.
- 3 Canario de Manglar** *Dendroica petechia* Página 215
13 cm (5"). Marcadamente amarilla. Barras de las alas y plumas de la cola marcadas en amarillo. Parte ventral rayada en pardo rojizo.
3a Macho adulto residente.
3b Macho adulto residente.
3c Hembra adulta residente.
3d Juvenil residente: Gris, con el borde de las primarias y cola de color amarillo.
- 4 Bijirita Blackburniana** *Dendroica fusca* Página 220
13 cm (5").
4a Macho adulto: Mejillas con un parche triangular negro, rodeado de amarillo naranja. Garganta y pecho de color amarillo naranja; ala con parche blanco.
4b Macho adulto en plumaje de invierno.
4c Hembra adulta en plumaje de cría: Similar al macho, con el dorso oliváceo rayado, menos intenso el color naranja.
- 5 Bijirita Magnolia** *Dendroica magnolia* Página 217
13 cm (5").
5a Macho adulto en plumaje de cría: Máscara negra, espalda negra, y un marcado parche blanco en el ala; las rayas negras forman una banda en la parte superior del pecho.
5b Macho adulto en plumaje de invierno: Pecho con una una banda gris. Parte ventral amarilla. Costados rayados en negro. La rabadilla es amarilla.
- 6 Bijirita Atigrada** *Dendroica tigrina* Página 217
13 cm (5"). Pequeña, con la cola corta y el pico muy fino. Espalda gris verdosa con rayas oscuras, parte ventral bastante amarilla, rayada en negro.
6a Macho en plumaje de cría: Con un marcado parche auricular de color castaño.
6b Hembra en plumaje de cría.
6c Inmaduro: Verde oliváceo, parte ventral amarillenta y muy rayada; rabadilla amarillo verdosa.





Lámina 40

- 1 Bijirita Trepadora *Mniotilta varia* Página 226
13 cm (5,25"). Negra por encima, con finas franjas blancas en la cabeza y la espalda.
- 1a Adulto en plumaje de cría: Garganta y las mejillas negras.
1b Hembra en plumaje de cría: Garganta blanca, la mejilla gris.
- 2 Bijirita Protonotaria *Protonotaria citrea* Página 227
14 cm (5,5").
- 2a Macho adulto en plumaje de invierno: Cabeza y parte ventral de un amarillo naranja intenso, con la nuca de un tenue color oliváceo. Espalda olivácea.
2b Hembra: Cabeza más olivácea, que gradualmente se mezcla con el color de la espalda.
- 3 Bijirita de Swainson *Limnothlypis swainsonii* Página 228
14 cm (5,5"). Pardo oliváceo oscuro por encima, sin barras en el ala. Ceja de color crema contrasta con la corona pardo oscura.
- 4 Bijirita Gusanera *Helmintheros vermivorum* Página 228
13 cm (5,25"). Pardo oliváceo oscuro por encima. La corona con cuatro llamativas franjas negras.
- 5 Bijirita de Coronilla Anaranjada *Vermivora celata* Página 213
13 cm (5"). Oliváceo por arriba, más pálido por debajo, y ligeramente rayado. Ceja y anillo ocular algo amarillos. Coberteras inferiores de la cola amarillas, cola sin marcas.
- 5a Macho.
5b Inmaduro.
- 6 Bijirita Alidorada *Vermivora chrysoptera* Página 212
13 cm (5").
- 6a Macho adulto: Gris por el dorso, blanco grisáceo en la parte ventral; la corona amarillo dorado; garganta y amplio parche detrás del oído, negros. Parche amarillo dorado en el ala.
6b Hembra.
- 7 Bijirita de Nashville *Vermivora ruficapilla* Página 214
12 cm (4,75").
- Adulto: Verde olivo por el dorso, con cabeza gris. Amarillo en la parte ventral, con una pequeña área blanca en el bajo vientre. Anillo ocular blanco. Ala y cola oliváceas, no marcadas.
- 8 Bijirita de Alas Azules *Vermivora pinus* Página 212
4,75" (12 cm).
- 8a Macho adulto: Cabeza y área ventral de un amarillo brillante; con la nuca y la espalda de color oliváceo; alas grises con barras blancas. Línea ocular negra.
8b Hembra adulta: Similar al macho. Frente y la corona de color oliváceo.





Lámina 41

- 1 Bijirita de Costados Castaños *Dendroica pensylvanica*** *Página 216*
13 cm (5").
- 1a Macho en plumaje de cría:** Corona dorada, línea ocular y líneas de la garganta de color negro bordeando las blancas mejillas. Parte ventral y marcas de la cola, de color blanco; banda visible de color castaño en ambos lados del cuerpo.
- 1b Hembra en plumaje de cría:** Similar al del macho, pero más pálido.
- 1c Inmaduro:** Verde brillante por encima. La banda de color castaño en ambos lados del cuerpo casi ausente. Barras de las alas casi amarillas.
- 2 Bijirita del Pinar *Dendroica pityophila*** *Página 221*
13 cm (5"). Gris por encima. Corona de color verdoso oliváceo y dos finas barras blancas en el ala. Un parche amarillo en la garganta y la parte superior del pecho bordado en rayas negras.
- 2a Macho adulto.**
- 2b Hembra.**
- 2c Juvenil:** Enteramente pardo, con barras poco visibles en el ala.
- 3 Bijirita de Pinos *Dendroica pinus*** *Página 222*
14 cm (5,5"). Algo grande y de pico alargado.
- 3a Macho:** Oliváceo por encima sin rayas, con visibles barras blancas en las alas. Garganta y pecho de color amarillo brillante, vientre blanco, costados tenuemente rayados de olivo o negruzco.
- 3b Hembra:** Similar pero más pálida, con las rayas de los costados muy poco marcadas.
- 4 Bijirita de Cabeza Negra *Dendroica striata*** *Página 225*
13 cm (5,25").
- 4a Macho en plumaje de cría:** Gris oliváceo por encima, con la espalda rayada en negro. Cabeza de color negro, mejillas blancas. Blanco por debajo, los costados rayados en negro. Patas amarillas.
- 4b Hembra en plumaje de cría:** Verde oliváceo por encima, rayado en negro, y dos barras blancas en el ala. Blancuzca por debajo y densamente rayada.
- 4c Adulto en plumaje de otoño:** Garganta y parte superior del vientre de color amarillo, con tenues rayas. Patas grises.
- 5 Mariposa Galana *Dendroica discolor*** *Página 223*
13 cm (5"). Mueve la cola frecuentemente.
- 5a Macho en plumaje de invierno:** Amarillo por debajo. Rayas negras en la cara y costados, y rayas castañas en la espalda.
- 5b Hembra en plumaje de invierno:** Similar al macho en invierno, con las rayas negras de la cara reemplazadas por rayas oliváceas.
- 5c Inmaduro:** Dorso olivo grisáceo; anillo ocular incompleto de color blancuzco, un tono grisáceo en la cabeza.
- 6 Bijirita Común *Dendroica palmarum*** *Página 223*
13 cm (5"). Mueve la cola constantemente.
- 6a Plumaje de cría:** Corona pardo rojiza, mentón y garganta amarillos. Pecho rayado en pardo.
- 6b Plumaje de invierno:** Corona pardo rojiza reducida o ausente, barras un poco marcadas y ceja blancuzca. Blancuzco por debajo, garganta y pecho tenuemente rayado en pardo, coberteras inferiores de la cola amarillas.
- 6c Raza del Este.**



Lámina 42

- 1 Bijirita Azul de Garganta Negra *Dendroica caerulescens* Página 218
13 cm (5,25").
- 1a Macho: Azul grisáceo oscuro; pequeño parche blanco en la base de las primarias. Blanco en la parte ventral. Mejillas, garganta y costados negros.
- 1b Hembra: Pardo oliváceo oscuro por encima, más pálido en la parte ventral, con una fina ceja blancuzca; línea blancuzca que nace a nivel del pico y pasa por debajo del ojo; parche del ala más pequeño que en el macho.
- 1c Inmaduro: Viso verdoso por encima, y blancas las puntas de las plumas de la garganta.
- 2 Bijirita Coronada *Dendroica coronata* Página 219
14 cm (5,5"). Rabadilla amarillo brillante. Barras en el ala poco visibles.
- 2a Macho en plumaje de cría: Gris azulado con una banda en el pecho; costados y parche auricular negros; garganta y vientre blancos. Corona amarilla.
- 2b Plumaje de invierno: Pardo grisáceo por encima, rayado en negro, con pequeños parches amarillos en la corona y costados. Anillo ocular incompleto. Rayas negras en el pecho.
- 3 Bijirita Azulosa *Dendroica cerulea* Página 226
11 cm (4,5").
- 3a Macho adulto: Azul por encima. Espalda rayada en negro. Alas con barras. Vientre blanco, con una fina banda negra en la parte superior del pecho. Costados rayados en negro.
- 3b Hembra adulta: Verde azulada por encima, blanco amarillenta por debajo. Ceja color crema. Costados tenuemente rayados. Espalda sin marcas.
- 4 Bijirita de Garganta Negra *Dendroica virens* Página 220
13 cm (5").
- 4a Macho en plumaje de cría: Mejillas amarillas. Garganta y parte superior del pecho, negros; costados rayados en negro. Dos barras blancas en el ala.
- 4b Hembra en plumaje de cría: Mentón amarillo, y el negro de la garganta es velado con las punticas pálidas de las plumas.
- 4c Inmaduro: Garganta blanca; en el dorso y costados rayas negras muy tenues.
- 5 Bijirita Chica *Parula americana* Página 214
11 cm (4,5"). Muy pequeña.
- 5a Macho adulto: Gris azulado en el dorso, con un parche naranja verdoso en la espalda. Alas con barras. Anillo ocular incompleto. Garganta y pecho amarillos. Banda de color pardo rojizo y negra en el pecho.
- 5b Inmaduro: Viso verdoso por encima.
- 5c Hembra: Más pálida. Banda negra en el pecho ausente.
- 6 Bijirita de Garganta Amarilla *Dendroica dominica* Página 221
13 cm (5,25").
- 6a Adulto: Gris por encima con la corona negra. Parche negro auricular bordeado en blanco. Alas con barras. Garganta de color amarillo, vientre blanco. Costados rayados en negro.
- 6b Bijirita de Sutton: Un híbrido de la Bijirita de Garganta Amarilla y la Bijirita Chica.
- 6c Adulto con el loreal amarillo.






Lámina 43

1 Bijirita Castaña *Dendroica castanea* Página 224

14 cm (5,5").

1a Macho en plumaje de cría: Corona, garganta, pecho y costados de color castaño oscuro, y una máscara negra. Un parche color crema a ambos lados del cuello.

1b Adulto en plumaje de invierno: Verde amarillento por encima, rayado en negro. Color castaño en los costados. Barras blancas en el ala. Color beige pardusco por debajo.

2 Caretica *Geothlypis trichas* Página 231

13 cm (5"). En todos los plumajes tiene alas cortas y sin barras, cola ligeramente redondeada.

2a Hembra inmadura.

2b Macho inmaduro.

2c Macho adulto: Olivado verdoso por encima, con una máscara negra. Amarillo por debajo, con vientre pardo blancuzco.

2d Hembra adulta: Sin máscara y con un fino anillo ocular blancuzco.

3 Bijirita Grande *Icteria virens* Página 235

19 cm (7,5"). Muy grande. Visible loreal negruzco, con una línea blanca superior.

Anillo ocular blanco, pico grande y algo pálido. Garganta y pecho amarillo con viso oliváceo, vientre blanco.

4 Bijirita de Kentucky *Oporornis formosus* Página 230

14 cm (5,5").

4a Macho adulto en plumaje de invierno: Oliváceo brillante por encima. Corona negra con las punticas de las plumas grises. Mejillas y lados del cuello de color negro. Loreal, anillo ocular y zona ventral de un amarillo brillante.

4b Hembra en plumaje de invierno: Corona negra con un tenue color oliváceo; las patillas negras son menos pronunciadas.

5 Bijirita de Cabeza Gris *Oporornis philadelphia* Página 231

13 cm (5,25").

5a Macho adulto: Capucha gris marcada en negro en su borde inferior, la parte ventral completamente amarilla.

5b Hembra adulta: Anillo ocular incompleto, capucha gris pálido o pardo grisosa sin negro.

5c Inmaduro.

6 Señorita de Río *Seiurus motacilla* Página 230

15 cm (6"). Ceja blanca, que se ensancha detrás del ojo. Rayada en pardo en el pecho y los costados. Flancos de un acanelado pálido. Mueve la parte posterior del cuerpo con más frecuencia hacia arriba que hacia abajo de forma algo lenta; también balancea la cola hacia ambos lados.

7 Señorita de Manglar *Seiurus noveboracensis* Página 229

15 cm (6"). Ceja blancuzca o amarillenta y se afina detrás del ojo. Amarillo pálido o blancuzco por debajo; la garganta, el pecho y los costados rayados en pardo. Mueve la cola y la rabadilla más rápido, usualmente hacia abajo.

8 Señorita de Monte *Seiurus auropapilla* Página 229

15 cm (6"). Corona naranja, bordeada por franjas negras. Garganta y el pecho rayados en negro. Camina con la cola levantada.

9 Chillina *Teretistris fernandinae* (ENDÉMICO) Página 232

13 cm (5,25"). Cabeza amarilla. Espalda, alas y cola de color gris, blanco grisáceo en la

