

**DESCRIPCIÓN** 89 cm (35"). *Macho*: Pardo negruzco y verde iridiscente.

Parte superior del ala con grandes parches plateados. En plumaje de cría, la cabeza y el cuello adquieren también plumas blancas. Pico amarillo; cola larga en forma de abanico y terminada en un borde blanco. *Hembra*: Cabeza, cuello y pecho de color pardo claro. El inmaduro similar a la hembra, pero más pálido. Es típica su postura con las alas abiertas.

**ESPECIES SIMILARES** Ambas especies de corúas tienen la cola y el cuello más cortos; el pico, ganchudo en la punta. En vuelo el aleteo es más continuo, sin planeos prolongados.

**EXPANSIÓN:** Sureste de Estados Unidos a través de Centroamérica hasta Argentina; Granada y Cuba. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Estuarios y lagunas poco profundos y tranquilos, de agua dulce o salobre, y también salada en sitios costeros. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a octubre. Cría en colonias, como las corúas. Nidifica en árboles y arbustos. Los nidos tienden a ser pequeños y los construyen con palitos y ramitas. Pone 2 o 3 huevos de un blanco azulado, finamente cubiertos de un material blancuzco, similar al yeso. **VOZ:** Con frecuencia produce sonidos guturales. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente peces.

## RABIHORCADO *Fregatidae*

### FRIGATEBIRDS

Aves marinas con alas excepcionalmente largas y estrechas, patas muy pequeñas, y largos y ganchudos picos. La cola larga y muy bifurcada, usualmente plegada. Peso corporal ligero que contrasta con su gran tamaño. Costeros, no es habitual que se aventuren mar afuera. Se remontan en vuelo alto, calmado, y con muy poco batir de alas, presentando una silueta inconfundible y majestuosa. Se alimentan básicamente de peces, los que capturan en la superficie, luego de precipitarse en picada, pero tocando el agua tan sólo con el pico. También procuran su alimento hostigando a otras aves marinas y obligándolas a regurgitar las presas recién capturadas. Una visión extraordinaria les permite congregarse en pocos minutos sobre fuentes de abundante alimento. Durante la época de cría, los machos hinchan a plenitud su saco gular rojo. Sexos diferentes. (M:5; C:1)


### Rabihorcado o *Fragata*

Magnificent Frigatebird

*Fregata magnificens*

Lámina 2

**DESCRIPCIÓN** 102 cm (40"). *Macho*: Enteramente negro, con un color malva iridiscente en las partes superiores. Saco gular anaranjado rojizo, sólo visible cuando lo hincha a voluntad. *Hembra*: Pardo negruzca, con



un parche blanco en el pecho. El inmaduro presenta cabeza, cuello y pecho blancos.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** Zonas tropicales de América, en ambos océanos, Atlántico y Pacífico. **STATUS:** Común residente permanente en las costas. **HÁBITAT:** Costero. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a enero. Cría en colonias, tan sólo en los cayos. El nido, poco elaborado, lo sitúan en las ramas bajas de los mangles, ocasionalmente en el suelo. Ponen sólo un huevo blanco. **VOZ:** Un murmullo como de gruñido que dejan oír únicamente durante la época de cría. **ALIMENTACIÓN:** Peces, medusas y crustáceos.

## GUANABÁES Y GARZAS Ardeidae

### BITTERNS AND HERONS

Aves semiacuáticas que vadean en aguas poco profundas. Patas, cuello y pico considerablemente largos; dedos largos y finos, el del medio y de afuera unidos por una pequeña membrana. Alas anchas y redondeadas, cola muy corta. En vuelo, pliegan el cuello, dando la apariencia de llevar la cabeza recogida sobre los hombros. Algunas especies, particularmente durante la etapa de cría, exhiben largas plumas en la cabeza, cuello o espalda. Las hay dicromáticas. Con pocas excepciones, nidifican en grandes colonias donde se reúnen varias especies. La mayoría se alimenta de una amplia gama de organismos acuáticos: peces, ranas, crustáceos e insectos acuáticos, así como vertebrados terrestres. El vuelo es sostenido, con regulares aleteos. Como norma pone 3 huevos de un azul verdoso. Sexos similares, excepto en la Garcita. (M:65; C:12)

#### Guanabá Rojo o Ave Toro

American Bittern

*Botaurus lentiginosus*

Lámina 4

**DESCRIPCIÓN** 71 cm (28"). Garza poco estilizada, de color pardo amarillento, con las partes ventrales rayadas y una franja negra en los lados del

cuello. Pico amarillo con el borde negro. Patas y dedos de un amarillo verdoso. La coloración oscura de las primarias y secundarias contrasta notablemente con el pardo claro del cuerpo y del resto del ala cuando el ave es vista en vuelo. El inmaduro similar al adulto, pero sin la franja negra del cuello. Cuando se asustan, mantienen una posición rígida, con el pico apuntando hacia arriba, por lo que se hacen prácticamente indetectables.

**ESPECIES SIMILARES** Los inmaduros del (1) Guanabá Real y del (2) Guanabá de la Florida, son más grises, con los colores más opacos y el pico más corto; carecen de la franja negra del cuello, y muestran menor contraste entre las plumas de vuelo y las coberteras.

**EXPANSIÓN:** Cría en Norteamérica y México; invernada desde el sur de Estados Unidos hasta Panamá y las Antillas Mayores, Islas Swan y Caimán, Bahamas, Cuba y Bermuda. **STATUS:** Muy raro residente invernal y transeúnte (17 de ago. a abril) **HÁBITAT:** Sabanas, ciénagas, lagunatos, donde abundan los junquillos. **VOZ:** Cuando alcanzan el tono, repiten una especie de gruñido *cok*. En sus predios de cría emiten un sonido profundo. **ALIMENTACIÓN:** Pequeños vertebrados e invertebrados acuáticos.

### Garcita o Martinete

Least Bittern

*Ixobrychus exilis*

Lámina 4



**DESCRIPCIÓN** 33 cm (13"). Muy pequeña; pardo rojiza, con un gran parche castaño en la parte superior del ala. Los machos exhiben la corona y la espalda negras; hembras con la espalda parda. El juvenil se asemeja a la hembra, con rayas prominentes en la espalda y el pecho. Escurridizas y muy difíciles de localizar, permanecen escondidas entre los junquillos o la hierba cortadera, de donde salen volando sólo muy ocasionalmente.

**ESPECIES SIMILARES** El Aguaitacaimán es mayor y carece del parche castaño del ala.

**EXPANSIÓN:** Desde el este y suroeste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina; Antillas Mayores. **STATUS:** Común residente permanente, y


transeúnte en Cuba e Isla de Pinos. **HÁBITAT:** Pastizales, ciénagas, lagunatos y sabanazos con hierba cortadera y junquillos. **NIDIFICACIÓN:** Abril a septiembre. Cría en parejas, construye un nido frágil entre los junquillos. Pone 4 o 5 huevos de un azul verdoso. **VOZ:** Una serie de cuatro o cinco arrullos bajos. También una especie de cacareo cuando se asusta. **ALIMENTACIÓN:** Pequeños peces e insectos.

### Garcilote o Garcilote Ceniciento

Great Blue Heron

*Ardea herodias*

Lámina 4



**DESCRIPCIÓN** 122 cm (48"). La mayor de nuestras garzas. Dicromática; el morfo blanco es sumamente raro y casi restringido a los cayos, donde es localmente común. El morfo oscuro es gris azulado, con anchas franjas negras en la cabeza. Parte superior del cuello rayada en negro. Patas de un pardo verdoso. En época de cría, el pico es amarillo, y la parte inferior del cuello y la espalda ornamentados con largas plumas. Los jóvenes semejantes a los adultos fuera de la época reproductiva, pero con la corona negra. El morfo blanco exhibe las patas amarillas o de color rosado pálido. Vuela con un aleteo lento.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El morfo blanco puede ser fácilmente confundido con el Garzón, pero este tiene las patas negras. (2) La Grulla tiene el pico negro, la corona roja y vuela con el cuello estirado.

**EXPANSIÓN:** Sureste de Alaska, sur de Canadá hasta México; Antillas Mayores y Suramérica septentrional. **STATUS:** Común residente permanente, residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. **HÁBITAT:** Orillas y marismas costeras, sabanazos y campos inundados. **NIDIFICACIÓN:** Febrero a julio. Nidifica en colonias, en árboles o arbustos, y bordes de los acantilados. El nido es una plataforma grande, plana, que construye con palitos entrelazados. Ponen 2 o 3 huevos de un azul verdoso. **VOZ:** Un croar ronco y profundo algo parecido al del ganso. Emite también un gruñido gutural. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente peces, pichones y pequeños roedores.

**Garzón o Garzón Blanco**

Great Egret

*Ardea alba*

Lámina 5



**DESCRIPCIÓN** 102 cm (40"). Enteramente blanca. En época de cría las plumas largas sobrepasan la cola. Pico amarillo, patas negras. El inmaduro y los adultos fuera de la época de cría exhiben una coloración más pálida en el pico y las patas. Un paciente y certero cazador, que a veces permanece inmóvil durante varios minutos, pero raramente falla su presa.

**ESPECIES SIMILARES** El morfo blanco del Garcilote tiene las patas amarillas o de un rosado pálido, y el pico más grande.

**EXPANSIÓN:** Cosmopolita en regiones cálidas y templadas. **STATUS:** Común residente permanente, residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. **HÁBITAT:** Sabanas inundadas, lagunatos, manglares, marismas cenagosas y arroyos. **NIDIFICACIÓN:** Enero a julio. Construye un nido similar al del Garcilote, pero algo más endeble: una plataforma grande y plana, de palitos, aunque a veces utiliza un nido viejo. Pone 3 o 4 huevos de un verde azulado. **VOZ:** Un graznido ronco y bajo. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, invertebrados acuáticos y pequeños vertebrados.

**Garza Blanca o Garza Real**

Snowy Egret

*Egretta thula*

Lámina 5



**DESCRIPCIÓN** 61 cm (24"). Enteramente blanca con el pico negro y los dedos amarillos. Cuando cría, le crecen largas plumas en la cabeza, cuello y espalda; loreales amarillos o rojizos. El inmaduro tiene la parte posterior de las patas de un verde pálido, y algunos individuos exhiben la mandíbula inferior también pálida, así como las patas casi enteramente oliváceas. Es la más activa de las garzas cuando busca alimento, y lo hace removiendo constantemente los sedimentos de los fondos poco profundos mediante las vibraciones de sus patas, y corriendo y saltando para atrapar sus presas.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La Garza Azul joven presenta las patas verdes y el pico de dos colores. (2) El morfo blanco de la Garza Roja presenta el pico más largo y grueso, y de dos colores; el cuello más grueso y los loreales oscuros. (3) Los inmaduros y adultos fuera de la época de cría de la Garza Ganadera, presentan el pico más corto, grueso y amarillo, con las patas y dedos verdosos.

**EXPANSIÓN:** Desde el sur de Canadá hasta el centro de Argentina; Antillas Mayores. **STATUS:** Común residente permanente, residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. **HÁBITAT:** Parajes de agua dulce, salobre y salada. **NIDIFICACIÓN:** Mayo a octubre. Nidifica en árboles y manglares. Construye una estructura bastante plana, baja, elíptica, con pequeñas ramitas. Pone 3 huevos de un verde azulado. **VOZ:** Generalmente silenciosa, aunque puede producir un graznido tenue. **ALIMENTACIÓN:** Peces, invertebrados.

### Garza Azul o Garza Común

Little Blue Heron

*Egretta caerulea*

Lámina 5



**DESCRIPCIÓN** 61 cm (24"). De color azul pizarra, con plumas de un pardo violáceo en la cabeza y cuello. Pico azul grisáceo con la punta negra, y loreales grises. Durante la época reproductiva el pico bicolor es más marcado. Patas verdes. El inmaduro enteramente blanco, excepto algunas plumas oscuras en la punta de las alas. Las aves en muda son blancas, con parches irregulares de plumas azulosas. Poco activa mientras busca alimento; generalmente se la observa inmóvil. Con frecuencia vuela con el cuello extendido.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El morfo blanco de la Garza Roja tiene las patas azules y un contrastante pico bicolor; el morfo oscuro presenta la cabeza y el cuello rojizos; el pico rosado con la punta negruzca. (2) La Garza Real tiene el pico y las patas negras y (3) la Garza de Vientre Blanco presenta el vientre blanco.

**EXPANSIÓN:** Este de Estados Unidos; sur de California hasta Perú; centro de Brasil y Uruguay; las Antillas. **STATUS:** Común residente permanente, residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. **HÁBITAT:** Ciénagas, parajes de agua dulce y salada; lagunas, lagunatos, pocetas, sabanas inundadas y cañadas. **NIDIFICACIÓN:** Octubre a agosto. Nidifica en árboles bajos o en matorrales. Anida en colonias, con frecuencia en compañía de otras especies, aunque tiende a ocupar la periferia de la colonia. Pone 3 o 4 huevos de un verde azulado pálido. **VOZ:** Cuando se asusta emite un sonido ronco. **ALIMENTACIÓN:** Fundamentalmente peces, y anfibios e invertebrados acuáticos.

### Garza de Vientre Blanco

Tricolored Heron

*Egretta tricolor*

Lámina 4



**DESCRIPCIÓN** 66 cm (26"). De color gris azulado, con el vientre blanco, plumas blancas en el ala y una estrecha franja blanca a lo largo del cuello. Rabadilla blanca. Pico amarillo casi en su totalidad, con la punta negruzca. El cuello más delgado y el pico más largo que el resto de las garzas pequeñas. El inmaduro con el cuello y las coberteras de las alas de color castaño. Bastante activas cuando se alimentan.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La Garza Azul y (2) la Garza Roja presentan la zona ventral oscura, el cuello enteramente oscuro, y el pico bicolor, muy contrastante.

**EXPANSIÓN:** Desde el sureste de Estados Unidos hasta Perú y Brasil; Bahamas y Antillas Mayores. **STATUS:** Común residente permanente, residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. **HÁBITAT:** Borde de ciénagas costeras, sabanazos inundados y costas rocosas. **NIDIFICACIÓN:** Abril a septiembre. Nidifica en manglares. Altamente sociable,

cría en colonias. Construye una estructura de pocas pulgadas de profundidad, redonda u oval, con ramitas delgadas. Pone 3 o 4 huevos de color verde azulado. **VOZ:** Varios sonidos guturales roncós. **ALIMENTACIÓN:** Peces, pequeños vertebrados e invertebrados acuáticos.

### Garza Roja o Garza Morada

Reddish Egret

*Egretta rufescens*

Lámina 4



**DESCRIPCIÓN** 76 cm (30"). Dos morfós de color. El oscuro, es gris pizarra, con la cabeza y el cuello de purpúreo a castaño rojizo. El otro, enteramente blanco. Los dos morfós igualmente comunes. En ambos, pico robusto, largo y bicolor: rosa pálido con la punta negra durante la época reproductiva, y menos contrastante en otra temporada. Patas y loreales de un gris pizarra, que se hacen más azules en la época de cría. Las plumas de la cabeza y el cuello le dan una apariencia desgredada. Para capturar sus presas, corren a tramos y se detienen con las alas semiextendidas. Los inmaduros del morfó oscuro son grises, con la cabeza y el cuello rojizos. Los inmaduros de ambos morfós con pico, loreales y patas oscuras. Individuos del morfó intermedio suelen observarse.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La Garza Azul es más oscura, con el pico más pequeño y azulado en la base. Los adultos e inmaduros de la Garza Azul tienen las patas verdes. (2) El adulto de la Garza Real tiene el pico y las patas negras, con los dedos amarillos.

**EXPANSIÓN:** Sur de Estados Unidos, México, noroeste de las Bahamas, Cuba y La Española. **STATUS:** Común residente permanente, residente invernala y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. **HÁBITAT:** Sabanazos, bahías con playas, marismas costeras, principalmente en agua salobre o salada. **NIDIFICACIÓN:** Abril a enero. Nidifica en manglares, en alturas hasta 5 m, o sobre el terreno. Construye una plataforma con ramitas finas, palitos y raíces. Pone 3 o 4 huevos de color verde azulado. **VOZ:** Una especie de sonido gutural, menos ronco que el de las otras garzas y garzones. **ALIMENTACIÓN:** Pequeños vertebrados e invertebrados acuáticos.

**Garza Ganadera o Garza Bueyera**

Cattle Egret

*Bubulcus ibis*

Lámina 5



**DESCRIPCIÓN** 56 cm (22"). Enteramente blanca con el pico amarillo o anaranjado y las patas de un amarillo verdoso. Durante la época de cría exhibe plumas de color castaño en la corona, base del cuello y espalda; el pico y las patas se tornan de un pardo rojizo. Los inmaduros carecen de las plumas ornamentales, y se asemejan a los adultos fuera de la época de cría, con la coloración de las patas, de verdes a negruzcas. Vuelan largas distancias para llegar a sus colonias y lugares de descanso, situados por lo general en árboles altos cercanos al agua.

**ESPECIES SIMILARES** Las otras garzas blancas son mayores, con pico y cuello más largos, y son básicamente acuáticas. La Garza Ganadera es la única garza blanca pequeña con el pico amarillo. Gusta seguir tras el arado mientras se roturan las tierras.

**EXPANSIÓN:** Originalmente sur de Eurasia, y África. Invadió Suramérica a finales de 1870 y ahora se ha extendido desde el sur de Canadá y Estados Unidos, hasta Chile y Argentina, incluidas las Bahamas y Antillas. **STATUS:** Muy común residente permanente e invernada, y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Sabanazos, ciénagas, solares yermos, potreros, hasta grandes jardines, y dondequiera que la tierra esté siendo arada o esté pastando el ganado. **NIDIFICACIÓN:** Abril a julio. Cría en colonias, frecuentemente en árboles altos o arbustos. Construye una estructura de poca profundidad con ramitas, palitos y otros materiales secos. Pone 4 o 5 huevos de color blanco azulado. **VOZ:** Usualmente silenciosa, aunque acostumbra emitir una especie de gruñido. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, moluscos, pichones y otros pequeños vertebrados.

**Aguaitacaimán o Cagaleche**

Green Heron

*Butorides virescens*

Lámina 5

**DESCRIPCIÓN** 46 cm (18"). Gris azulado, y verde iridiscente en la espalda. Cuello castaño oscuro con una franja estrecha blanca bordeada de negro. Patas de color amarillo verdoso o anaranjadas; el cuello generalmente



recogido, que le da un aspecto compacto. Suele crizar una cresta negruzca iridiscente cuando siente temor. Los inmaduros presentan colores más pálidos, y rayado en la parte ventral.

**ESPECIES SIMILARES** La Garcita es más pequeña y escurridiza, y se esconde entre la hierba, donde habita. En vuelo, el parche castaño ocre del ala es visible.

**EXPANSIÓN:** Desde el sur de Canadá hasta Panamá; Bahamas y Antillas.

**STATUS:** Común residente permanente e invernada y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y varios cayos. **HÁBITAT:** Básicamente áreas de agua dulce, pero también de agua salobre y salada. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a agosto. Criador solitario. Nidifica en árboles, mangles y matorrales. Construye una endeble plataforma de ramitas y lianas. También utiliza nidos viejos en sucesivas estaciones de cría, adicionándoles materiales para reforzar su estructura. Pone 3 o 4 huevos de color verde azulado. **VOZ:** Ave ruidosa, que produce un cacareo y un repentino chillido cuando se asusta. **ALIMENTACIÓN:** Peces, insectos, y vertebrados terrestres.

### Guanabá de la Florida o Guanabá Lominegro

Black-Crowned Night-Heron

*Nycticorax nycticorax*

Lámina 4



**DESCRIPCIÓN** 64 cm (25"). Una fornida garza blanca, con la espalda y la corona de color negro, adornada de largas plumas blancas. Cuello, patas y pico cortos. Patas de color amarillo verdoso; ojos rojos. El inmaduro, rayado en la parte ventral, pardo grisáceo por encima y moteado en blanco, con las patas verdes y el pico de un pardo amarillento. En vuelo, sólo los dedos se proyectan por detrás de la cola. De hábitos nocturnos.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Guanabá Real es gris. Los inmaduros tienen los puntos blancos del dorso menos visibles, el cuello más delgado, el pico más corto y grueso, pálido sólo en la base. Las patas más largas, de modo tal que en vuelo los dedos y parte del tarso se proyectan por detrás de la cola. (2) El Guanabá Rojo se asemeja a los inmaduros, pero tiene colores más vivos, el pico más largo y delgado, y una franja negra en los lados del cuello.

**EXPANSIÓN:** Una de las aves mejor distribuidas en el mundo, ausente sólo en Australia y las regiones polares. Se le encuentra también en Bahamas y las Antillas Mayores. **STATUS:** Común residente permanente e invernante y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Estuarios, ciénagas, manglares, arrozales; básicamente en aguas dulces o salobres. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. Forma pequeñas colonias en manglares y todo tipo de árboles. Construye una plataforma de poca profundidad, con ramitas y junquillos. Pone 4 o 5 huevos de color azul verdoso. **VOZ:** En vuelo, un característico *quok* que emite generalmente al oscurecer o durante la noche; este sonido es más agudo que el del Guanabá de la Florida. Cuando cría, emite penetrantes graznidos y otros sonidos guturales. **ALIMENTACIÓN:** Crustáceos, peces, ranas, ratones e insectos acuáticos.

## Guanabá Real

Yellow-Crowned Night-Heron

*Nyctanassa violacea*

Lámina 4



**DESCRIPCIÓN** 61 cm (24"). Una robusta garza gris, con marcadas franjas blancas y negras en la cabeza; pico casi negro en su totalidad. Patas amarillas y ojo rojo. El inmaduro, pardusco y moteado en la espalda, con pequeños puntos blancos; rayado en la parte ventral. En vuelo muestran los dedos y la última porción del tarso por detrás de la cola.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Guanabá de la Florida exhibe una visible corona y espalda de coloración negruzca. Los inmaduros presentan el moteado de la espalda más marcado, el pico más largo (la mandíbula inferior puede ser enteramente pálida), las patas más cortas. (2) El Guanabá Rojo se asemeja al inmaduro, pero con los colores pardos mucho más vivos, con el pico

mayor y más delgado, una franja negra al lado del cuello y visiblemente rayado en la parte ventral.

**EXPANSIÓN:** Desde el suroeste y este de Estados Unidos hasta Perú y Brasil; Islas Galápagos, Bahamas y Antillas. **STATUS:** Común residente permanente, residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y ciertos cayos. **HÁBITAT:** Costas y estuarios, tanto en agua dulce como salada. También se le encuentra en áreas boscosas cercanas a lagunas y embalses. **NIDIFICACIÓN:** Abril a agosto. Cría solitario o en pequeñas colonias. Nidifica en manglares, otros árboles y arbustos, a diferentes alturas, desde muy próximas al suelo y hasta 15 m. Pone 3 o 4 huevos de color azul verdoso. **VOZ:** Un *quak* corto, pero de un tono más alto que el del Guanabá de la Florida. **ALIMENTACIÓN:** Cangrejos, peces, insectos y aves jóvenes.

## COCOS Y SEVIYA Threskiornithidae

### IBISES AND SPOONBILLS

Aves acuáticas, de medianas a grandes, con cuello y patas largos. Pico curvado, largo y delgado, o en forma de espátula. El coco es un ave social, cuyas bandadas vuelan en formación lineal o en V. En vuelo, mantienen el cuello estirado. Son aves silenciosas cuando están en sus perchas. Viven en colonias, en ciénagas apartadas, por lo general en asociación con garzas. Se alimentan preferentemente de pequeños crustáceos y otros invertebrados, que obtienen introduciendo el pico en los sedimentos del fondo, mientras caminan en aguas poco profundas. Sexos semejantes. (M:34; C:4)

#### Coco Blanco

White Ibis

*Eudocimus albus*

Lámina 6



**DESCRIPCIÓN** 64 cm (25"). Plumaje blanco; negra la punta de las alas. Pico largo y curvado, cara y patas rojas. El inmaduro, pardo por encima con el vientre y la rabadilla blancos. En vuelo alternan aleteos con planeos, y son capaces de remontarse, planeando alto y en círculos.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Coko Prieto se asemeja al inmaduro del Coko Blanco, pero el primero es todo oscuro. (2) La Cayama es mucho mayor, con el pico grueso y oscuro, y un ancho borde negro en el ala. (3) El inmaduro de la Seviya tiene el pico amarillo, en forma de espátula, y carece de la punta negra del ala.

**EXPANSIÓN:** Desde el sureste y suroeste de Estados Unidos hasta Perú, Venezuela y Guayana francesa; Antillas Mayores (excepto Puerto Rico). **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y muchos de los cayos. **HÁBITAT:** Costas fangosas, ciénagas, campos inundados, lagunatos de agua salobre. **NIDIFICACIÓN:** Abril a septiembre. Anida en colonias, en árboles. Construye una plataforma con palitos secos y ramitas frescas con hojas. Utiliza hojas verdes en el interior. Pone 3 huevos grandes de color blanco verdoso, manchados en pardo oscuro. **VOZ:** Sonidos nasales: *ubb-ubb*, que emite a veces en serie. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, cangrejos, caracoles, camarones y otros crustáceos.

## Coco Rojo

Scarlet Ibis

*Eudocimus ruber*

Lámina 6

**DESCRIPCIÓN** 58 cm (23"). Ave de color rojo escarlata brillante; negra la punta de las alas.

**ESPECIES SIMILARES** La Seviya es más pálida (rosada), con el cuello blanco y el pico gris, en forma de espátula; carece del negro en la punta de las alas.

**EXPANSIÓN:** América del Sur, de Venezuela a Brasil; generalmente cerca de las costas. Ha sido introducido en la Florida. **STATUS:** Esporádicos individuos vienen a Cuba y a algunos de los cayos del norte. **HÁBITAT:** Generalmente cerca de las costas. **VOZ:** Silencioso fuera de la época de cría. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, invertebrados acuáticos.

## Coco Prieto

Glossy Ibis

*Plegadis falcinellus*

Lámina 6



**DESCRIPCIÓN** 58 cm (23"). Observados a distancia, el plumaje parece negro; pero de cerca se aprecian reflejos de un verde metálico en las alas

y el dorso. Pico largo, curvado, de color pardo oliváceo. Los adultos en cría son prácticamente de color castaño, con tonos purpúreos en las alas. Vuela con rápidos aleteos, alternando planeos. El inmaduro de color más apagado, con rayas blancas en la cabeza y el cuello.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El inmaduro del Coko Blanco tiene blanco el vientre, la rabadilla y las coberteras de la cola; el pico rojo y las patas de un pardo amarillento. (2) El Guareao es manchado en blanco por encima y rayado por debajo. En vuelo, su aleteo es más lento.

**EXPANSIÓN:** Este de Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, África y regiones tropicales de Eurasia y Australia; Antillas Mayores (excepto Jamaica). **STATUS:** Común, pero local como residente permanente, visitante invernal y transeúnte, restringido a algunas zonas pantanosas como Zapata y Birama. También se halla en la Ciénaga de Lanier de Isla de Pinos y en los cayos Romano y Coko. **HÁBITAT:** Ciénagas y terrenos fangosos inundados, como los arrozales. **NIDIFICACIÓN:** Mayo a agosto. Nidifica en árboles, a moderada altura. Construye una estructura de poca profundidad con ramitas y palitos secos; algunas veces lo forran con ramitas y hojas verdes. Ponen 3 o 4 huevos azules. **VOZ:** Generalmente silenciosos; en ocasiones emiten un sonido nasal repetido, *ca-onk*, y un bajo *cruk*. **ALIMENTACIÓN:** Invertebrados acuáticos.

## Seviya o Espátula o Cuchareta

Roseate Spoonbill

*Platalea ajaja*

Lámina 6



**DESCRIPCIÓN** 81 cm (32"). Un vadeador de buen tamaño, de coloración blanca y rosada, con un pico largo y gris, en forma de espátula. Los jóvenes son totalmente blancos, y con la edad van adquiriendo el plumaje rosado; el pico, amarillento. Se alimenta introduciendo el pico con movimientos zigzagueantes en fondos blandos. Vuela con lentos aleteos, a veces planea. Con frecuencia se congregan en pequeñas bandadas.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Coko Rojo y (2) el Coko Blanco son algo menores, con el pico delgado y curvado; negra la punta de las alas. (3) El Flamenco es mucho mayor, completamente rosado o bermellón, con patas y cuello muy largos; negra toda la parte posterior del ala.

**EXPANSIÓN:** Desde el sureste de Estados Unidos hasta Chile y Argentina. Bahamas, Cuba y La Española. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, menos abundante en Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Ciénagas saladas y de agua dulce; sabanas, marismas fangosas, lagunas. **NIDIFICACIÓN:** Octubre a junio. El nido es una estructura compacta de palitos y ramitas. Cría en colonias aisladas, entre manglares. Pone 3 huevos blancos con puntos de color pardo rojizo. **VOZ:** Silenciosa, excepto en la época de cría, cuando emite unos débiles sonidos nasales. **ALIMENTACIÓN:** Crustáceos, insectos, plantas acuáticas.

## CAYAMA Ciconiidae

### STORKS

Grandes vadeadores, con un largo y robusto pico, curvado y más grueso en su base. Patas y cuello largos. Alas largas y anchas. Cabeza prácticamente desnuda. Mantienen el cuello estirado al volar, con aleteos lentos y frecuentes planeos. Viven en pantanos o sabanazos húmedos; se alimentan de una amplia gama de crustáceos y vertebrados. Sexos semejantes. (M:26; C:1)

#### Cayama

#### Wood Stork

#### *Mycteria americana*

Lámina 6



**DESCRIPCIÓN** 104 cm (41"). Muy grande, blanca, con la cabeza negra y carente de plumas. Las plumas de vuelo y la cola son negras. El inmaduro tiene la cabeza de una coloración más pálida; el pico amarillo y plumaje grisáceo. Con frecuencia planean alto.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Coco Blanco es mucho más pequeño, y sólo la punta de las alas es negra; pico y patas rojos. (2) La Grulla es mayor; con las alas grises y la corona roja.

**EXPANSIÓN:** Desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina; Cuba y República Dominicana. **STATUS:** Raro residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y en los cayos mayores de la costa norte. **HÁBITAT:** Manglares, lagunatos de agua salobre. **NIDIFICACIÓN:** Enero a abril. Cría

en colonias. El nido, como el de las garzas, sobre manglares o en árboles altos. Pone 3 o 4 huevos de color blanco crema. **VOZ:** Usualmente silenciosa. En ocasiones emite un áspero graznido. **ALIMENTACIÓN:** Vertebrados y crustáceos.

## ZOPILOTE Y AURA TIÑOSA Cathartidae

### AMERICAN VULTURES

Grandes aves negras, con la cabeza pequeña y desnuda, largas alas anchas, y picos ganchudos. Con frecuencia se remontan planeando alto, solos o en grandes grupos, y vuelan en círculos aprovechando las corrientes de aire ascendentes. Se alimentan básicamente de carroña, la que localizan tanto por el olfato como con la vista. Sexos semejantes. (M:7; C:2)

#### Zopilote

Black Vulture

*Coragyps atratus*

Lámina 11

**DESCRIPCIÓN** 64 cm (25"). Enteramente negro; cabeza y patas grises. Cola corta y cuadrada. En vuelo, exhiben un parche blanco en la punta del ala; cuando planean, mantienen las alas extendidas horizontalmente. Rápidos aleteos con planeos cortos.

**ESPECIES SIMILARES** El inmaduro del Aura Tiñosa presenta las plumas de vuelo algo plateadas por debajo; aletea menos al volar y planea mucho más, manteniendo las alas en V. Cola más larga y redondeada.

**EXPANSIÓN:** Sureste de Estados Unidos hasta el centro de Argentina. **STATUS:** Muy raro. Dieciséis reportes visuales en el occidente y centro del país: 1891, 1926, 7 de abr. (1940), 13 de mar. (1943), 1960, 1961, 25 de mar. (1962), 12 de mar. (1967), 1970, 28 de ene. (1971), 1979, 21 de dic. (1980), 1995, 11 de jul. (1996), 8 de jul. (1997), 3 de feb. (1998). **HÁBITAT:** Costas y terrenos abiertos. **VOZ:** Usualmente silencioso. Capaz de emitir algunos sonidos roncós. **ALIMENTACIÓN:** Principalmente carroña.

#### Aura Tiñosa

Turkey Vulture

*Cathartes aura*

Lámina 11

**DESCRIPCIÓN** 74 cm (29"). Color achocolatado muy oscuro; observada a distancia parece negra. La cabeza, roja. Se remonta con un característico balanceo, con las alas ligeramente por encima del plano horizontal formando una V, momento en el cual se hacen visibles las plumas semiplateadas de las alas. Suelen reunirse en bandadas de 50 individuos o más.



Temprano en la mañana o después de la lluvia, gustan de posarse con las alas desplegadas. El inmaduro tiene la cabeza de color grisáceo.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Zopilote tiene parches blancos en el extremo del ala, el vuelo es más plano y presenta la cola más corta y cuadrada. (2) El macho del Gavilán Caracolero tiene el pico muy ganchudo, la cabeza con plumas, y una ancha banda blanca en la base de la cola. (3) El Gavilán de Monte es pardo, con la cola roja, y de coloración más pálida en la zona ventral.

**EXPANSIÓN:** Sur de Canadá hasta el sur de la Argentina; Antillas Mayores; introducido (?) en Puerto Rico. **STATUS:** Muy común como residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y cayos mayores. Raro como residente invernal. **HÁBITAT:** Terrenos abiertos. **NIDIFICACIÓN:** Enero a junio. No construye nido. Pone de 1 a 3 huevos de color blanco grisáceo y moteados, en farallones, cuevas, campos de caña o en los suelos de los bosques. **VOZ:** Usualmente silenciosa. Capaz de producir un sonido ronco cuando se la perturba. **ALIMENTACIÓN:** Principalmente carroña, también desperdicios.

## FLAMENCO Phoenicopteridae

### FLAMINGOS

Una de las aves más espectaculares, altamente sociales. Estos grandes vadeadores presentan cuello y patas muy largos, y pico muy singular: grueso y abruptamente curvado hacia abajo. El vuelo es rápido y sostenido. Se alimentan de una variada gama de muy pequeños animales y plantas que filtran entre los sedimentos del fondo mientras permanecen con el pico sumergido. Sexos semejantes. (M:5; C:1)

#### Flamenco

Greater Flamingo

*Phoenicopus ruber*

Lámina 6

**DESCRIPCIÓN** 114 cm (45"). La mayor de las aves cubanas. Enteramente rosado o rosado bermellón, excepto las plumas negras del ala, que se hacen



visibles cuando las despliega; pico rosado con la punta negra. En los inmaduros la coloración varía de blanco a rosado pálido o blancuzco, con el pico de colores más pálidos. Vuela con patas y cuello totalmente extendidos.

**ESPECIES SIMILARES** La Seviya es más pequeña, mucho más pálida, con el pico en forma de espátula; el cuello mucho más corto, y carece de negro en las alas.

**EXPANSIÓN:** Sur de Bahamas; Cuba, La Española, Île de la Gonâve, Islas Beata, Antillas Neerlandesas, Yucatán, Galápagos; muy local al norte de Suramérica. Bien distribuido en el Viejo Mundo. **STATUS:** Común residente permanente en las costas cubanas, principalmente en el archipiélago Sabana-Camagüey, donde lentamente ha disminuido su número. Fácil de observar en La Salina, península de Zapata. No existen reportes del archipiélago de Las Coloradas, y sí algunos pocos del archipiélago de los Canarreos. **HÁBITAT:** En aguas poco profundas de marismas cenagosas y lagunatos de agua salobre. **NIDIFICACIÓN:** Abril a octubre. Cría en grandes colonias de varios cientos o miles de individuos, en zonas bajas, cenagosas y aislados humedales costeros. Hace los nidos en lugares húmedos, donde hay fango mezclado con yerbas marinas y ramitas. Construye el nido en forma de torre cónica, de unos 30 cm de alto, en cuya depresión pone un solo huevo blanco immaculado. **VOZ:** Un sonido grave y alto, similar al del ganso. **ALIMENTACIÓN:** Pequeños invertebrados y algas.

## YAGUASAS, CISNE, GANSOS Y PATOS Anatidae

### SWANS, GESE, AND DUCKS

Aves acuáticas de mediano tamaño, con anchos picos aplanados y patas por lo general cortas, con membranas interdigitales. Alas puntiagudas, cola corta para casi todas las especies. La mayor parte de los anátidos que se encuentran en Cuba son residentes invernales, algunos casuales, y seis son residentes permanentes. Excelentes nadadores; se alimentan en el agua y también en tierra, básicamente de plantas acuáticas. Con frecuencia presentan dimorfismo sexual. Sociales en su mayoría. (M:157; C:29)

**Yaguasín o Yaguasa Mexicana**

Fulvous Whistling-Duck

*Dendrocygna bicolor*

Lámina 8



**DESCRIPCIÓN** 51 cm (20"). De color pardo castaño, con el plumaje de las alas y la espalda más oscuro, casi negro; franjas blancas en los costados. La rabadilla blanca es visible en vuelo. Pico y patas grises. Como las otras especies de yaguasas, tienen largas patas que durante el vuelo mantienen extendidas detrás de la cola; alcanzan el vuelo verticalmente, manteniendo la cabeza y el cuello bajos. Comen mientras caminan, por lo general en arrozales. El inmaduro se asemeja al adulto, pero con los colores más pálidos.

**ESPECIES SIMILARES** La Yaguasa es mayor, con el cuello más largo y la cabeza más redondeada; los costados moteados en blanco; carece de blanco en la rabadilla.

**EXPANSIÓN:** Sur de Estados Unidos; México, Honduras, Costa Rica; Suramérica; este de África; Madagascar, India, Sri Lanka y Birmania; Cuba, La Española y Puerto Rico. **STATUS:** Hace una década llegó a ser muy común como residente permanente e invernante en Cuba, en la actualidad es poco común; menos común en Isla de Pinos. **HÁBITAT:** Arrozales, campos recién roturados como inundados. También en lagunatos y bordes de diques y canales. **NIDIFICACIÓN:** Abril a diciembre. Construye el nido con las plantas de los arrozales. Más de una hembra acostumbra a poner en el mismo nido. Cada hembra pone entre 11 y 18 huevos color blanco hueso. **VOZ:** Al levantar el vuelo, un alto silbido que se repite. **ALIMENTACIÓN:** Materia vegetal, granos, semillas, arroz.

**Yaguasa o Cuba Libre**

West Indian Whistling-Duck

*Dendrocygna arborea*

Lámina 8

**DESCRIPCIÓN** 53 cm (21"). Parte dorsal, cuello y cabeza de color pardo oscuro; parte ventral mucho más clara. Una franja oscura entre la corona y la espalda; garganta y mejillas blancuzcas. Costados moteados en blanco.



Pico, patas, rabadilla y cola, negruzcos. El inmaduro similar al adulto, pero con los colores más pálidos.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Yaguasín es menor, de color pardo castaño con franjas blancas en los costados y una banda blanca en la rabadilla. (2) La hembra del Pato Pescuecilargo es de un pardo más uniforme, con el espéculum negruzco y de un morado iridiscente con viso verde; el vientre blanco; la cola larga y puntiaguda.

**EXPANSIÓN:** Antillas Mayores (incluidas Cuba, Isla de Pinos, Gran Caimán, e Île-à-Vache en las cercanías de La Española), Bahamas (Andros, San Salvador e Inagua) y al norte de las Antillas Menores (al menos en Barbuda y Antigua). **STATUS:** Un común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y ciertos cayos. Vulnerable. **HÁBITAT:** Ciénagas, manglares, lagunas y arrozales. Ocasionalmente pernocta e incluso cría en áreas costeras. **NIDIFICACIÓN:** Abril a enero. Construye nidos toscos en árboles o cavidades; pone entre 11 y 16 huevos blancos. **VOZ:** En vuelo, un silbido agradable que se dice remeda la frase *Cuba libre*; mientras se alimentan en grupo, emiten un suave murmullo. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, frutas, tallitos tiernos, palmiche.

## Yaguasa Cariblanca

White-faced Whistling-Duck

*Dendrocygna viduata*

Lámina 8

**DESCRIPCIÓN** 43 cm (17"). Espalda parda y alas negras, pecho acanelado. Parte posterior de la cabeza y el cuello negros; corona, mejillas y garganta, blancas. Pico negro, patas grises. El inmaduro con el cuello y la cabeza enteramente grises; el vientre, gris pálido.

**ESPECIES SIMILARES** La Yaguasa Barrigui prieta tiene toda la cara gris, el vientre negro, y un gran parche blanco en el ala.

**EXPANSIÓN:** Costa Rica y la mayor parte de Suramérica. África, Madagascar y las Islas Comores. **STATUS:** Casual en Cuba. Cuatro registros: Abril y junio (1858), 1937, 23 de abr. (1947). Lagunatos en la península de Zapata y en San Cristóbal. **HÁBITAT:** Lagunatos de agua dulce. **VOZ:** Silbidos prolongados: *sui-rii-rii*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, granos e insectos.

## Yaguasa Barrigui prieta o Yaguasa Pechinegra

Black-bellied Whistling-Duck

*Dendrocygna autumnalis*

Lámina 8



**DESCRIPCIÓN** 51 cm (20"). Corona, parte posterior del cuello, pecho y espalda de color canela. Lados de la cabeza y cara, de color gris; vientre, rabadilla, cola y borde exterior de las alas, negros. Alas con una ancha franja blanca. Patas y pico de color rosado, o anaranjado o rojo. Muy llamativo en vuelo; resaltan el vientre negro y la franja blanca del ala. El inmaduro con los colores más pálidos y el pico gris.

**ESPECIES SIMILARES** La Yaguasa Cariblanca presenta una máscara blanca, el pico negro y las patas grises.

**EXPANSIÓN:** Suroeste de Estados Unidos y México hasta el norte de Argentina. **STATUS:** Muy rara. Recientemente se ha establecido como un residente permanente en los arrozales de Camagüey. **HÁBITAT:** Arrozales, ciénagas, lagunas. **VOZ:** Un estridente silbido: *pe-chi-iii-chi*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, granos, semillas y caracoles.

## Cisne

Tundra Swan

*Cygnus columbianus*

Lámina 7

**DESCRIPCIÓN** 132 cm (52"). Blanco, con un largo cuello; el pico y las patas, negros; la mayoría de los individuos presentan un punto amarillo delante del ojo. El inmaduro es ceniciento pálido con el pico rosado, oscuro en la punta.

**ESPECIES SIMILARES** La Guanana Blanca es más pequeña, con el cuello más corto y el pico rosado.

**EXPANSIÓN:** Costas árticas de Norteamérica y Eurasia; inverna en el Nuevo Mundo, al sur de las costas del Atlántico y Pacífico de Estados Unidos. **STATUS:** Casual en Cuba. Dos registros: 17 de dic. (1944) y 25 de feb. (1990) en península de Zapata y Nipe. **HÁBITAT:** Lagunatos de agua dulce. **VOZ:** Silencioso en Cuba. **ALIMENTACIÓN:** Vegetación acuática, hierbas e insectos.

**Guanana o Ganso**

Greater White-Fronted Goose

*Anser albifrons*

Lámina 7

**DESCRIPCIÓN** 73 cm (29"). Pardo grisáceo. Partes ventrales irregularmente barradas. Pico rosado; la base rodeada de plumas blancas. Parte inferior del vientre y coberteras de la cola, blancas. Patas amarillas o anaranjadas. El inmaduro semejante al adulto, pero con el plumaje pardo sin marcas.

**ESPECIES SIMILARES** El inmaduro del morfo oscuro de la Guanana Prieta tiene las patas y el pico oscuros.

**EXPANSIÓN:** Circumpolar. Las poblaciones norteamericanas invernan al sur de Estados Unidos, al oeste de Norteamérica y en México. **STATUS:** Casual en Cuba: 1916. Península de Zapata. Gundlach la consideró poco común como residente invernal en el siglo XIX. **HÁBITAT:** Lagunatos de agua dulce. **VOZ:** Una especie de risotada alta y repetida. **ALIMENTACIÓN:** Insectos acuáticos y larvas.

**Guanana Prieta o Ganso**

Snow Goose

*Chen caerulescens*

Lámina 7

**DESCRIPCIÓN** 71 cm (28"). Dos morfos, uno blanco y otro oscuro; los adultos de ambos morfos exhiben el pico y las patas de color rosado. Bajo vientre y coberteras inferiores de la cola, blancos. El morfo blanco presenta las primarias negras; plumas pardo rojizas en la cara. El morfo oscuro es pardo grisáceo, con cuello y cabeza blancos; primarias y secundarias, negras. Se encuentran individuos intermedios. Inmaduros del morfo blanco tienen la espalda gris, con patas y pico oscuros; los del morfo oscuro son enteramente pardo grisáceos, incluidos las patas y el pico.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El inmaduro de la Guanana Blanca tiene el pico rosado o anaranjado. (2) El Cisne es mayor, con el cuello más largo y las patas negras.

**EXPANSIÓN:** Cría en el Ártico; inverna al sur de Estados Unidos y en México. **STATUS:** Casual en Cuba. Seis registros: 1876, 14 de abr. (1925), enero y 22 de ago. (1985), 25 de abr. y otro sin fecha. **HÁBITAT:** Borde de ciénagas, sabanaos inundados, lagunatos, pastos antrópicos. **VOZ:** Un alto y resonante *uouk*. **ALIMENTACIÓN:** Retoños y raíces; invertebrados acuáticos.

**Ganso de Canadá**

Canada Goose

*Branta canadensis*

Lámina 7

**DESCRIPCIÓN** 64–114 cm (25–45"). Pardo ceniciento, con la cabeza, el largo cuello, las patas y el pico, negros. Un llamativo parche blanco en la

mejilla; vientre y coberteras inferiores de la cola, blancos. Banda blanca en la rabadilla.

**EXPANSIÓN:** Norteamérica septentrional; inverna hacia el sur hasta México y norte de la Florida. **STATUS:** Casual en Cuba. Dos registros: 11 de dic. (1966) y 17 de abr. (1972) en La Habana y Pinar del Río. **HÁBITAT:** Lagunatos de agua dulce. **VOZ:** Un profundo y resonante *yonk*. **ALIMENTACIÓN:** Retoños, raíces, granos, insectos y crustáceos.

### Pato Doméstico

Muscovy Duck

*Cairina moschata*

Lámina 51

**DESCRIPCIÓN** Un pato rústico, con aspecto de ganso; posee dos largos parches blancos en las alas; coberteras inferiores de las alas también blancas. **Macho:** 80 cm (32"). La cara sin plumas y con una protuberancia roja. **Hembra:** 63 cm (25"). Más pálida y puede carecer de protuberancia facial. **Inmaduro:** Negro con manchas blancas en la parte superior del ala. Las variedades domésticas pueden ser blancas, negras o moteadas. Ejemplares escapados, a menudo se convierten en semisalvajes.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** Norte de México y al sur, a lo largo de Centroamérica hasta Argentina. **STATUS:** Ampliamente introducido. **HÁBITAT:** Lagunas y lagunatos; ríos de curso lento. Se lo encuentra con frecuencia cerca de poblados y fincas. **NIDIFICACIÓN:** Todo el año. Pone entre 8 o 9 huevos blanco verdosos en cavidades de árboles. **VOZ:** Usualmente silencioso, puede emitir sonidos silbantes o *quaks* muy bajos. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, vegetación acuática, frutos, insectos y pequeños peces.

### Huyuyo o Pato Huyuyo

Wood Duck

*Aix sponsa*

Lámina 9



**DESCRIPCIÓN** 48 cm (19"). *Macho*: Cabeza grande con una llamativa cresta e iridiscentes coloraciones en verde oscuro, violeta, blanco y negro; pico negruzco con la base roja. *Hembra*: De color pardo, con un viso purpúreo en la espalda; la cresta menor, con un parche blanco alrededor del ojo. Garganta y vientre blancos en ambos sexos. Macho en eclipse similar a la hembra, pero con más profusión de blanco en la garganta; pico semejante al macho en cría. *Juvenil*: Similar a la hembra, con el vientre moteado; patas de color amarillo pálido. Alza el vuelo de forma vertical. Cabecea mientras nada. Con frecuencia se posa en árboles. En vuelo se distingue por la larga cola cuadrada y el cuello corto.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La hembra del Pato Serrucho tiene el pico más fino y parches blancos en las alas; carece de parche blanco alrededor del ojo. No realiza cambios bruscos al volar.

**EXPANSIÓN**: Sur de Canadá y Estados Unidos; invernada en México, Bahamas y Cuba. **STATUS**: Poco común como residente permanente e invernada en Cuba e Isla de Pinos. **HÁBITAT**: Lagunas, lagunatos, estuarios, diques, canales, arrozales y depósitos de agua con abundante vegetación. **NIDIFICACIÓN**: Julio a octubre. En cavidades de árboles, incluidas las palmas reales. Huevos de color blanco hueso; ponen de 8 a 14. **VOZ**: Un *ya-iiik* de alto tono lo emite la hembra al alzar el vuelo. **ALIMENTACIÓN**: Materia vegetal, semillas e insectos acuáticos.

### Pato Serrano o Cerceta

Green-winged Teal

*Anas crecca*

Lámina 8

**DESCRIPCIÓN** 36 cm (14"). *Macho*: Gris, con la cabeza y el cuello acanelados, parche verde entre el ojo y la nuca. *Hembra*: Pardo moteada. Ambos sexos exhiben el espéculum verde, bordeado en color terracota en la parte anterior; vientre blanco; las coberteras inferiores de la cola casi en su totalidad blancas. Pico muy pequeño, gris u oliváceo. Los jóvenes se asemejan a las hembras. Vuelo muy rápido. Cuando vuelan en bandadas suelen realizar acrobacias aéreas, volteándose, cambiando de dirección o haciendo vuelos en picada.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La hembra del Pato de la Florida tiene un parche azul en el ala, el pico más largo y las patas amarillas. (2) La hembra del Pato Canelo tiene un parche azul en el ala, y más acentuada la forma de espátula del pico.

**EXPANSIÓN**: Canadá y el norte, centro y oeste de Estados Unidos. Eurasia. Las poblaciones norteamericanas invernada al sur hasta Belice, Honduras, Bahamas y Antillas. **STATUS**: Poco común como residente invernada y transeúnte invernada (agosto a abril). **HÁBITAT**: Sabanazos inundados, lagunas, arrozales, bahías. **VOZ**: *Macho*: Un abrupto y corto silbido. *Hembra*: Un graznido débil. **ALIMENTACIÓN**: Granos, hierbas, semillas, retoños.

## Pato Inglés

Mallard

*Anas platyrhynchos*

Lámina 8

**DESCRIPCIÓN** 58 cm (23"). *Macho*: Espalda de color pardo grisáceo, más claro en el vientre; pecho y costados acanelados. Cabeza verde oscuro con un fuerte viso metálico y un anillo blanco en el cuello. Pico amarillo.

*Hembra*: Moteada de un pardo amarillento; pico oscuro en la base, con la punta anaranjada. Ambos sexos exhiben la cola negra con las plumas exteriores blancas; espéculum azul violáceo, bordeado de blanco; patas anaranjadas. *Inmaduro*: Similar a la hembra, pero con el pico oliváceo pálido. Alza el vuelo verticalmente.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El macho del Pato Cuchareta es más pequeño, con un pico negro, largo y ancho, y el pecho blanco. El parche azul del ala es muy llamativo en vuelo. (2) La hembra del Pato Gris tiene el espéculum blanco bordeado de negro; pico gris, con los bordes anaranjados.

**EXPANSIÓN**: Norteamérica, México, Europa, Asia central y Japón. Las poblaciones norteamericanas invernan por el sur hasta el centro de México.

**STATUS**: Muy raro como transeúnte y residente invernal en Cuba e Isla de Pinos (10 de oct. a 25 de may.).

**HÁBITAT**: Lagunatos de agua dulce. **VOZ**: Un alto y resonante *quack*. **ALIMENTACIÓN**: Semillas, hierbas, granos, insectos.

## Pato de Bahamas o Pato Guineo

White-checked Pintail

*Anas bahamensis*

Lámina 8



**DESCRIPCIÓN** 43 cm (17"). *Macho*: Pardo amarillento, moteado en negro. Garganta, parte anterior del cuello y mejillas blancos; base del pico de un rojo escarlata. Espéculum verde, bordeado de beige. Cola larga y puntiaguda. *Hembra*: Similar al macho pero con colores más pálidos.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN**: Bahamas, Antillas Mayores, norte de Antillas Menores y Suramérica. **STATUS**: Común, pero local residente permanente, principalmente en arrozales del sur de Sancti Spiritus, Manzanillo, Birama. **HÁBITAT**: Estuarios,