

lagunatos de agua salobre, arrozales, manglares. **NIDIFICACIÓN:** Mayo a agosto. Construye el nido en el suelo, cerca del agua, con hierbas y vegetación acuática. Pone de 6 a 12 huevos de color crema. **VOZ:** *Macho:* Un chillido. *Hembra:* Un *quack*. **ALIMENTACIÓN:** Granos, hojas, hierbitas.

## Pato Pescuecilargo

Northern Pintail

*Anas acuta*

Lámina 8

**DESCRIPCIÓN** 66 cm (26"). Configuración delgada, con largo cuello y larga y puntiaguda cola. Pico gris azulado. Espéculum negruzco, de un púrpura iridiscente y viso verde, finamente bordeado de blanco en la parte posterior. Alas finas y puntiagudas. *Macho:* Gris, con la cabeza de color pardo oscuro y partes inferiores blancas; una franja blanca a todo lo largo del cuello. *Hembra:* Moteada en pardo, con la barriga blanca muy visible en vuelo. Los jóvenes se asemejan a la hembra. Alza el vuelo de forma vertical.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La Yaguasa tiene las alas más oscuras y en vuelo una silueta diferente, con la cabeza, cuello y patas a un nivel más bajo que el resto del cuerpo. Aletean más lentamente. (2) La hembra del Pato Gris tiene el espéculum blanco bordeado de negro y el pico gris con los bordes anaranjados.

**EXPANSIÓN:** Norteamérica; inverna en Islas Bahamas y las Antillas, y raramente hasta el norte de Suramérica; Eurasia. **STATUS:** Común como residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos (septiembre a abril). **HÁBITAT:** Lagunas poco profundas, lagunatos de agua salobre, canales. **VOZ:** *Macho:* Ocasionalmente emite un silbido que repite. *Hembra:* Un graznido bajo. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, vegetación acuática, insectos y renacuajos.

## Pato de la Florida

Bluc-Winged Teal

*Anas discors*

Lámina 9

**DESCRIPCIÓN** 41 cm (16"). *Macho:* Pardo acanelado cenizo, densamente moteado en negro, con una llamativa medialuna blanca delante del ojo; coberteras inferiores de la cola negras. *Hembra:* Pardo moteada. El macho en eclipse y el inmaduro, similares a la hembra. En vuelo ambos sexos muestran un parche claro azul en la parte anterior del ala. El macho adquiere el plumaje de cría en noviembre. Su vuelo en bandadas es muy rápido, haciendo virajes y cambios repentinos.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La hembra del Pato Canelo presenta el pico algo más largo y en forma de espátula. La línea ocular menos marcada. (2) La hembra del Pato Serrano carece del parche azul del ala; el vientre blanco muy visible

en vuelo. (3) La hembra del Pato Cuchareta tiene el patrón del ala similar, pero presenta un pico mayor y mucho más marcada la forma de espátula.

**EXPANSIÓN:** Norteamérica; inverna en las Antillas y hasta el centro de Argentina. **STATUS:** Muy común como residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos (25 de ago. a 12 de jun.). **HÁBITAT:** Lagos, lagunas, pastizales inundados, estuarios, lagunatos de agua salobre, borde de manglares, marismas costeras, costas con abundante vegetación. **VOZ:** *Macho:* Una especie de silbido chirriante. *Hembra:* Un ligero *quack*. **ALIMENTACIÓN:** Granos, invertebrados acuáticos.

### Pato Canelo

Cinnamon Teal

*Anas cyanoptera*

Lámina 9

**DESCRIPCIÓN** 41 cm (16"). *Macho:* En plumaje de cría, rojo acanelado con manchas pardo oscuras en la espalda. En vuelo se ve muy oscuro. *Hembra:* De color pardo ceniciento, moteada y jaspeada. Ambos sexos con verde iridiscente en el espéculum, los bordes de adentro y de afuera negros; un parche azul en la parte anterior del ala. Los machos en plumaje de eclipse no son fáciles de diferenciar de las hembras. Levantan vuelo de forma vertical.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La hembra del Pato de la Florida tiene el pico algo menor y menos marcada la forma de espátula; más visible la mancha loreal y la línea ocular; el macho presenta una media luna blanca delante del ojo y una mancha blanca en los flancos, cerca de la cola. (2) La hembra del Pato Serrano carece del parche azul del ala y tiene el pico más corto. (3) La hembra del Pato Cuchareta tiene un patrón de ala similar en vuelo, pero tiene el pico más largo y en forma de espátula.

**EXPANSIÓN:** Oeste de Norteamérica, norte de México. También residente en Suramérica, inverna en Centroamérica y norte de Suramérica. **STATUS:** Casual en Cuba. Cuatro registros: 9 de ene. (1917), 20 de feb. (1932), 5 de dic. (1963) y 3 de feb. Parte occidental de la Isla. **HÁBITAT:** Depósitos de agua dulce poco profundos con abundante vegetación. **VOZ:** *Macho:* Un silbante *piip*. *Hembra:* Un ronco *carr*. **ALIMENTACIÓN:** Vegetación acuática, semillas, caracoles, insectos.

### Pato Cuchareta

Northern Shoveler

*Anas clypeata*

Lámina 9

**DESCRIPCIÓN** 48 cm (19"). *Macho:* Pecho blanco, vientre acanelado, cabeza de un verde oscuro iridiscente. *Hembra:* Pardo moteada. Ambos sexos tienen el pico largo, en forma de cuchara: gris oscuro en el macho, y en la hembra, gris con pintas anaranjadas en los bordes y mandíbula inferior. Gran parche azul pálido en la parte anterior del ala, espéculum verde, patas anaranjadas. Algunos machos inmaduros muestran una mancha

blanca en forma de media luna en la cara. Mientras nadan, estas aves inclinan el pico hacia el agua. En relación con los otros patos, este tiene un ancho y largopico; cuando vuela, estos brindan la apariencia de que las alas están situadas en un nivel posterior.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El macho del Pato Inglés tiene el pecho acanelado, el vientre blanco, y el pico amarillo y más corto. (2) Las hembras del Pato de la Florida y (3) del Pato Canela tienen un patrón de ala similar en vuelo, pero el pico es más pequeño.

**EXPANSIÓN:** Eurasia, Norteamérica. Las poblaciones norteamericanas invernan hacia el sur, hasta el norte de Suramérica, Bahamas y Antillas. **STATUS:** Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos mayores (septiembre a 16 de mayo). **HÁBITAT:** Lagunas, lagunatos, sabanazos inundados con mucha vegetación. **VOZ:** *Macho:* Un profundo cacareo gutural. *Hembra:* Un débil *quack*. **ALIMENTACIÓN:** Vegetación acuática, caracoles, ostras e insectos acuáticos.

### Pato Gris

Gadwall

*Anas strepera*

Lámina 9

**DESCRIPCIÓN** 51 cm (20"). *Macho:* Gris, con cabeza y cuello de color pardo; coberteras de la cola, negras. Parche acanelado en el ala, poco visible en vuelo. *Hembra:* Pardo moteada, con la cabeza y el cuello más pálidos. Ambos sexos presentan el espéculum blanco, bordeado de negro; el vientre blanco, patas de un amarillo pálido, mandíbula superior gris con los lados anaranjados. Alzan el vuelo de forma vertical. Con frecuencia bucea.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La hembra del Pato Lavanco tiene la cabeza de un gris pálido, el pico azulado y el espéculum gris; en vuelo muestra un gran parche blanco en el ala. (2) La hembra del Pato Inglés tiene el vientre más oscuro, la cabeza menos empinada y el espéculum azul violáceo bordeado de blanco. (3) La hembra del Pato Pescuecilargo tiene el cuello más largo, la cola más puntiaguda y el pico gris.

**EXPANSIÓN:** Eurasia y Norteamérica. Las poblaciones norteamericanas invernan al sur de Estados Unidos, México, Bahamas y Jamaica. **STATUS:** Muy raro residente invernal (8 de oct. a 5 de may.). En Pinar del Río y península de Zapata. **HÁBITAT:** Lagunas y lagunatos. **VOZ:** *Macho:* Un variado repertorio de silbidos, gorjeos y gruñidos. *Hembra:* Un *quack* bajo. **ALIMENTACIÓN:** Plantas acuáticas, algas.

### Pato Lavanco

American Wigeon

*Anas americana*

Lámina 9

**DESCRIPCIÓN** 51 cm (20"). *Macho:* Pardusco con la cabeza gris, la corona blanca y un gran parche verde a los lados de la cabeza. *Hembra:* De color

pardo, con la cabeza y el cuello enteramente de color gris y el vientre blanco. Ambos sexos presentan un gran parche blanco en el ala, más notable en el macho, y el pico gris azulado con la punta negra. El espéculum es verde, bordeado de negro. Con frecuencia busca su alimento en el suelo. Alza el vuelo verticalmente.

**ESPECIES SIMILARES** La hembra del Pato Gris tiene el espéculum blanco en lugar del gran parche blanco en el ala, la cabeza parda y la frente más empinada.

**EXPANSIÓN:** Norteamérica, inverna en las costas del sur de Estados Unidos, y hacia el sur, ocasionalmente, hasta Colombia y Venezuela; Bahamas y Antillas. **STATUS:** Común visitante invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos (agosto a 18 de may.). **HÁBITAT:** Lagunas y lagunatos costeros de agua salobre. **VOZ:** *Macho:* Un agradable y melodioso silbido. *Hembra:* Un débil *quack*. **ALIMENTACIÓN:** Hierbas, granos y vegetación acuática.

### Pato Lomiblanco

Canvasback

*Aythya valisineria*

Lámina 9

**DESCRIPCIÓN** 56 cm (22"). *Macho:* Blancuzco con la cabeza de color pardo acanelado y con el pecho y cola negros. *Hembra:* Espalda y costados de un pardo grisáceo pálido, con la cabeza y el cuello pardos. Ambos sexos tienen el pico largo y oscuro con la cabeza semiachata. Rabadilla, cola y coberteras de la cola negras. En vuelo, las alas no ofrecen ningún contraste. Se remontan pateando el agua. Vuelo muy rápido.

**ESPECIES SIMILARES** El macho del Pato Cabecirrojo tiene la espalda gris, el pico corto de tres colores, la cabeza redonda, y el borde exterior del ala gris.

**EXPANSIÓN:** Oeste y centro de Norteamérica, inverna al sur de México, costas del Golfo y la Florida. **STATUS:** Muy raro visitante invernal (octubre a marzo). **HÁBITAT:** Lagunas grandes con abundante vegetación. **VOZ:** El macho emite una especie de gruñido y otras notas cortas: *ku* o *mu*. **ALIMENTACIÓN:** Vegetación acuática e invertebrados acuáticos.

### Pato Cabecirrojo

Redhead

*Aythya americana*

Lámina 9

**DESCRIPCIÓN** 51 cm (20"). *Macho:* Gris con la cabeza redondeada y de color pardo rojizo; pecho negro; rabadilla y coberteras de la cola, negras. *Hembra:* Toda de color castaño con el vientre blanco. Ambos sexos tienen el pico azul con un anillo blanco y la punta negra. Espéculum gris pálido con delgados bordes blancos. El inmaduro se asemeja a la hembra. La franja gris del ala muy visible en vuelo.

**ESPECIES SIMILARES** El macho del Pato Lomiblanco tiene la espalda blanca, el pico largo y oscuro, y la frente aplastada.

**EXPANSIÓN:** Oeste y sureste de Canadá y nordeste de Estados Unidos; inverna al sur hasta Guatemala; Bahamas y Jamaica. **STATUS:** Casual en Cuba. Tres registros: 27 de nov. (1960); otros dos sin datos. Provincias occidentales. **HÁBITAT:** Lagunas y lagunatos de agua dulce. **VOZ:** *Macho:* Una vibrante nota similar al maullido de un gato. **ALIMENTACIÓN:** Invertebrados acuáticos y vegetación acuática.

### Pato Cabezón o Pato Morisco

Ring-necked Duck

*Aythya collaris*

Lámina 10

**DESCRIPCIÓN** 43 cm (17"). *Macho:* Negruzco con la cabeza violácea, costados grises y una marca blanca en el costado anterior. Espalda negra, vientre blanco. *Hembra:* De color pardo oscuro; blancuzco cerca del pico, con anillo ocular blanco. Ambos sexos con los picos oscuros, azulado en el macho, con un delgado anillo blanco alrededor de la punta; pequeña cresta redondeada, poco evidente en la hembra. Una ancha franja gris es visible en vuelo. Alza el vuelo pataleando el agua.

**ESPECIES SIMILARES** El macho del Pato Morisco tiene la espalda gris, y una prominente franja blanca en las secundarias. Pico azul pálido, con la punta negra.

**EXPANSIÓN:** Norteamérica; inverna al sur hasta Panamá, Bahamas y Antillas. **STATUS:** Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los cayos mayores (septiembre a abril). **HÁBITAT:** Lagunas, estuarios, canales y sabanazos inundados. **VOZ:** Raramente se le escucha, pero puede producir una especie de ronroneo. El macho ocasionalmente emite un leve silbido. **ALIMENTACIÓN:** Insectos acuáticos, caracoles.

### Pato Cabezón Raro\*

Greater Scaup

*Aythya marila*

Lámina 51

**DESCRIPCIÓN** 46 cm (18"). *Macho:* Patrón simple en el plumaje, con el pecho negro, rabadilla y cola de color pardo negruzco. Espalda gris, finamente barrada, vientre blanco; cabeza y cuello con un lustre verde oscuro. *Hembra:* Casi toda de color pardo, con un llamativo parche blanco alrededor de la base del pico. Puede presentar un parche pálido en el oído. Vientre blanco, moteado en pardo. Ambos sexos con el pico azul pálido, y una marcada franja a lo largo del ala que se extiende hasta la punta y es muy visible en vuelo. El inmaduro similar a la hembra, con el parche pálido de la cara reducido. Alza el vuelo pataleando el agua.

**ESPECIES SIMILARES** El Pato Morisco aparentemente tiene la cabeza más redondeada. El macho, con lustre violáceo en la cabeza y el cuello. La

hembra carece del parche blancuzco del oído. En vuelo, la parte blanca del ala no se extiende hasta la punta.

**EXPANSIÓN:** Cría al norte de Norteamérica y norte de Eurasia. Las poblaciones norteamericanas invernan en las costas del Atlántico y del Pacífico de Estados Unidos. **STATUS:** Un individuo observado en Los Canales, Ciénaga de Zapata, en los años 1960. **HÁBITAT:** Lagunatos de agua salobre. **VOZ:** Silencioso en invierno. **ALIMENTACIÓN:** Moluscos y plantas acuáticos.

### Pato Morisco o Pato Negro o Pato Cabezón

Lesser Scaup

*Aythya affinis*

Lámina 10

**DESCRIPCIÓN** 43 cm (17"). **Macho:** Similar al Pato Cabezón Raro, pero algo menor; con lustre violáceo en la cabeza y el cuello; pecho negro; rabadilla y cola de color pardo negruzco. **Hembra:** De color pardo oscuro, con un destacado parche blanco alrededor de la base del pico. En primavera, la hembra puede presentar un marcado parche blanco en el oído. Ambos sexos tienen el vientre blanco y una ancha banda blanca en el ala, pico azul con la punta negra. En vuelo, es visible la franja blanca de las plumas secundarias. Alza el vuelo pataleando el agua.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El macho del Pato Cabezón Raro tiene la cabeza con un lustre verde oscuro. Ambos sexos con la cabeza bien redonda. En vuelo, muestran una franja blanca en las secundarias y la mayor parte de las primarias. (2) El macho del Pato Cabezón tiene la espalda negra; en vuelo es visible la ancha banda gris en el ala. La hembra tiene un anillo blanco en el pico, un anillo ocular blanco y una línea postocular del mismo color.

**EXPANSIÓN:** Noroeste de Norteamérica; inverna por el sur hasta el norte de Suramérica; Bahamas y Antillas. **STATUS:** Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y Cayo Coco (octubre a 21 de abr.). **HÁBITAT:** Sabanazos inundados, lagunas, lagunatos de agua dulce. **VOZ:** Usualmente silencioso. **ALIMENTACIÓN:** Invertebrados acuáticos y vegetación acuática.

### Pato Moñudo

Bufflehead

*Bucephala albeola*

Lámina 10

**DESCRIPCIÓN** 36 cm (14"). **Macho:** Espalda negra, blanco por debajo; cabeza negra, con tonos en violeta o verde lustroso; presenta un gran parche blanco a ambos lados de la cabeza, que es el resultado de la fusión de pequeños parches presentes en las aves durante su primer invierno. Cola gris. **Hembra:** De color pardo oscuro, con el pecho y vientre blancos, y un pequeño parche blanco a cada lado de la cabeza. Ambos sexos tienen

un pico azulado pequeño y el espéculum blanco, que se extiende como parche en todo el ala del macho. El inmaduro se asemeja a la hembra.

**ESPECIES SIMILARES** El macho del Pato de Cresta es mayor, con los costados pardos, y el pico largo y fino.

**EXPANSIÓN:** Canadá y noroeste de Estados Unidos; invernada al sur de Estados Unidos, México; y en las Antillas Mayores. **STATUS:** Casual en Cuba.

Dos registros: uno del siglo XIX y otro el 3 de nov. (1967) en Gibara.

**HÁBITAT:** Lagunas y lagunatos de agua dulce. **VOZ:** Se oye con poca frecuencia. *Macho:* Emite sonidos guturales. *Hembra:* Un corto *quak* y un *guk*. **ALIMENTACIÓN:** Caracoles acuáticos y vegetación acuática.

## Pato de Cresta

Hooded Merganser

*Lophodytes cucullatus*

Lámina 10

**DESCRIPCIÓN** 48 cm (18"). *Macho:* Cabeza, cuello y espalda negros; pecho blanco, costados pardos. *Hembra:* De color pardo, más oscuro en la parte dorsal. Ambos sexos tienen el pico delgado y negro; la mandíbula inferior amarillenta en las hembras. Lucen una cresta que al desplegarla es alta y redondeada. En los machos, decorada con un parche blanco en forma de abanico; en las hembras es de un pardo rojizo, erizada y tupida. En vuelo llevan la cresta aplanada. En Cuba se han observado más hembras que machos.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Pato Serrucho es mayor, con un largo pico rojo. El macho con toda la cabeza verde. (2) El Pato Moñudo es todo blanco por debajo, con la cabeza redonda y el pico corto, grueso y azulado.

**EXPANSIÓN:** Norteamérica; invernada al sureste de Estados Unidos y en México, Bahamas y Puerto Rico. **STATUS:** Raro residente invernal (16 de nov. a abril). **HÁBITAT:** Costas, lagunatos de agua dulce, lagunas, lagos. **VOZ:** Especie de graznidos. **ALIMENTACIÓN:** Peces, crustáceos, insectos.

## Pato Serrucho

Red-breasted Merganser

*Mergus serrator*

Lámina 10

**DESCRIPCIÓN** 58 cm (23"). *Macho:* Espalda y cabeza en negro, con un tono verde lustroso; pecho pardo rojizo, rayado en negro; cuello y un gran parche en el ala, blancos. *Hembra:* Grisácea, con la cabeza y la parte posterior del cuello de color pardo; garganta y pecho blancuzcos. Ambos sexos exhiben un pico largo y rojo, y una notable cresta pardo rojiza. En Cuba se han observado más hembras que machos.

**ESPECIES SIMILARES** El Pato de Cresta es menor. El macho con una prominente y llamativa cresta blanca. La hembra es casi enteramente parda con la cresta de un pardo rojizo, y redondeada.

**EXPANSIÓN:** Norteamérica septentrional y Eurasia. Las poblaciones norteamericanas invernadas en ambas costas hasta México. **STATUS:** Común

residente invernal en los cayos Coco y Romano. (noviembre a 30 de abr.).  
**HÁBITAT:** Bahías y océanos abiertos. **VOZ:** Usualmente silenciosos fuera de la estación de cría. **ALIMENTACIÓN:** Peces, insectos acuáticos, crustáceos.

### Pato Agostero o Pato Chico o Pato Criollo

Masked Duck

*Nomonyx dominicus*

Lámina 10



**DESCRIPCIÓN** 33 cm (13"). **Macho:** En plumaje de cría, color canela con la cara negra, y manchas negras en los costados y parte dorsal; pico azul. **Hembra:** En época de cría, plumaje pardo rojizo con dos franjas negras en la cara, la corona negra y el pico oscuro. Ambos sexos tienen parche blanco en el ala. Fuera de época reproductiva, machos y hembras se asemejan a la hembra en cría, con los tonos del plumaje más pálidos. Los juveniles, similares a la hembra fuera de la época de cría. Los polluelos también exhiben marcadas franjas en la cara y cuatro lunares blancos en la espalda. Aun cuando raramente se les ve volando, al remontarse sobre la superficie lo hacen pateando en el agua. Comúnmente se escabullen durante el día entre la vegetación, flotando semisumergidos; excepto al oscurecer y por la noche, que se aventuran hacia espacios más abiertos.

**ESPECIES SIMILARES** Los machos y hembras del Pato Chorizo fuera de la época de cría, tienen el ala completamente oscura, y tan sólo una franja les cruza la cara.

**EXPANSIÓN:** Costa del Golfo, desde Texas, extendiéndose hasta Centro y Suramérica; Bahamas y Antillas. **STATUS:** Bien distribuido, pero raro residente permanente en Cuba e Isla de Pinos. Vulnerable. Puede observarse en Los Canales y Santo Tomás, en la Ciénaga de Zapata. **HÁBITAT:** Ciénagas, sabanas inundadas, lagunatos, arrozales, canales con abundante vegetación acuática en su superficie. **NIDIFICACIÓN:** Junio a septiembre. Nidifica en las orillas de las lagunas y en campos de arroz, poniendo entre 8 y 18 huevos color crema. **VOZ:** Un corto *du-du-du*, como el cloqueo de una gallina. **ALIMENTACIÓN:** Materia vegetal e insectos acuáticos.



**Pato Chorizo o Pato Rojo o Pato Espinoso**

Ruddy Duck

*Oxyura jamaicensis*

Lámina 10



**DESCRIPCIÓN** 38 cm (15"). *Macho*: En plumaje de cría, pardo rojizo con la corona negra, mejilla blanca y pico azul. Fuera de la época reproductiva, similar a la hembra pero con la mejilla blanca, más pardo por debajo y muy barrado. *Hembra*: De color pardo grisáceo con la corona oscura y un parche claro en la mejilla, surcado por una línea oscura. Pico oscuro. En invierno, más gris con la franja oscura de la mejilla menos marcada. Alzan el vuelo pataleando el agua. El inmaduro se asemeja a la hembra.

**ESPECIES SIMILARES** La hembra y el macho del Pato Agostero fuera de cría tienen dos franjas en la cara y un parche blanco en el ala, mientras que el macho en época de cría muestra una máscara negra.

**EXPANSIÓN:** Canadá, hacia el sur hasta Guatemala; Suramérica; Bahamas y Antillas. **STATUS:** Raro como residente permanente y común como residente invernal y transeúnte en Cuba e Isla de Pinos. **HÁBITAT:** Sabanas inundadas, arrozales, lagunatos, canales. **NIDIFICACIÓN:** Junio a agosto. Nidifica en densa vegetación acuática; pone hasta 6 huevos blancuzcos. **VOZ:** El macho emite un enfático cloqueo durante el cortejo. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente materia vegetal.

**GUINCHO Y GAVILANES Accipitridae****OSPREY, KITES, AND HAWKS**

Aves grandes y de mediano tamaño; voladoras por excelencia, con fuertes picos ganchudos y poderosos dedos prensiles. Las hembras, mayores que los machos, y algunas veces con diferente coloración. Diurnos. Se alimentan de presas vivas, desde caracoles hasta mamíferos. Algunos cazan desde las perchas; otros, mientras vuelan. El nido es por lo general una rústica plataforma situada en lo alto de los árboles. Desafortunadamente, las especies mayores


tienen la mala reputación de atacar aves domésticas, y muchos son blanco de las armas de fuego. Poco frecuentes cerca de asentamientos humanos. (M:240; C:12)

### Guincho o Guaraguao de Mar

Osprey

*Pandion haliaetus*

Lámina 12



**DESCRIPCIÓN** 58 cm (23"). Pardo oscuro por encima, blanco por debajo. En vuelo exhibe un llamativo parche negro en la curvatura del ala, así como las puntas negras. Los individuos migratorios tienen una franja oscura que les cubre ambos ojos y que es casi negra en los machos; los residentes permanentes son más pálidos por encima, con la cabeza del todo blanca, o con la franja muy poco definida. Las hembras presentan el pecho ligeramente manchado en pardo. Los inmaduros tienen el dorso y las coberteras superiores del ala bordeadas de beige; la corona con rayas más pronunciadas. Para atrapar los peces se lanza en picada, introduciendo primero las garras en el agua. Presenta un característico perfil en vuelo, con las alas algo dobladas hacia atrás. Raramente plana.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** Todos los continentes excepto la Antártica. En Suramérica sólo durante el invierno. Las Bahamas y las Antillas. **STATUS:** Común como residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y cayos (10 de ago. a 25 de may.). Los residentes permanentes están representados por la raza local, que es mucho más escasa que los visitantes invernales, y sólo se la encuentra en las cayerías. Se han registrado individuos de la forma migratoria nidificando en Cuba. **HÁBITAT:** Aguas poco profundas cerca de cayos, lagunas, lagunatos, presas y otros tipos de depósitos. Menos frecuente a lo largo de las costas. **NIDIFICACIÓN:** Octubre a mayo. Construye grandes nidos con ramitas en promontorios rocosos, o en tocones. Pone 3 huevos grandes de color crema con manchas de color avellana. La raza norteamericana cría también en Cuba (dos registros). **VOZ:** Una serie de cortos pero altos silbidos. **ALIMENTACIÓN:** Peces que captura lo mismo en agua dulce que salada.

**Gavilán Caguarero o Gavilán Sonso o Guaraguao**

Cuban Kite

*Chondrohierax wilsonii*

Lámina 11



**DESCRIPCIÓN** 38 cm (15"). *Macho*: De color ceniciento, aunque parece blancuzco a distancia; barrado por debajo, la mayor parte en gris. *Hembra*: De color pardo oscuro, con visibles barras rojizas sobre pecho y vientre blancuzcos. Ambos sexos tienen la cola larga y con bandas, y un robusto y fuerte pico ganchudo. La cera y la piel de la cara, azules. El ojo en el adulto es blanco azulado. Volando se destacan las alas redondeadas con muy marcadas barras en blanco y negro en las primarias. La hembra inmadura presenta en la cabeza y el dorso superior manchas blancas. Borde de las plumas del ala de un pardo rojizo.

**ESPECIES SIMILARES** El Gavilán Bobo tiene el pico pequeño, alas y cola más cortas.

**EXPANSIÓN:** Endémico de Cuba. **STATUS:** Globalmente amenazada. En crítico peligro de extinción. Existen cuatro reportes visuales en los últimos 30 años (el más reciente en Yateras y Yunque de Baracoa, 2001).

**HÁBITAT:** Reportado por Gundlach en 1850 de la Ciénaga de Zapata, y en 1876 de Cienfuegos; pero con posterioridad sólo se le ha encontrado en las montañas húmedas del grupo Sagua-Baracoa, de las provincias de Holguín y Guantánamo. **NIDIFICACIÓN:** Desconocida. **VOZ:** Desconocida. **ALIMENTACIÓN:** Babosas.

**Gavilán Cola de Tijera**

Swallow-tailed Kite

*Elanoides forficatus*

Lámina 11

**DESCRIPCIÓN** 58 cm (23"). Alas largas y puntiagudas, negro por encima, blanco y negro por debajo. Espalda y cola negras; cabeza, pecho, coberturas inferiores del ala y vientre, blancos. Cola larga, prominentemente bifurcada. El inmaduro similar al adulto, pero con los colores más pálidos, y algunas rayas finas en la cabeza y el pecho.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** Del sureste de Estados Unidos hasta el norte de Argentina; inverna en Suramérica. Se le encuentra regularmente en las Antillas Mayores occidentales.

**STATUS:** Poco común como transeúnte, y tal vez muy raro como residente invernal en Cuba (23 de jul. a dic. y febrero hasta abril). **HÁBITAT:** Ciénagas, sabanas, estuarios, terrenos desmontados. **VOZ:** Un alto y resonante silbido: *qui-iii-iii*, *yi-iii-iii*, con la primera nota muy corta.

**ALIMENTACIÓN:** Reptiles (especialmente lagartos y culebras), ranas, insectos, así como pichoncitos. Usualmente come en vuelo.

### Gavilán Caracolero o Gavilán Babosero

Snail Kite

*Rostrhamus sociabilis*

Lámina 11



**DESCRIPCIÓN** 43 cm (17"). **Macho:** Pardo muy oscuro, que parece casi negro a distancia. Base del pico, ojo y patas de color anaranjado rojizo.

**Hembra:** De un pardo oscuro con rayas en el pecho y vientre. Frente, garganta y franja sobre el ojo, blancuzcas. Patas amarillas o anaranjadas. Ambos sexos tienen el pico largo y finamente ganchudo, un parche blanco en la base de las primarias, y la cola con una ancha base blanca. **Inmaduro:** Se asemeja a la hembra, pero con ojos y patas más pálidos; dorso y alas con cierta apariencia escamosa, causada por el borde más pálido de las plumas; con un viso pardusco claro por debajo. El vuelo es lento, con planeos alternos. Las alas se mantienen horizontales, típicamente bajas y con la punta de las primarias curvadas hacia arriba. La cola aparentemente de forma triangular; con frecuencia la doblan de acuerdo con la posición del ave en vuelo.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Gavilán Sabanero tiene las alas más estrechas, la rabadilla blanca (no en la base). Volando, la silueta es la de una V. (2) El Gavilán Batista tiene la cola con bandas; patas gruesas, y el pico más grueso y mucho menos ganchudo. (3) El Aura Tiñosa es toda negra con la cabeza desnuda, roja o rosada; usualmente planea con un perfil en V.

**EXPANSIÓN:** Sur de la Florida; México hasta Argentina. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, aunque mucho más escaso en Isla de Pinos

y algunos cayos, como el de Santamaría. Común en la Laguna del Tesoro y en Laguna Grande. **HÁBITAT:** Ciénagas, lagunas, lagunatos, campos inundados, arrozales, canales y presas. **NIDIFICACIÓN:** Abril a julio. Construye el nido a baja altura, en arbustos o árboles. Varía desde una simple plataforma hasta una estructura compacta. Pone 3 huevos blancos, manchados en pardo rojizo. **VOZ:** Una especie de cacareo seco y ronco: *ga-ga-ga-ga*. **ALIMENTACIÓN:** Caracoles acuáticos (*Pomacea*) que atrapa con las garras y que, una vez ya fuera del agua, lleva a su percha favorita para extraerles el molusco.

## Gavilán de Mississippi

Mississippi Kite

*Ictinia mississippiensis*

No ilustrado

**DESCRIPCIÓN** 37 cm (14,5"). Gris por encima, más pálido por debajo; cabeza gris, más pálida en el macho. Alas largas y finas, con las primarias más externas marcadamente más cortas; la punta del ala de color negro. Por arriba se observan las secundarias con la parte distal blanca formando un parche en el ala. Cola negra, larga y algo bifurcada. Aves con el plumaje del primer verano se asemejan al adulto, pero con las plumas del ala y cola con el patrón juvenil. Juvenil muy rayado y marcado, cola con pálidas bandas.

**ESPECIES SIMILARES** Halcón Peregrino es más robusto; cola redondeada y alas más anchas.

**EXPANSIÓN:** Centro, sur y este de los Estados Unidos. Casual en los Grandes Lagos y California. Pasa el invierno en Suramérica. **STATUS:** Raro transcúente en Cuba. Cuatro registros (tres individuos): 17 de abr. (1999) en Boca de Jaruco, La Habana; 20 de abr. (2009) en Ciudad La Habana; 30 de mar., 1 y 2 de abr. (2010) en Ciénaga de Zapata. **HÁBITAT:** Áreas abiertas. **VOZ:** Se asemeja al Gavilán Bobo: *chi-chuii* descendente. **ALIMENTACIÓN:** Insectos capturados en vuelo.

## Águila Calva

Bald Eagle

*Haliaeetus leucocephalus*

No ilustrado

**DESCRIPCIÓN** 79–94 cm (31"). Cabeza y cola blancas. Pico amarillo. Resto del plumaje de color pardo. Juveniles: mayormente pardos; coberteras inferiores del ala y plumas axilares, así como la base de la cola, de color blancuzco. Necesita de 4 a 5 años para adquirir el plumaje de adulto.

**ESPECIES SIMILARES** En Cuba, la rapaz más grande es el Gavilán de Monte; el juvenil es mucho más pequeño y no presenta el patrón de blanco bajo el ala y la base de la cola que tiene el Águila Calva.

**EXPANSIÓN:** Cría en Norteamérica en la región de la Taigá, Baja California, Sonora, Arizona, parte central de Nuevo México y Texas, costa del Golfo y sur de la Florida; suele pasar el año entero en gran parte del oeste,

centro y este de Norteamérica. El invierno lo pasa a través de su área de cría al norte hasta el sur. Más frecuentemente al sur de Alaska y sur de Canadá. Registros visuales en Puerto Rico, Bermuda, nordeste de Siberia e Irlanda. **STATUS:** Muy raro residente invernal. Ocho registros: Noviembre (1997); 11 de feb. (1998); 8, 5 y 14 de dic. (2002); 4, 5 y 19 de mar. (2004). El Salado, el río Banes, Las Terrazas, La Habana, El Salto, Valle de Viñales, Pinar del Río. **HÁBITAT:** Costas y lagunas. **ALIMENTACIÓN:** Peces en la época reproductiva y carroña durante el invierno.

### Gavilán Sabanero o Gavilán de Ciénaga

Northern Harrier

*Circus cyaneus*

Lámina 12

**DESCRIPCIÓN** 53 cm (21"). **Macho:** Gris pálido o pardo oscuro, muy pálido en la parte ventral; cola ligeramente barrada. **Hembra:** De color pardo oscuro, con el pecho y el vientre blancuzcos y rayados, cola con marcadas bandas. **Inmaduro:** Pardo oscuro con el pecho, vientre y borde anterior de las coberteras del ala acanelados. Ambos sexos, e inmaduros, tienen la cola larga, rabadilla blanca, patas largas y un disco facial que les da la apariencia de una lechuza. Devoran las presas en el sitio de captura. Vuelan bajo, con planeos erráticos y con las alas ligeramente extendidas hacia arriba, en forma de V. Más que las perchas, prefieren el suelo, donde duermen en grupos.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Gavilán Colilargo posee el vuelo típico del género. Además, suele mantener el vuelo en una misma dirección; alas en una posición más horizontal. No posee la rabadilla blanca, pero sí se pueden apreciar las blancas coberteras inferiores de la cola cubrir la parte superior de la misma y dar la impresión de tener la rabadilla blanca. (2) El Gavilán Caracolero presenta el pico muy ganchudo, las alas más anchas y redondeadas, blanca la base de la cola, y mantiene las alas horizontales.

**EXPANSIÓN:** Norteamérica y Eurasia. Las poblaciones norteamericanas invernan al sur hasta Islas Bahamas y las Antillas, y raramente al norte de Suramérica. **STATUS:** Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y cayos del norte (8 de ago. a 24 de abr.). **HÁBITAT:** Terrenos abiertos y planos, potreros, sabanas herbosas. **VOZ:** Usualmente silencioso. **ALIMENTACIÓN:** Roedores, reptiles, ranas, insectos grandes y, ocasionalmente, pichones.

### Gavilancito o Halconcito o Falconcito

Sharp-shinned Hawk

*Accipiter striatus*

Lámina 12

**DESCRIPCIÓN** 30 cm (12"). Gris azulado por encima, blancuzco por debajo, con el pecho y vientre barrados en pardo rojizo. Ligeramente de cuerpo,



con una cola larga y cuadrada, y las alas cortas y redondeadas. Cabeza pequeña que en vuelo apenas sobresale del borde anterior de las alas. El inmaduro, pardo oscuro por encima, con el pecho y vientre rayados; pudiera presentar algunas marcas blancas en las partes superiores. Al igual que otras especies del género *Accipiter*, su vuelo se caracteriza por bajos y rápidos aleteos, que alterna con cortos planeos.

**ESPECIES SIMILARES** El Gavilán Colilargo es mayor; en vuelo la cabeza sobresale del borde anterior de las alas; cola más ancha en la base y redondeada en la punta.

**EXPANSIÓN:** En toda las Américas; Bahamas, Cuba, La Española y Puerto Rico; inverna al sur de Estados Unidos, Panamá y Antillas Mayores. **STATUS:** Raro residente permanente en Cuba. En peligro. Individuos migratorios de la raza norteamericana son raros como residentes invernales.

**HÁBITAT:** Bosques, generalmente en alturas medias. **NIDIFICACIÓN:** Desconocida en Cuba. **VOZ:** Un alto y repetido *quik*. **ALIMENTACIÓN:** Prácticamente sólo aves pequeñas.

### Gavilán Colilargo

Gundlach's Hawk

*Accipiter gundlachi*

Lámina 12



**DESCRIPCIÓN** 48 cm (19"). Gris azulado por encima; blanco por debajo, con fino barrado acanelado pálido. Cabeza pequeña que en vuelo sobresale del borde anterior de las alas. Alas alargadas y anchas, más estrechas

hacia los extremos. Cola larga, redondeada y con bandas que, vistas desde arriba, permiten apreciar la punta bordeada de blanco. Coberteras inferiores de la cola blancas, como en el Gavilancito; estas a menudo cubren el dorso de la base de la cola. El inmaduro, pardo por encima, muy rayado en pardo por debajo. En ocasiones planca durante largos períodos.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Gavilancito es menor, con la cola cuadrada y fina en su base. En vuelo, la cabeza pequeña apenas sobresale del borde anterior de las alas. (2) La hembra del Gavilán Sabanero tiene la rabadilla blanca; en vuelo exhibe las alas en forma de V. (3) El Gavilán Bobo tiene la cola más corta, las alas blancuzcas por debajo, con la punta negra.

**EXPANSIÓN:** Endémico de Cuba. Se reporta para los cayos Coco y Guajaba, archipiélago Sabana-Camagüey. **STATUS:** Globalmente amenazada. Bien distribuido, pero raro y local, aunque menos raro en la Ciénaga de Zapata, Casilda y Gibara. Vulnerable. **HÁBITAT:** Bosques, borde de ciénagas.

**NIDIFICACIÓN:** Diciembre a junio. Anida alto en árboles. Como nido, construye una plataforma no muy grande, plana, con ramitas y hierbas. Pone de 2 a 4 huevos blancos con cierto viso verdoso. **VOZ:** En defensa del nido, una especie de cacareo largo: *cak-cak-cak-cak*. Volando, también un silbido. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente aves: cotorras, gallinuelas y palomas, entre otras.

### Gavilán Batista o Gavilán Cangrejero

Cuban Black-Hawk

*Buteogallus gundlachi*

Lámina 12



**DESCRIPCIÓN** 53 cm (21"). De color achocolatado muy oscuro; alas anchas y redondeadas con un visible parche blanco en la base de las primarias, muy evidente en vuelo. Cola relativamente corta con anchas bandas blancas y negras. Base del pico y patas en amarillo o anaranjadas. Se le observa posado con frecuencia. El inmaduro, rayado y pálido, con marcadas rayas en la cabeza, y la cola con numerosas bandas. Vuela con las alas horizontales, mostrando la punta de las primarias ligeramente curvadas hacia arriba.



**ESPECIES SIMILARES** (1) El inmaduro del Gavilán Bobo es menor, con menos marcas blancas en la cara y patas más finas. (2) El inmaduro del Gavilán de Monte es mayor, con un parche blanco en el pecho. (3) El Gavilán Caracolero presenta la base de la cola bien blanca, las patas anaranjadas, y el pico, además de anaranjado en la base, finamente aguzado en la punta. (4) El Gavilán Caguarero tiene el pico muy robusto y ganchudo, alas y cola más largas, esta última suele estar semiabierta.

**EXPANSIÓN:** Endémico de Cuba. **STATUS:** Común en Cuba, Isla de Pinos y cayos.

**HÁBITAT:** Manglares, orilla de las playas, esteros fangosos y ciénagas costeras. **NIDIFICACIÓN:** Enero a julio. Anida en árboles a moderada elevación. El nido es compacto y no muy grande. Lo construyen con ramitas, palitos y hojas. **Pone 3 huevos de color crema oliváceo, con manchas pardas.** **VOZ:** Un silbido peculiar y alto que parece repetir las sílabas *ba-tis-ta*, con énfasis en la segunda sílaba. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente cangrejos, aves.

### Gavilán Bobo o Guaraguo o Gavilán Sonso

Broad-winged Hawk

*Buteo platypterus*

Lámina 12



**DESCRIPCIÓN** 38 cm (15"). Pardo oscuro por encima, barrado por debajo.

Alas anchas y ligeramente aguzadas hacia el extremo, blancas por debajo con la punta negra. El inmaduro tiene el pecho rayado en pardo; las bandas de la cola más pálidas y muy numerosas.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Gavilán Colilargo tiene la cola más larga; las alas ligeramente más estrechas, pero carece de puntas negras. (2) El inmaduro del Gavilán de Monte es mayor, con un marcado parche blanco en el pecho. (3) El inmaduro del Gavilán Batista es mayor, con las marcas blancas en la cabeza mucho más visibles; parche blanco en la base de las primarias, sólo visible en vuelo; patas más gruesas.

**EXPANSIÓN:** Canadá y este de Estados Unidos; inverna al sur, hasta Perú y Brasil; Cuba, Puerto Rico, y desde Antigua hasta Granada y Tobago. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba y raro como residente invernal (19 de ago. a 9 de may.). **HÁBITAT:** Bosques, bien preservados, y pinares. **NIDIFICACIÓN:** Enero a julio. Anida en árboles. Construye con ramitas una

plataforma pequeña y poco consistente. Pone 3 huevos blancos marcados en pardo. **VOZ:** Un silbido de dos tonos, la segunda nota más larga *qui-diii*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente grandes insectos, aves y reptiles.

### Gavilán de Monte o Gavilán Pollero o Guaraguao

Red-Tailed Hawk

*Buteo jamaicensis*

Lámina 12



**DESCRIPCIÓN** 56 cm (22"). Pardo por encima, blancuzco por debajo con grandes marcas pardas en el vientre. Alas largas, anchas y redondeadas, con visibles barras oscuras; una gruesa barra en el borde de la curvatura del ala; las primarias se ven bien separadas cuando planea. Cola rojiza en los adultos, barrada y parda en los jóvenes. A veces vuela en compañía del Aura Tiñosa.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Gavilán Bobo es menor, con marcadas bandas en la cola y con la punta de las alas en negro. (2) El inmaduro del Gavilán Batista presenta el pecho rayado; la cola con las bandas más estrechas. (3) El Aura Tiñosa es toda de color pardo oscuro, con la cabeza roja.

**EXPANSIÓN:** Norte de Norteamérica hasta Panamá; norte de las Bahamas, Antillas Mayores y norte de las Antillas Menores. **STATUS:** Un común y ampliamente distribuido residente permanente en Cuba. También en Cayo Coco, archipiélago Sabana-Camagüey. **HÁBITAT:** En bosques al nivel del mar y en elevaciones medias, incluidos los bosques cenagosos. **NIDIFICACIÓN:** Enero a julio. Nidifica en árboles altos. Construye una estructura compacta con ramitas, entremezcladas con finos retoños y cortezas. Pone 3 huevos blancos, con manchas pardas y castañas. **VOZ:** Un prolongado, poco agradable y algo descendente silbido, *quiiiaaar*, que emite en vuelo, sobre todo durante la época de cría. **ALIMENTACIÓN:** Aves, jutías jóvenes (roedores endémicos arbóreos), chipojos, otros vertebrados y grandes insectos.

## CARAIRA Y HALCONES Falconidae

### CARACARAS AND FALCONS

Aves grandes y de mediano tamaño, con cabeza relativamente grande; pico gancludo y fuerte. Alas estrechas, más o menos aguzadas en la punta;

cola larga, que se afina hacia el extremo. Los halcones son veloces cazadores aéreos que suelen capturar variadas presas, como libélulas, lagartos, pájaros y murciélagos. Sexos usualmente semejantes (M:63; C:4)

### Caraira

Crested Caracara

*Caracara cheriway*

Lámina 13



**DESCRIPCIÓN** 56 cm (22"). Casi toda negra, aclarando el color hasta blanco hacia la cabeza, con una llamativa corona negra. La zona desnuda de la cara, roja o rojizo anaranjada. Alas más bien anchas y redondeadas, con parches blancos; cola blanca, finamente barrada, con una ancha banda negra subterminal; patas de color amarillo oliváceo. El inmaduro, pardo pálido, con la garganta blancuzca y algunas marcadas rayas en el pecho; patas grises. Raramente planea; se le observa con frecuencia en el suelo. El vuelo es muy característico, con pronunciados aleteos hacia abajo.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** Florida, norte de Baja California, suroeste de Arizona y Texas hasta el oeste de Panamá. Cuba. **STATUS:** Poco común y local en Cuba, Isla de Pinos, pero bastante común en algunos de los cayos del norte y las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. **HÁBITAT:** Pastizales, sabanas de palmetos, manglares. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a diciembre. Construye una estructura grande de palos, bejucos y hierbas, en palmetos relativamente bajos, y también en otros árboles altos en curujeyes. Pone 2 o 3 huevos blancos o de color crema, con manchas en pardo oscuro. **VOZ:** Un llamado de alarma: *caracá-caracá*. **ALIMENTACIÓN:** Carroña y presas que se caracterizan por un lento movimiento, como cangrejos, pollitos y jicoteas.

### Cernícalo

American Kestrel

*Falco sparverius*

Lámina 13

**DESCRIPCIÓN** 25 cm (10"). *Macho:* Gris azulado en las alas; cola sin barras y con una banda subterminal negra. *Hembra:* Alas rojizas; espalda y cola barradas. Ambos sexos tienen la espalda y la cola rojizas, cabeza con dos



frangas faciales verticales y falsos ojos (puntos) en la nuca. La raza cubana presenta dos morfós en su coloración; uno con el pecho y vientre blancos; el otro con el pecho y vientre rojizos. El macho no presenta marcas por debajo, algunos con aislados ocelos o puntos en los costados. La hembra, frecuentemente, con rayas en el pecho; otras pueden presentar ocelos, o son barradas en la parte ventral. Los inmaduros rayados por debajo. Los visitantes invernales de Norteamérica se diferencian por presentar las partes ventrales muy rayadas o con puntos y ocelos con un viso acanelado. Además son muy tímidos (no permiten el acercamiento del hombre). Con frecuencia se posa en ramas altas peladas, puntas de las palmas, o postes del tendido telefónico. Cuando caza, puede permanecer aleteando en el aire en el mismo sitio atisbando a sus presas, que consisten en roedores, lagartijas e insectos.

**ESPECIES SIMILARES** El Halconcito de Palomas es azul grisáceo en el dorso (macho) o pardo oscuro (hembra), y presenta una simple línea facial. Muy rayado en la parte ventral. De vuelo usualmente más rápido.

**EXPANSIÓN:** Norte, Centro y Suramérica; Islas Bahamas, las Antillas. **STATUS:** Común como residente permanente, y visitante invernal (26 de ago. a mayo) en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Terrenos abiertos, áreas cultivadas, alrededores de poblaciones rurales, bordes de carreteras y terraplenes. **NIDIFICACIÓN:** Diciembre a junio. Utiliza los nidos abandonados de los pájaros carpinteros, palmas desmochadas, cavidades naturales de árboles. Pone 3 o 4 huevos de color crema y muy manchados de rojizo, o con manchas pardas. **VOZ:** Un alto y repetido *quily-quily-quily*. **ALIMENTACIÓN:** Lagartijas (*Ameiva*, *Leiocephalus*, *Anolis*), ratoncitos e insectos grandes, como esperanzas, grillos, libélulas y pequeños pájaros. Los visitantes norteños han sido observados cazando murciélagos.

### Halconcito de Palomas o Halconcito o Falcón

Merlin

*Falco columbarius*

Lámina 13

**DESCRIPCIÓN** 30 cm (12"). *Macho:* Azul oscuro grisáceo por encima. *Hembra:* De color pardo por encima con las coberteras superiores de la cola

grises. Ambos sexos acanelados por debajo con rayas pardas, y franja facial bajo el ojo, poco definida. Cola con bandas muy marcadas, de color gris pálido y negro, con la punta blanca. Vuelo muy rápido. El inmaduro similar a la hembra, pero de un pardo uniforme por encima; invariablemente más fornidos, oscuros y rápidos que el Cernícalo.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Cernícalo tiene la espalda y la cola rojizas. (2) El Halcón Peregrino es mayor, con las marcas faciales muy bien definidas.

**EXPANSIÓN:** Hemisferio norte, inverna al sur hasta las Antillas, Bahamas y Suramérica. **STATUS:** Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los cayos mayores (2 de sept. a 2 de may.).

**HÁBITAT:** Territorios semiabiertos, arboledas, vegetación costera baja.

**VOZ:** Una especie de gorjeo sordo. **ALIMENTACIÓN:** Aves pequeñas, roedores, grandes insectos. Estos visitantes norteños han sido observados cazando murciélagos.

### Halcón Peregrino o Falcón o Halcón de Patos

Peregrine Falcon

*Falco peregrinus*

Lámina 13

**DESCRIPCIÓN** 46 cm (18"). Pardo oscuro o gris pizarra en la parte superior, con la cabeza negra y partes ventrales blancuzcas, barradas en pardo. Una variable franja facial, vertical y negra. Cola larga, que se afina hacia el extremo y está ligeramente barrada. El inmaduro es pardo por encima, con el pecho y el vientre rayados en pardo. Los machos son mucho más pequeños que las hembras.

**ESPECIES SIMILARES** El Halconcito es menor, con las marcas faciales menos definidas.

**EXPANSIÓN:** Mundialmente distribuido; las poblaciones norteamericanas invernan hasta Suramérica, Bahamas y las Antillas. **STATUS:** Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los cayos del norte (6 de oct. a 17 de abr.). **HÁBITAT:** Ciénagas, sabanas inundadas, lagunas, arrozales, ciudades. **VOZ:** Un ronco *cak-cak-cak-cak*, y también una serie de notas discordantes y discontinuas. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente aves, en especial acuáticas; en áreas urbanas; palomas domésticas, totíes y, en ocasiones, murciélagos.

## FAISÁN, CODORNIZ Y GALLINA DE GUINEA Phasianidae

### PHEASANTS, QUAILS, AND GUINEAFOWLS

Compactas; andadoras con cortas alas redondeadas, raramente vuelan. Pico corto. El alimento consiste básicamente en semillas obtenidas en el terreno, donde la vegetación es algo densa. Usualmente vuelan pequeñas distancias, si son perturbadas. Por lo general sexos diferentes. (M:177; C:3)

**Faisán de Collar**

Ring-necked Pheasant

*Phasianus colchicus*

Lámina 51

**DESCRIPCIÓN** *Macho*: 84 cm (33"). Grande, multicolor e iridiscente. Cabeza verde a púrpura, con una llamativa piel roja desnuda en la cara, y generalmente un anillo blanco en el cuello. Cola larga y afinada hacia la punta. *Hembra*: 53 cm (21"). Más pequeña, de un pardo moteado, con cola más corta. Ambos sexos tienen alas cortas y redondeadas. Ante una señal de alarma, levantan el vuelo bruscamente, batiendo las alas con fuerza.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN**: Asia. Amplia introducción en Europa, Islas Hawaii, Nueva Zelanda y América del Norte. **STATUS**: Introducida con poco éxito en Guanahacabibes, Ciénaga de Lanier (Isla de Pinos) y Topes de Collantes.

**HÁBITAT**: Campos abiertos herbosos. **VOZ**: *Macho*: Un alto *jaa-jaak*, seguido por un batir de alas. Ambos sexos emiten graznidos ante una señal de alarma. **ALIMENTACIÓN**: Omnívoro.

**Codorniz**

Northern Bobwhite

*Colinus virginianus*

Lámina 13



**DESCRIPCIÓN** 23 cm (9"). *Macho*: Pardo rojizo moteado, con ceja y garganta blancas, y gran parche negro en el pecho. *Hembra*: De color pardo por encima, el vientre blancuzco barrado, y la garganta beige. Ambos sexos presentan los costados y flancos de un pardo rojizo, y una corta cola gris. El juvenil se asemeja a la hembra adulta, pero con colores más pálidos. Se reúnen en pequeñas bandadas.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN**: Sur de Ontario; este y centro de Estados Unidos hasta Guatemala. Cuba. Introducida en La Española, Puerto Rico, St. Croix, Andros, y Nueva Providencia en las Bahamas. **STATUS**: Común residente permanente en Cuba e Isla de Pinos; posiblemente introducida. **HÁBITAT**: Sabanas, pastizales y en terrenos abiertos con vegetación arbustiva.

**NIDIFICACIÓN:** Abril a julio. El nido lo construye en la hierba; una depresión en el terreno revestida con hierbas, provista de una entrada lateral. Pone hasta 18 huevos blancos. **VOZ:** Un alto y doble silbido; el segundo más alto y más largo: *bob-juait*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, frutas, retoños e insectos.

## Gallina de Guinea o Guinea o Guineo

Helmeted Guineafowl

*Numida meleagris*

Lámina 13

**DESCRIPCIÓN** 56 cm (22"). Negro grisáceo; todo el plumaje finamente manchado de blanco. Tiene morfo blanco. Se les encuentra por lo general cerca de las fincas, junto a otras aves domésticas. Cabeza y cuello desnudos. Excelente corredor que rara vez alza el vuelo.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** África. **STATUS:** Introducida durante la trata de esclavos (siglo XVI) y establecida completamente cerca de fincas y pueblos. **HÁBITAT:** Tiempo atrás común en pastos, sabanas y campos herbosos con arbustos bajos. Actualmente mucho más rara. **NIDIFICACIÓN:** Nidifica en el suelo, donde pone hasta 16 huevos de color pardo claro. **VOZ:** Un alto y rechinante *cherrr* o *quek-quek-quek-crrr* como llamada de alarma. También un alto *pas-cual, pas-cual*. La hembra en plumaje de cría emite un repetido llamado: *pi-tu*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, insectos, moluscos, brotes tiernos.

## GALLINUELAS Y GALLARETAS Rallidae

### RAILS, GALLINULES, AND COOTS

Aves semiacuáticas pequeñas o de mediano tamaño, con patas y dedos largos, cuerpo algo compacto y comprimido, alas redondeadas. Las gallaretas nadan muy bien y pasan gran parte del tiempo en el agua. Semillas y granos se incluyen en su dieta, así como invertebrados acuáticos. Sin embargo, las gallinuelas nadan en ocasiones y son en extremo escurridizas y casi estrictamente carnívoras. Cuando levantan el vuelo lo hacen con las patas colgando. Todas son ágiles y buenas corredoras. El nido, globoso y en forma de copa, lo construyen con vegetación seca. Los pichoncitos son prácticamente negros. Sexos similares. (M:142; C:12)

## Gallinuelita Prieta

Black Rail

*Laterallus jamaicensis*

Lámina 14

**DESCRIPCIÓN** 14 cm (5,5"). Muy pequeña, de un gris pizarra muy oscuro; dorso y alas cubiertos de pequeños puntos blancos, nuca color canela