

marcado en las coberteras inferiores de la cola; las plumas centrales de la cola asoman claramente. El vuelo es rápido, parecido al de un halcón. Al igual que el Estercorario Pomarino, se identifican mejor cuando andan en persecución de otras aves marinas.

ESPECIES SIMILARES (1) El Estercorario Pomarino es mayor, con las alas más anchas en su base; las plumas centrales de la cola anchas y romas; una ancha banda oscura en el pecho. El área pálida en la base de las coberteras primarias debajo del ala es una característica que las identifica. El juvenil está fuertemente barrado por debajo, con un marcado parche blanco sobre las primarias. (2) El Estercorario Rabero tiene las alas estrechas; las plumas del centro de la cola muy largas y terminadas en punta, y todo el pecho blanco. Resulta prácticamente ausente la parte blanca de las primarias superiores. Los juveniles de ambos morfos exhiben un marcado barrado por debajo de las alas y en las coberteras inferiores de la cola. (3) La Skua del Polo Sur es mayor, con alas más anchas y la cola más corta.

EXPANSIÓN: Cría en latitudes árticas de Norteamérica y Eurasia; inverna en mares del hemisferio sur. **STATUS:** Muy raro visitante de los mares cubanos (julio a 28 de oct. y marzo a 14 de abr.). **HÁBITAT:** Oceánico. **VOZ:** Usualmente silencioso en el invierno. **ALIMENTACIÓN:** En su mayoría, peces que captura arrebatándoselos en vuelo a otras aves marinas.

Estercorario Rabero

Long-tailed Jaeger

Stercorarius longicaudus

Lámina 20

DESCRIPCIÓN 41 cm (16"). Gris por encima, con contrastantes plumas oscuras del ala. Los individuos del morfo claro tienen el pecho blanco, tornándose en gris hacia la cola. La cabeza, negra por encima, con un viso amarillo en los lados del cuello y la nuca. El raro morfo oscuro es enteramente pardo oscuro por debajo. Las plumas centrales de la cola muy largas y terminadas en punta. Los adultos en plumaje de invierno tienen un visible barrado en las coberteras inferiores de la cola y en los flancos, como el juvenil; collar gris y casquete poco visible, plumas centrales de la cola más cortas. Los juveniles de ambos morfos tienen estas plumas cortas, fuertemente barrados por debajo del ala y en las coberteras inferiores de la cola; parte superior del ala, oscura; y un parche blancuzco por debajo. Configuración delgada, similares a las gaviotas en vuelo.

ESPECIES SIMILARES (1) El Estercorario Pomarino tiene las plumas centrales de la cola cortas y anchas, alas más anchas con un parche blanco por encima y una banda oscura en el pecho. El juvenil es más oscuro por encima, con fuerte barrado por debajo, y un visible parche blanco en las primarias. (2) El Estercorario Parasítico tiene las plumas centrales de la cola terminadas en punta pero cortas; las alas más anchas con un parche blanco por encima; por lo general, una banda pardusca en el pecho. El juvenil tiene

un parche blanco en la base de las terminales. (3) La Skua del Polo Sur es mayor, con alas más anchas y la cola más corta.

EXPANSIÓN: Cría en latitudes árticas de Norteamérica y Eurasia; inverna al sur hasta los océanos del hemisferio sur. **STATUS:** Casual en aguas cubanas. Dos registros: 29 de nov. (1937) y marzo (1953) en Caibarién y Gibara. **HÁBITAT:** Oceánico. **VOZ:** Por lo general silencioso en invierno. **ALIMENTACIÓN:** Aves, peces y desperdicios.

PINGÜINITO Alcidae

AUKS

Aves oceánicas de pequeño o mediano tamaño con apariencia de pingüinos: casi negros por encima, blancos por debajo. Pico, cuello y patas cortos. Alas cortas y estrechas. Aleteo bajo y rápido. Se alimenta de invertebrados marinos y peces que captura buccando; las alas le permiten nadar bajo el agua. Sexos semejantes. (M:24; C:1)

Pingüinito

Dovekie

Alle alle

Lámina 23

DESCRIPCIÓN 20 cm (8"). Pequeño; negro por encima, blanco por debajo, puede presentar un viso pardusco en el pecho. En época de cría, la cabeza, garganta y pecho negros. Cola y pico muy cortos.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Cría en costas árticas, inverna en el Atlántico Norte. **STATUS:** Casual en aguas cubanas. Ocho registros: 12 de nov. (1929), 11 de nov. (1932), 21 de dic. (1943); 9 de dic. (1946), 1950, 7 de dic. (1962) y dos sin fecha. Bahía de Matanzas, Gibara y Trinidad. **VOZ:** Silencioso fuera de sus territorios de cría. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente plancton.

PALOMAS Columbidae

PIGEONS AND DOVES

Aves de mediano tamaño y cuerpo pesado, con cabeza pequeña; alas y patas relativamente cortas. Plumaje por lo general de un rojizo pardo, con marcas poco llamativas pero visibles en vuelo. Algunas presentan coloración iridiscente en la cabeza o cuello. Suelen andar en pareja, y algunas especies, en bandadas. Vuelo muy rápido. Las palomas se alimentan en el suelo o en los árboles, básicamente de granos y frutas. Los nidos son estructuras poco elaboradas que sitúan en la parte baja de los árboles; por lo regular, ponen 2 huevos blancos inmaculados. Los pichones son alimentados por

regurgitación de un líquido denominado "leche de paloma". Sexos generalmente similares, las hembras de coloración más pálida. (M:310; C:13).

Paloma Doméstica

Rock Dove

Columba livia

Lámina 24

DESCRIPCIÓN 32 cm (12,5"). Coloración que varía desde el blanco hasta el gris, y del pardo al negro. El patrón de color ancestral es gris, con rabadilla blanca y barras negras en el ala.

ESPECIES SIMILARES (1) La Torcaza Cabeciblanca es gris oscura, con corona blanca. (2) La Torcaza Cuellimorada es toda de color gris oscuro y coloración iridiscente en la parte posterior del cuello.

EXPANSIÓN: Eurasia y África del Norte; del este al sureste de Asia. Introducida en casi todas las partes pobladas del mundo. **STATUS:** Común en toda Cuba e Isla de Pinos. **HÁBITAT:** Ciudades, pueblos, fincas. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a septiembre. Construye un nido poco elaborado en árboles o edificios; pone 2 huevos blancos, algo lustrosos. **VOZ:** Un quejumbroso *uuurhur ub-uu-uur*. **ALIMENTACIÓN:** Granos, insectos.

Torcaza Cuellimorada

Scaly-naped Pigeon

Patagioenas squamosa

Lámina 24



DESCRIPCIÓN 38 cm (15"). Enteramente de color gris oscuro, con la cabeza de un rojo vino y coloración iridiscente en la parte posterior del cuello. La zona desnuda alrededor del ojo va del amarillo al rojizo anaranjado. Los juveniles tienen la cabeza y el cuello de color pardo.

ESPECIES SIMILARES (1) La Torcaza Cabeciblanca presenta la parte superior de la cabeza blanca o gris. (2) La Paloma Boba exhibe un parche pardo rojizo y una banda blanca en el borde del ala.

EXPANSIÓN: Antillas Mayores y Menores. **STATUS:** Común y muy local como residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Palmares, arboledas, bosques, desde el nivel del mar hasta altas elevaciones. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a junio. Un frágil nido de palitos, construido

en la base de las pencas de las palmas, o entre curujeyes en las ramas de los árboles. Pone 2 huevos blancos lustrosos. **VOZ:** Muy similar a la de la Torcaza Cabeciblanca, pero con un tono más quejumbroso: *uuuu*, *UU-oo-oo*, *rUU-UU...UU-uu-uu*, *RUU-UU*, etc. **ALIMENTACIÓN:** Granos, frutas y moluscos.

Torcaza Cabeciblanca

White-crowned Pigeon

Patagioenas leucocephala

Lámina 24



DESCRIPCIÓN 36 cm (14"). Enteramente de un gris muy oscuro. El macho con la corona blanca; gris en las hembras e inmaduros. Parte inferior del cuello con un viso verde iridiscente, más notorio en el macho.

ESPECIES SIMILARES (1) La Torcaza Cuellimorada tiene la cabeza de color rojo vino. (2) La Torcaza Boba es parda, exhibe un parche pardo rojizo y una banda blanca en el borde del ala.

EXPANSIÓN: Sur de la Florida, islas del Caribe occidental, Bahamas y las Antillas. **STATUS:** Común residente permanente y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Bosques, manglares. Suele recorrer grandes distancias, incluso sobre el mar, en la mañana temprano y a la caída de la tarde, desde sus dormitorios o sitios de cría hasta las áreas de alimentación. **NIDIFICACIÓN:** Abril a agosto. Nidifica en grandes colonias, a veces de cientos de parejas, por lo general en cayos de mangle, aunque también en bosques. Construye una plataforma de palitos, ramitas y raíces. Pone usualmente 2 huevos blancos. **VOZ:** Una especie de áspero sonido: *uuuu*, *UU-uu*, *UUUU* (pausa) *UU-uu*, *UUUU*. **ALIMENTACIÓN:** Granos, frutas, y ocasionalmente insectos.

Torcaza Boba o Paloma Boba

Plain Pigeon

Patagioenas inornata

Lámina 24

DESCRIPCIÓN 38 cm (15"). Color pardo, con alas, rabadilla y cola en gris. El vientre con viso de color rojo vino. Parte media del ala con una fina



banda blanca y un parche pardo rojizo. Ojo blanco, y anillo ocular rojo. El juvenil con colores más pálidos.

ESPECIES SIMILARES (1) La Torcaza Cuellimorada tiene el ala completamente gris, con la cabeza y el cuello de un rojo vino. (2) La Torcaza Cabeciblanca exhibe la corona blanca o gris. (3) La Paloma Aliblanca es menor, con la punta de la cola negra y blanca, y visible banda blanca en el ala.

EXPANSIÓN: Antillas Mayores. **STATUS:** Globalmente amenazada. En peligro. Residente permanente en Cuba e Isla de Pinos. Las poblaciones existentes se localizan en áreas costeras de la península de Guanahacabibes; alrededores de Maneadero, Ciénaga de Zapata; Sierra de Najasa, provincia de Camagüey; Birama, provincia Granma. **HÁBITAT:** Costas y bosques, elevaciones semideforestadas, palmares con pastizales. **NIDIFICACIÓN:** Abril a julio. Construye un frágil nido de palitos entretreídos con hierbas. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Un llamado gutural: *uuwua*, *UU-uuguu* (pausa) *UU-uuuuu*, etc. **ALIMENTACIÓN:** Granos, frutas.

Tórtola de Collar

Eurasian Collared-Dove

Streptopelia decaocto

Lámina 51

DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). Enteramente de un pardo grisáceo pálido, con collar negro incompleto. Cola larga y cuadrada con los bordes ligeramente redondeados, la punta en blanco grisáceo. Coberteras inferiores de la cola en gris y parte inferior de la cola negra que contrasta notablemente con el blanco de la parte media posterior.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: A través de Eurasia. Introducida en Bahamas en 1974, ha invadido con posterioridad la Florida, Cuba y casi todas las Antillas Menores. **STATUS:** Confirmada en Cuba en 1990, pero registros no oficiales datan de 1988. Observada en La Habana, en península de Guanahacabibes y en Cayo Coco. Su área de distribución va en aumento. **HÁBITAT:** Áreas urbanas. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a agosto. Construye una simple plataforma, poco profunda, con ramitas, en las ramas altas de árboles. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Un repetido, *kuuk-kuuuuuu-kuuk*; también un sonido característico al posarse. **ALIMENTACIÓN:** Frutas y semillas.

Paloma Aliblanca

White-winged Dove

Zenaida asiatica

Lámina 25



DESCRIPCIÓN 28 cm (11"). De color pardo grisáceo. Una banda blanca en el ala muy llamativa en vuelo y bien visible, incluso posada con el ala cerrada. Una marca negra bajo la mejilla. Lados de la parte inferior del cuello de un púrpura iridiscente, más marcado en los machos. Plumas de la cola, excepto las centrales, con las puntas en blanco. Se reúnen en grandes bandadas donde hay abundante alimento. El juvenil carece de la coloración iridiscente.

ESPECIES SIMILARES (1) El Guanaro es pardo canela; el blanco del ala restringido al borde de las secundarias. (2) La Rabiche tiene las alas completamente de un pardo grisáceo, con una larga cola terminada en punta. (3) La Paloma Boba es más grande, sin marcas en la cola.

EXPANSIÓN: Sur de Estados Unidos hasta Chile; Bahamas y las Antillas Mayores. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Bosques y pinares, elevaciones boscosas, manglares en ciénagas. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. Cría en parejas solitarias o en pequeños grupos, en árboles o arbustos. Construye una simple plataforma, poco profunda, con ramitas y hierbas. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Posiblemente la más ruidosa de las palomas: *uu-uu-juu-juu*. Dos ritmos distintos: *uuu-Auu*. **ALIMENTACIÓN:** Granos, frutas y semillas.

Guanaro o Paloma Sanjuanera

Zenaida Dove

Zenaida aurita

Lámina 24

DESCRIPCIÓN 28 cm (11"). De un pardo canela, más pálido por debajo. Lados de la base del cuello de un púrpura iridiscente, por lo general más notorio en el macho. Dos puntos negros detrás de la mejilla. Plumas secundarias y todas las plumas de la cola, menos las centrales, con la punta blanca; cola redondeada. Pico negro. En su mayoría, los machos son más pardos por encima, con un viso rojo vino más oscuro en el pecho, con



marcas negras más grandes y el blanco de las alas más extendido. El juvenil más pálido.

ESPECIES SIMILARES (1) La Paloma Aliblanca es de un pardo grisáceo, con una visible banda blanca en el ala. (2) La Rabi-che tiene la cola larga, terminada en punta, y carece de las marcas blancas en las secundarias.

EXPANSIÓN: Bahamas, las Antillas, costa norte de la península de Yucatán.

STATUS: Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos, y en alguno de los cayos mayores. **HÁBITAT:** Bosques, vegetación costera, pinares; claros de los bosques, donde se reúnen en bandadas para alimentarse. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. Construye una delgada plataforma de ramitas en un árbol o arbusto. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Un claro *UU-UU*, *UU-UU*, con un tono más alto en la segunda sílaba. Muy similar al canto de la Rabi-che, pero algo más rápido. **ALIMENTACIÓN:** Granos, frutas y semillas.

Paloma Rabi-che

Mourning Dove

Zenaida macroura

Lámina 24



DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). De un pardo grisáceo por encima, más pálido por debajo. Los lados de la base del cuello, púrpura iridiscente, más visibles en el macho. Cola larga y terminada en punta, con el borde blanco y negro. Un solo punto auricular negro. Cuando abunda el alimento se reúnen en grandes bandadas, especialmente en los arrozales. El juvenil es más oscuro, con algunas manchas negras en la espalda, el pecho y las alas. Vuelo muy rápido y nervioso, con aleteos irregulares.

ESPECIES SIMILARES (1) El Guanaro y (2) la Paloma Aliblanca tienen la cola más corta y redondeada; la Aliblanca con una visible banda blanca en el ala.

EXPANSIÓN: Sur de Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Bahamas y las Antillas Mayores. **STATUS:** Muy común como residente permanente en Cuba e Isla de Pinos; no abunda en alguno de los cayos mayores. Regular residente invernal. **HÁBITAT:** Sabanas, pastizales, arrozales, vegetación costera, arboledas en pueblos y ciudades. **NIDIFICACIÓN:** Febrero a septiembre. Construye un nido con palitos y hierbas en las partes bajas o medias de los árboles y arbustos. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Un largo y quejumbroso llamado *UUWA*, *UU*, *UU-UU*, muy similar al del Guanaro, pero algo más lento; la segunda sílaba con un tono más bajo. **ALIMENTACIÓN:** Granos, algunos frutos y moluscos.

Paloma Migratoria

Passenger Pigeon

Ectopistes migratorius

Lámina 26

DESCRIPCIÓN 23 cm (8,5"). Muy similar a la Paloma Rabiche, pero algo mayor; la parte dorsal más oscura, y de un gris plumizo; parte ventral con viso rosado violáceo. Cola larga y terminada en punta. La hembra algo menor y más pálida.

EXPANSIÓN: Nidificaba en otros tiempos desde el centro de Montana, centro y este de Saskatchewan, sur de Manitoba, Minnesota, Wisconsin, Michigan, Ontario, sur de Quebec, Neuvo Brunswick y Nueva Escocia hacia el sur, hasta el este de Kansas, Oklahoma, Mississippi y Georgia. **STATUS:** Extinta. Errabunda. Cuatro registros en el siglo XIX. **HÁBITAT:** Terrenos abiertos y tierras cultivadas adyacentes a bosques. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, nueces, granos y frutos.

Tojosa o Tojosita

Common Ground-Dove

Columbina passerina

Lámina 25



DESCRIPCIÓN 17 cm (6,5"). Muy pequeña, de un pardo grisáceo; el plumaje de la cabeza y el pecho con patrón en forma de escamas, las alas salpicadas de puntos de un violáceo oscuro. En vuelo es muy visible la parte exterior del ala, de color terracota; cola pequeña y redondeada, con bordes negros y blanca la punta de las plumas más externas. El macho tiene la corona y la nuca azuladas, y cierto viso rosado en el pecho. La hembra es más pálida, grisácea. El juvenil, similar a la hembra, con la punta de las plumas de la espalda y las alas de un pardo acanelado. Pasa la mayor parte del tiempo en el suelo, donde encuentra su alimento; ocasionalmente se posa en árboles. Cuando se asusta echa a volar, pero recorre distancias cortas.

EXPANSIÓN: Sur de Estados Unidos hasta el norte de Suramérica (este de Brasil); Bahamas y las Antillas. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Bosques abiertos, vegetación costera, terrenos abiertos, solares yermos, arboledas en pueblos y ciudades. **NIDIFICACIÓN:** Enero a julio. Nidifica lo mismo en ramas que sobre el suelo. Construye una frágil plataforma con ramitas, palitos, hierbas y raicillas, ocasionalmente también con plumas. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Un suave *uu-Up*, repetido en largas secuencias. **ALIMENTACIÓN:** Granos, semillas, insectos, frutos.

Barbiquejo

Key West Quail-Dove

Geotrygon chrysis

Lámina 25



DESCRIPCIÓN 28 cm (11"). Pardo rojizo por encima, blancuzco por debajo. Pecho de un rojo vino pálido. Cabeza y espalda de un púrpura verdoso iridiscente; más brillante y extenso el rojizo castaño de las alas y la cola en el macho. Las hembras con colores más pálidos y menos lustrosos. Una franja blanca bajo el ojo, muy visible. El juvenil con colores pálidos y bordes oscuros en las coberteras del ala. Por lo general se le observa por el suelo, aunque acostumbra a posarse en las ramas bajas de los árboles para emitir su llamada. Vuelo errático.

ESPECIES SIMILARES (1) El macho del Boyero es menor, con las partes superiores de color pardo rojizo, las ventrales de un pardo rosáceo, y una franja beige por debajo del ojo; la hembra es de un pardo oliváceo. (2) La Perdiz tiene un casquete azul y un parche negro en la garganta y el pecho.

EXPANSIÓN: Bahamas, Cuba, La Española (incluidas las islas de la Gonâve, Tortuga y Catalina), Puerto Rico y la isla de Vieques. **STATUS:** Residente permanente poco común en Cuba e Isla de Pinos, así como en algunos de los grandes cayos. **HÁBITAT:** Bosques secos, con escasos arbustos, generalmente cerca de las costas. **NIDIFICACIÓN:** El año entero. Construye el nido sobre troncos, a poca altura o en las ramas más bajas de los árboles, con palitos, ramitas y hojas. Pone 2 huevos de color beige. **VOZ:** Un profundo y melancólico *uuuuuuuu*, con cadencia baja, repetido en secuencia, a intervalos de unos tres segundos. El llamado es muy parecido al del Boyero, y suele ser más quejumbroso y lento. **ALIMENTACIÓN:** Granos, frutos, semillas y pequeños moluscos.

Camao o Azulona

Gray-fronted Quail-Dove

Geotrygon caniceps

Lámina 25



DESCRIPCIÓN 28 cm (11"). Gris oscuro por encima; por debajo, gris. En el macho se destaca el azul púrpura iridiscente; frente blanca y corona de un gris pálido. En la hembra más intenso el gris de la cabeza y el cuerpo menos iridiscente. Los juveniles, parduscos. Cuando se posa o mientras camina, bambolea el cuerpo de un modo característico.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. **STATUS:** Globalmente amenazada. Rara y vulnerable; aunque localmente común en la Ciénaga de Zapata y la Sierra del Rosario. **HÁBITAT:** Bosques cercanos a ciénagas, o en elevaciones medias. **NIDIFICACIÓN:** Diciembre a agosto. Construye un frágil nido en el tronco o ramas de los árboles con ramitas y hojas, a alturas de uno a tres metros. Por lo general pone un solo huevo de color crema, raramente dos. **VOZ:** Un bajo y repetido *uup-uup-uup*, en largas series que alternan con notas más altas y ascendentes, *uuup*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas y frutos.

Boyero o Torito o Camao

Ruddy Quail-Dove

Geotrygon montana

Lámina 25



DESCRIPCIÓN 25 cm (10"). *Macho*: De un pardo rojizo por encima, la espalda con viso violáceo, y una franja beige acanelada debajo del ojo. Parte inferior, beige y rojo vino. *Hembra*: De color pardo oliváceo por encima, beige pardusco por debajo, excepto la garganta, que es blanca. La franja facial menos marcada que en el macho. El juvenil similar a la hembra, pero con el borde de las plumas del dorso de color ocre. Usualmente se posa en ramas altas, y al igual que las otras palomas terrestres, se la encuentra con regularidad en el suelo. Vuelo bajo y muy rápido. Es más asustadiza que las otras especies.

ESPECIES SIMILARES El Barbiquejo es mayor, con coloraciones verde y púrpura iridiscentes en la cabeza y espalda, y partes ventrales blancuzcas.

EXPANSIÓN: América Central hasta el norte de Argentina; Bahamas y las Antillas. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los cayos boscosos de la costa norte. **HÁBITAT:** Bosques tupidos, desde el nivel del mar hasta elevaciones medias, y plantaciones de café. **NIDIFICACIÓN:** Febrero a julio. Construye un nido de ramitas y hojas, a alturas de uno a seis metros. Pone 2 huevos color beige. **VOZ:** Un simple y profundo *uuu* con poca variación en la cadencia, que repite a intervalos de unos tres segundos. **ALIMENTACIÓN:** Granos, pequeños moluscos y frutos.

Paloma Perdiz

Blue-headed Quail-Dove

Starnoenas cyanocephala

Lámina 25

DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). De color pardo acanelado, con un viso oliváceo. Garganta y pecho negros, con líneas azul iridiscente, y bordes en blanco. Cabeza con un casquete azul celeste, lados del cuello rayados. Una larga y visible franja blanca debajo del ojo. El juvenil es similar pero con la punta de las plumas azules de la cabeza oscuras. Hace un ruido fuerte y característico con las alas cuando se espanta.



ESPECIES SIMILARES El Barbiquejo tiene una coloración verde y púrpura iridiscente en la cabeza, y el pecho de un rojo vino pálido.

EXPANSIÓN: Endémica de Cuba. **STATUS:** Globalmente amenazada. Rara y vulnerable. Casi extinta en Isla de Pinos, aunque común en algunas áreas de la península de Guanahacabibes, La Güira y la península de Zapata. **HÁBITAT:** Bosques tupidos con pocos arbustos. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a junio. Construye un frágil nido de ramitas y hojas lo mismo en tocones como en tupidas enredaderas o arbustos, generalmente a poca altura del suelo. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Un llamado profundo de dos sílabas: *uuuuuuup... uuuuuuuup*, que repite en largas series a unos dos segundos de intervalo; cada nota terminando abruptamente. **ALIMENTACIÓN:** Granos, frutos.

GUACAMAYO, PERIQUITO Y COTORRA Psittacidae PARAKEETS, MACAWS, AND PARROTS

Aves de pequeñas a grandes, de cuerpo pesado, cabeza grande, picos fuertes y completamente curvados. Patas fuertes, con dos dedos dirigidos hacia atrás. Básicamente tropicales. Vistosas, ruidosas y gregarias; capaces de realizar cualquier acrobacia mientras están posadas o alimentándose: por ejemplo, cuando quedan colgadas de una pata. Se las puede ver en grupos y se alimentan de una amplia gama de semillas y frutos. Sus aleteos son cortos y rápidos, por debajo del nivel horizontal. (M:358; C:2)

Guacamayo

Cuban Macaw

Ara tricolor

Lámina 26

DESCRIPCIÓN 51 cm (20"). Un bello pájaro de tres colores: casi todo el cuerpo rojo, alas y cola azules, y la nuca de un llamativo color amarillo.

EXPANSIÓN: Cuba e Isla de Pinos. **STATUS:** Extinta. El último individuo capturado en la Ciénaga de Zapata data de 1864. **HÁBITAT:** Lindero de bosques, y terrenos abiertos con arboledas aisladas, en especial palmares. **NIDIFICACIÓN:** Probablemente en palmas muertas. **VOZ:** No descrita. **ALIMENTACIÓN:** Semillas y frutos.

Catey o Periquito

Cuban Parakeet

Aratinga euops

Lámina 27



DESCRIPCIÓN 25 cm (10"). Verde brillante, con aisladas manchas rojas en la cabeza, lados del cuello y pecho. Un gran parche rojo bajo la parte anterior del ala. Cola larga y terminada en punta. El juvenil más pálido.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. En otros tiempos en Isla de Pinos. **STATUS:** Globalmente amenazada. Vulnerable. Restringido a la península de Zapata, las montañas de Trinidad, Peralejo, Guasimal, Sierra de Cunagua, Sierra de Najasa, Birama y algunas áreas montañosas de la región oriental.

HÁBITAT: Bosques naturales o bien preservados, sabanas con palmas. **NIDIFICACIÓN:** Febrero a agosto. Pone entre 2 y 5 huevos blancos en nidos abandonados de pájaros carpinteros; en palmas o en cavidades naturales en árboles o farallones. **VOZ:** Un repetido chillido: *crik-crik-crik*, que se escucha con más frecuencia en vuelo. Un murmullo bajo cuando se halla posado. **ALIMENTACIÓN:** Semillas y frutos.

Cotorra o Perico

Cuban Parrot

Amazona leucocephala

Lámina 27



DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). Verde; coloración roja en mejillas, garganta y pecho. Blanca la frente y también la piel desnuda alrededor del ojo.

Primarias azules, coberteras inferiores de la cola y plumas adyacentes amarillas, verdes y rojas. Pico y patas amarillos. El juvenil más pálido. Aleteo corto y rápido.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Bahamas (Gran Inagua y Ábaco), Cuba, Islas Caimán (Gran Caimán y Caimán Brac). **STATUS:** Globalmente amenazada. Residente permanente en Cuba e Isla de Pinos. Rara y vulnerable, hoy día restringida a las penínsulas de Guanahacabibes y Zapata (donde todavía es común), Sierra del Rosario (Mil Cumbres), sur y oeste de la Isla de Pinos, Macizo de Guamuhaya, Sierra de Cunagua, Sierra de Najasa y los bosques occidentales de la Sierra Maestra y Sagua-Baracoa. **HÁBITAT:** Bosques bien preservados, con abundancia de árboles viejos, sabanas, palmares. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. Pone 3 o 4 huevos blancos en nidos abandonados de pájaros carpinteros, o en palmas muertas. **VOZ:** Muy ruidoso, un alto y repetido *quack-quack*, especialmente cuando se dispone a volar. **ALIMENTACIÓN:** Frutas, granos.

PRIMAVERAS, ARRIERITO, ARRIERO Y JUDÍO Cuculidae

CUCKOOS AND ANIS

Aves de mediano tamaño, solitarias, de colores pálidos, con alas cortas y anchas, y larga cola. Pico largo y algo curvado. Patas con la disposición de los dedos igual que en las cotorras: dos dirigidos hacia delante, dos hacia atrás; aptos para trepar y saltar. El llamado es poco frecuente, pero alto y llamativo. Nidos poco elaborados; los huevos verdes o azules. Básicamente insectívoros, aunque algunas especies incluyen reptiles en su dieta. Sexos similares. (M:171; C:5)

Primavera de Pico Negro

Black-billed Cuckoo

Coccyzus erythrophthalmus

Lámina 27

DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). De color pardo grisáceo por encima, blanco o con un viso beige por debajo. Plumas de la cola con estrechos bordes blancos. Pico negro y ligeramente curvado. Piel desnuda alrededor del ojo, roja o anaranjada. Los juveniles tienen anillo ocular acanelado, y pueden presentar viso terracota en las primarias; la cola con menos contraste que el adulto.

ESPECIES SIMILARES (1) La Primavera tiene la mandíbula inferior amarilla con la punta negra, y las plumas de la cola negras con anchos bordes blancos. En vuelo deja ver un marcado parche terracota en las primarias. (2) El Arrierito tiene un parche negro detrás del ojo, el vientre acanelado claro, y la base de la mandíbula inferior amarilla.

EXPANSIÓN: Este y centro de Norteamérica, inverna desde el norte de Suramérica hasta Perú y el centro de Bolivia. **STATUS:** Muy raro transeúnte

otoñal en Cuba (15 de sept. a 15 de nov. y 26 de abr. a 11 de may.). **HÁBITAT:** Vegetación costera y arboledas. **VOZ:** Un bajo y hondo *cu-cu*, *cu-cu-cu* o *cu-cu-cu-cu*, repetido rítmicamente en largas series, más frecuente en sus áreas de alimentación. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, moluscos, frutas.

Primavera o Primavera de Pico Amarillo

Yellow-billed Cuckoo

Coccyzus americanus

Lámina 27



DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). De color pardo grisáceo por encima, blanco por debajo. Plumas de la cola negras con anchos bordes blancos, muy llamativos cuando el ave es vista desde abajo. Parte externa de las alas terracota por encima. Pico ligeramente curvado y la mandíbula inferior amarilla con la punta negra. El juvenil con las plumas inferiores de la cola más pálidas, algunas veces carece del amarillo en la mandíbula inferior.

ESPECIES SIMILARES (1) La Primavera de Pico Negro tiene el pico enteramente negro; la cola por debajo se ve gris, con delgadas puntas blancas. (2) El Arrierito tiene las partes ventrales de color acanelado claro, un parche negro detrás del ojo, el pico bien curvado y las alas enteramente pardo grisáceas por encima, sin tono terracota.

EXPANSIÓN: Sureste de Canadá, Estados Unidos, México y las Antillas Mayores; inverna desde el norte de Suramérica hasta el norte de Argentina; Bahamas y las Antillas. **STATUS:** Común residente veraniego en Cuba (10 de feb. a noviembre); transeúntes han sido observados y colectados en octubre y noviembre en el Jardín Botánico de La Habana, así como en los cayos Coco y Paredón Grande. **HÁBITAT:** Áreas boscosas, vegetación arbustiva costera. **NIDIFICACIÓN:** Abril a julio. Construye una plataforma baja con raicillas, hojas secas y hierbas en árboles o arbustos. Pone 4 o 5 huevos de color verde azulado. Muy ocasionalmente es parásita de nidos de otras aves. **VOZ:** Un rápido cacarreo gutural: *ka-ka-ka-ka-ka-ka*, *kow-kow-kow*, disminuyendo el tono. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, orugas, lagartijas.

Arrierito o Primavera

Mangrove Cuckoo

Coccyzus minor

Lámina 27



DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). De color pardo grisáceo por encima, blancos el pecho y la garganta, y el vientre acanelado claro. Un parche negro detrás del ojo. Plumas de la cola negras con las puntas marcadamente blancas, muy llamativas cuando se ven desde abajo. Pico bien curvado, con la base de la mandíbula inferior amarilla. Los juveniles tienen el parche negro detrás del ojo y el patrón de la cola más pálido.

ESPECIES SIMILARES (1) La Primavera y (2) la Primavera de Pico Negro son blancas por debajo y carecen del parche negro detrás del ojo.

EXPANSIÓN: Sur de la Florida, México hasta el norte de Suramérica; Bahamas y las Antillas; invernada dentro del área de cría. **STATUS:** Local y común residente permanente en varios cayos como Francés, Santamaría, Coco, Paredón Grande, Romano, Cantiles, Los Majáes, Cayo Largo. Menos común en la isla de Cuba y no registrado en la Isla de Pinos. **HÁBITAT:** Manglares, vegetación costera. **NIDIFICACIÓN:** Abril a julio. Construye un nido poco elaborado con palitos, en ramas bajas. Pone 3 o 4 huevos de color azul verdoso. **VOZ:** Un bajo y gutural *ga-ga-ga, ga-ga, gau-gau*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectívoro: orugas, grillos, esperanzas, mariposas; arañas.

Arriero o Guacaica o Tacó

Great Lizard-Cuckoo

Saurothera merlini

Lámina 27

DESCRIPCIÓN 51 cm (20"). Grande. De color pardo oliváceo por encima, gris y acanelado por debajo. Cola muy larga, la parte inferior con un patrón muy visible en blanco y negro. Pico muy largo, curvado y de color gris azulado. Piel desnuda alrededor del ojo de un rojo anaranjado. Tres razas han sido descritas del archipiélago cubano. La de los cayos al norte de la parte central de Cuba y la de Isla de Pinos son más pálidas, más grises por debajo y más pequeñas que la de la isla principal. Los juveniles de todas las razas tienen el patrón de la cola mucho más pálido, la piel



desnuda alrededor del ojo es amarilla. Tiene un vuelo pobre, generalmente planea desde la copa de los árboles. A menudo se alimenta en el suelo. Corre con frecuencia.

ESPECIES SIMILARES Las otras especies de cucos son considerablemente menores, con el pico y la cola más cortos, y el pecho blanco.

EXPANSIÓN: Bahamas y Cuba. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos, y en los cayos Santa María, Coco, Romano, Guajaba, Sabinal y Saetía. **HÁBITAT:** Áreas boscosas, vegetación costera, sabanazos, tanto al nivel del mar como en elevaciones. **NIDIFICACIÓN:** Abril a octubre. Construye un nido de plataforma con palitos y hojas, relativamente pequeño, en árboles o arbustos, por lo general a poca altura y muy bien escondido entre la vegetación tupida. Pone 2 o 3 huevos blancos. **VOZ:** Un sonoro y característico llamado, de dos formas: una más corta, *tacooo-tacooo*, y la otra larga, mucho más alta y repetida: *ka-ka-ka-ka-ka-ka*. También un gutural *tu-cooo*. **ALIMENTACIÓN:** Pequeños vertebrados: lagartijas, ranas, culebras, huevos y pichones de otras aves; grillos y esperanzas.

Judío o Garrapatero

Smooth-billed Ani

Crotophaga ani

Lámina 27



DESCRIPCIÓN 37 cm (14,5"). Enteramente negro con alguna coloración iridiscente. Pico muy ancho, relativamente corto, lateralmente estrecho. La cola muy larga. El inmaduro con colores más pálidos. Alas cortas y redondeadas; vuelan bajo, alternando aleteos y planeos.

EXPANSIÓN: Florida, Costa Rica hasta el norte de Argentina; Bahamas y las Antillas. **STATUS:** Residente permanente muy común en Cuba, Isla de Pinos y varios cayos. **HÁBITAT:** Pastizales, terrenos herbáceos y desmontados, bordes de caminos o carreteras. **NIDIFICACIÓN:** Abril a octubre. Hace nidos comunales grandes, muy escondidos en la vegetación densa. Hasta 20 huevos azul verdosos pueden ser puestos en un mismo nido por varias hembras. **VOZ:** Una nota alta y repetida con cierto dejo nasal: *uiii-iuk*. **ALIMENTACIÓN:** Lagartijas; insectos, especialmente grillos y parásitos del ganado; frutas y semillas.

LECHUZA Tytonidae

BARN OWLS

Rapaces nocturnas, con cabeza grande, ojos relativamente pequeños, situados al frente de la cara circular, característica, en forma de corazón. Patas largas. Los nidos los sitúan en cavidades naturales, edificaciones abandonadas e incluso en el terreno, en lugares bien guarecidos. Se tragan las presas enteras y regurgitan una gran egagrópila de residuos indigeribles. La hembra algo mayor que el macho. (M:17; C:1)

Lechuza

Common Barn-Owl

Tyto alba

Lámina 28



DESCRIPCIÓN 38 cm (15"). De color pardo amarillento acanelado por encima, la espalda moteada en gris; blanco o beige por debajo, con espaciados y pequeños puntos pardos. De noche, en vuelo, parece enteramente blanco. Gusta de posarse en los cables del tendido eléctrico. Muy común en arrozales.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Cosmopolita en regiones tropicales y templadas. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos, así como muy raro residente invernal. **HÁBITAT:** Terrenos abiertos, cañaverales, arrozales. **NIDIFICACIÓN:** Todo el año. Pone 2 o 3 huevos blancos en cavidades naturales, cuevas o edificaciones abandonadas. **VOZ:** Sonido

estridente: *chbb, chbb*; también un continuo *click, klik, klik*. **ALIMENTACIÓN:** Principalmente roedores, también reptiles y aves pequeñas.

SIJÚES, BÚHO, SIGUAPA Y CÁRABO Strigidae

TYPICAL OWLS

De pequeñas a grandes rapaces nocturnas, generalmente moteadas con matices pardos. Cabeza de gran tamaño, grandes ojos expresivos situados al frente de la cara circular, con plumas pequeñas que forman un disco facial. A veces con penacho de plumas en forma de tarritos. Los nidos los sitúan en cavidades naturales, nidos abandonados de pájaros carpinteros, o en plataformas sobre ramas, o en el suelo. Se pueden tragar las presas enteras y regurgitan una gran egagrópila con las sustancias indigeribles. Hembras algo mayores que los machos. (M:161; C:6)

Sijú Cotunto o Cuco

Bare-legged Owl

Gymnoglaux lawrencii

Lámina 28



DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5"). De color pardo oscuro moteado en blanco por encima, blanco grisáceo por debajo, con el pecho y el vientre rayados. Llamativas cejas blancas, ojos pardos. Patas largas y sin plumas. Estrictamente nocturno.

ESPECIES SIMILARES (1) El Sijú de Sabana es barrado por debajo, con los ojos amarillos; una franja blanca le atraviesa el mentón. (2) El Sijú Platenero es menor, moteado por debajo, con ojos amarillos y las patas cubiertas de plumas.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. **STATUS:** Común en Cuba e Isla de Pinos; muy raro en los cayos Coco y Romano. **HÁBITAT:** Bosques bien preservados. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a septiembre. Cavidades naturales en árboles, palmas secas; nidos abandonados de pájaros carpinteros. Usualmente pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Una serie de notas que se repiten con rapidez: *tuk, tuk, tuk*. Estos sonidos se asemejan a los que produce el rebote

de una pelota. Las parejas vocalizan con diferentes tonos. También un repetido *huir* o *huip*, que se eleva y luego baja. **ALIMENTACIÓN:** Pequeños reptiles, insectos grandes.

Sijú Platanero o Sijucito o Sijú

Cuban Pygmy-Owl

Glaucidium siju

Lámina 28



DESCRIPCIÓN 17 cm (6,5"). Pequeño. De color pardo por encima, con barras blancuzcas en el dorso y un collar canela; blanco en la parte ventral, moteado en pardo. Las patas muy cortas, con plumas. Ojo amarillo, cola muy corta. El juvenil carece de marcas en el dorso y tiene el vientre rayado. Cuando están posados, con frecuencia mueven la cola nerviosamente hacia arriba y hacia los lados. Cazán más de día que de noche.

ESPECIES SIMILARES El Sijú Cotunto es mayor, rayado por debajo, con ojos grandes de color pardo oscuro, cejas blancuzcas muy definidas y patas sin plumas.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. **STATUS:** Común en Cuba e Isla de Pinos, y muy raro en los cayos Coco y Romano al norte de Camagüey, Ciego de Ávila, y Cayo Cantiles en el archipiélago de los Canarreos. **HÁBITAT:** Bosques de cualquier tipo, tanto al nivel del mar como en zonas montañosas. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a junio. Nidifica en cavidades naturales, nidos abandonados de pájaros carpinteros, palmas muertas. Pone 3 o 4 huevos blancos. **VOZ:** Un simple *uu*, emitido a intervalos; o un llamado fuerte, *ku*, largo y en ritmo ascendente y acelerado, que cambia la cadencia y el tono, más prolongado y estridente en el macho. Durante la cópula emiten un silbido agudo. **ALIMENTACIÓN:** Lagartijas, insectos, pequeñas aves.

Sijú de Sabana o Cuco de Sabana o Cuzco

Burrowing Owl

Speotyto cunicularia

Lámina 28

DESCRIPCIÓN 23 cm (9"). De color pardo oscuro por encima, con numerosas marcas y puntos blancos. Ojos amarillos. Pecho y vientre blancuzcos,



barrados en pardo, y una llamativa barra blanca a nivel de la garganta. Patas largas y ligeramente emplumadas; cola corta. El juvenil es acanelado por debajo. Terrestre, caza revoloteando sobre terrenos abiertos, por lo general de día. Frecuentemente mueve el cuerpo hacia arriba y hacia abajo, cuando siente temor.

ESPECIES SIMILARES El Sijú Cotunto es similar en tamaño pero habita en bosques y es estrictamente nocturno; con ojos pardos, rayado por debajo.

EXPANSIÓN: Oeste y centro de Norteamérica y la Florida; centro de México.

Localmente en Suramérica; Bahamas, Cuba, La Española (incluidas las islas de la Gonâve y Beata) y norte de las Antillas Menores. **STATUS:** Raro y local residente permanente en Cuba e Isla de Pinos. Más raro como residente invernal: La Fe y Cortés en la provincia de Pinar del Río; Itabo en la provincia de Matanzas; Jauco y Jamaica en la provincia de Guantánamo; Los Indios en Isla de Pinos. También en algunos de los grandes cayos de las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. **HÁBITAT:** Sabanas arenosas, potreros, terrenos desmontados. **NIDIFICACIÓN:** Mayo a agosto. Pone entre 5 y 8 huevos blancos al final de un túnel que excavan, de unos dos metros. **VOZ:** Un rápido *cuic-cuic*. **ALIMENTACIÓN:** Pequeños reptiles, insectos grandes.

Búho

Long-eared Owl

Asio otus

Lámina 28

DESCRIPCIÓN 38 cm (15"). De color pardo oscuro por encima, manchado con puntos de un pardo más oscuro; pecho y vientre color crema, rayado en pardo oscuro. Ojos amarillos, disco facial pardo rojizo. Dos penachos largos de plumas, similares a tarritos, en la cabeza. Alas largas que pueden extenderse por detrás de la cola, y que exhiben un parche acanelado por encima y una marca negra por debajo, a nivel de la curvatura del ala.

ESPECIES SIMILARES (1) El Cárabo tiene el patrón del ala muy marcado, los penachos de la cabeza muy corticos, y el disco facial acanelado pálido. Habita en terrenos abiertos con árboles aislados. (2) La Siguapa es más fornida, más oscura, con los penachos de la cabeza más cortos, y con el disco facial pardo.

EXPANSIÓN: Cría al norte de Estados Unidos y Canadá, inverna al sur hasta México. También Europa y Asia. **STATUS:** Casual en Cuba. Un registro,

La Habana. **HÁBITAT:** Bosques. **VOZ:** Un llamado largo: *uuu*. **ALIMENTACIÓN:** Roedores, aves, peces, reptiles, insectos.

Siguapa

Stygian Owl

Asio stygius

Lámina 28



DESCRIPCIÓN 43 cm (17"). De color pardo oscuro, con puntos blancos y de color crema por encima, rayado por debajo. Dos penachos de plumas en la cabeza no muy largos. Disco facial pardo. Ojos de un amarillo anaranjado. El juvenil con el vientre barrado.

ESPECIES SIMILARES (1) El Búho es más delgado, con los penachos de plumas muy largos y el disco facial pardo rojizo. (2) El Cárabo es más pequeño, con los penachos de la cabeza apenas visibles, el disco facial acanelado pálido, y habita en terrenos abiertos.

EXPANSIÓN: México, Centro y Suramérica; Cuba, La Española e Île de la Gonâve. **STATUS:** Poco común; local y vulnerable, residente permanente en Cuba e Isla de Pinos; Sierra de la Güira, provincia de Pinar del Río; península de Zapata; Sierra de Guamuhaya, provincias de Cienfuegos y Sancti Spíritus; Yaguayal, provincia de Camagüey; Sierra Maestra, provincia de Santiago de Cuba; San Rafael, provincia de Guantánamo. **HÁBITAT:** Bosques y pinares. **NIDIFICACIÓN:** Enero a abril. Nidifica alto en los árboles, así como en cavidades naturales que encuentran en estos. Construyen el nido agregando pedazos de ramas a un viejo nido de gavián, o elabora uno propio de plataforma, con palitos y ramitas. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** El macho, un corto y poco sonoro *uú*; la hembra, una especie de chillido más alto, *cuic-cuic*. **ALIMENTACIÓN:** Aves, murciélagos y reptiles.

Cárabo

Arawak Owl

Asio dominguensis

Lámina 28

DESCRIPCIÓN 38 cm (15"). De un pardo oscuro, moteado con puntos acanelados, y rayado; parte superior del pecho muy rayada en pardo oscuro. Ojos amarillos, con plumas negras alrededor, que contrastan con las blancas que rodean el pico. Disco facial acanelado pálido. Dos



penachos cortos de plumas en la cabeza. Caza fundamentalmente al amanecer y al anochecer. En vuelo exhiben un visible parche negro al nivel de la curvatura del ala y un área de color acanelado pálido en la parte superior de esta. Vuelo errático y bajo, con las alas en ángulo hacia arriba.

ESPECIES SIMILARES (1) La Siguapa es más robusta, con los penachos de la cabeza más largos, y de hábitat boscoso. (2) El Búho tiene el patrón del ala menos llamativo, los penachos de la cabeza más largos y el disco facial de un pardo rojizo.

EXPANSIÓN: Antillas Mayores: Cuba, Puerto Rico, La Española y Gran Caimán. Casual al sur del estado de Florida. **STATUS:** Un común residente permanente en Cuba, cuyas poblaciones continúan expandiéndose. No registrado en la Isla de Pinos. **HÁBITAT:** Arrozales, sabanas, pastizales, cañaverales, campos de cítricos. **NIDIFICACIÓN:** Probablemente el año entero. Construye un nido poco elaborado en el terreno, enmascarado con hierbas. Pone 3 o 4 huevos blancos. **VOZ:** El macho produce una serie de 16 notas o más, cortas, rápidas y bajas: *u-u u-u*; la hembra, una especie de *yíp*. **ALIMENTACIÓN:** Roedores, reptiles y grandes insectos.

GUABAIROS Y QUEREQUETÉS *Caprimulgidae*

GOATSUCKERS

Aves de pequeño y mediano tamaño, con picos muy chicos y patas muy cortas. Grandes ojos que reflejan la luz en la noche. Boca enorme, aunque no es apreciable cuando las aves están posadas; largas vibrisas que le salen de los lados del pico y le sirven para capturar sus presas en vuelo. Cola larga. Plumaje característico en el que se destaca un patrón complicado en marcas y coloración de diferentes tonos en pardo y beige que le sirve para enmascararse. La mayor parte de las especies son estrictamente nocturnas; algunas, crepusculares. Pasan el día posados, inmóviles, en una rama o en el propio terreno. El Querequeté captura sus presas durante el vuelo, que a menudo es errático. Los guabairos, por lo general, las capturan a baja altura, haciendo vuelos cortos desde sus perchas o el terreno. No construyen nido;

depositan sus 2 huevos verdosos y jaspeados en el propio terreno. Sexos similares. (M:83; C:6)

Querequeté Americano

Common Nighthawk

Chordeiles minor

No ilustrado

DESCRIPCIÓN 24 cm (9,5"). Moteado en gris pardo oscuro, partes inferiores muy barradas. Alas largas y terminadas en punta, con una visible banda blanca en las primarias. Cola ligeramente bifurcada, barrada en blanco y negro. El macho tiene la garganta blanca y una llamativa banda subterminal blanca en la cola. La hembra tiene la garganta de color acanelado pálido o beige, y carece de la banda blanca de la cola. El juvenil es similar a la hembra pero más pálido. Su vuelo errático consiste en profundos aleteos combinados con largos planeos.

ESPECIES SIMILARES El Querequeté es muy similar, pero con las coberteras inferiores del ala y la parte ventral más acaneladas. Se diferencian inmediatamente por su llamado. Los planeos suelen ser más cortos.

EXPANSIÓN: Cría en Norte y Centroamérica, inverna en Suramérica. **STATUS:** Poco común, transeúnte en Cuba e Isla de Pinos (27 de ago. a 7 de oct. y abril a 10 de may.). **HÁBITAT:** Terrenos abiertos. **VOZ:** Un resonante y nasal *peeen*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos.

Querequeté

Antillean Nighthawk

Chordeiles gundlachi

Lámina 29

DESCRIPCIÓN 24 cm (9,5"). Casi idéntico al Querequeté Americano. La mejor distinción es la voz. De color pardo grisáceo moteado por encima, por debajo notablemente barrado con un viso beige o canela pálido. Alas largas y terminadas en punta, con una visible banda blanca en las primarias, más pequeña en la hembra. Parte inferior del ala con un patrón barrado en beige y negro. Cola ligeramente bifurcada, barrada en blanco y negro. El macho tiene la garganta blanca y una visible banda blanca en la cola. La



hembra con la garganta acanelada pálida, y carece de banda en la cola. El juvenil similar a la hembra pero más pálido. Se ven y se escuchan con más frecuencia a la caída de la tarde y al amanecer, cuando ejecutan los machos sus famosos vuelos en picada, produciendo un típico sonido zumbante. Su vuelo usual consiste en erráticos y profundos aleteos combinados con planeos, algo más cortos que los del Querequeté Americano.

ESPECIES SIMILARES El Querequeté Americano es casi idéntico, pero carece de las marcas acaneladas en las coberteras inferiores del ala y en la parte ventral. La mejor forma de distinguirlos es por su llamado, muy diferente. También los planeos suelen ser algo más largos.

EXPANSIÓN: Cría en las Antillas y en los cayos de la Florida, se supone que inverne en Suramérica. **STATUS:** Común residente veraniego y transcúente en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos mayores (6 de feb. a octubre). **HÁBITAT:** Campos abiertos, sabanas, potreros. **NIDIFICACIÓN:** Abril a julio. Pone sobre terreno limpio un solo huevo (raramente dos) azulado, con numerosas manchas en pardo. **VOZ:** En vuelo deja oír su característico e inconfundible llamado, que parece repetir las sílabas *que-re-que-té* o *que-re-be-bé*, más acentuado en la última sílaba. A menudo vocalizan durante la noche, o en días nublados. **ALIMENTACIÓN:** Insectos.

Guabairo Americano

Chuck-will's-widow

Caprimulgus carolinensis

Lámina 29

DESCRIPCIÓN 30 cm (12"). De color pardo moteado en general, más pálido por debajo. El macho tiene una banda blanca en la garganta, y blanco en el borde interior de las tres últimas plumas externas de la cola. La hembra tiene la banda de la garganta acanelada. Captura insectos mientras vuela a baja altura. Ala y cola con los extremos redondeados. El vuelo es rápido, alternando aleteos con planeos.

ESPECIES SIMILARES (1) El Guabairo es algo más pequeño, con los colores del cuerpo menos acentuados y el pecho muy manchado en blanco. El macho con las puntas de las plumas externas de la cola blancas. Visto de cerca se puede apreciar que las vibrisas del pico son algo mayores. (2) El Guabairo Chico es menor, y más gris, con la garganta negra y un collar en forma de U; las plumas externas de la cola exhiben visibles marcas blancas.

EXPANSIÓN: Este de Norteamérica, inverna al sur hasta Colombia; Bahamas y las Antillas Mayores. **STATUS:** Común residente invernal y también un común transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos mayores (7 de ago. a 28 de may.). **HÁBITAT:** Claros en los bosques, maniguas tupidas y secas, entrada de cuevas. **VOZ:** Un llamado de cuatro sílabas, *chok-will-wi-dou*, la primera inaudible a distancia. También una especie de cloqueo emitido en vuelo. **ALIMENTACIÓN:** Insectos.