

Guabairo

Greater Antillean Nightjar

Caprimulgus cubanensis

Lámina 29



DESCRIPCIÓN 28 cm (11"). Moteado en pardo grisáceo; pecho y vientre de un pardo negruzco, ambos manchados en blanco. Una barra beige oscuro en la base de la garganta. Las vibrisas del pico largas y curvadas hacia dentro. Ala y cola redondeadas. El macho exhibe visibles manchas blancas, que son beige en las hembras, en los extremos de las plumas externas de la cola. Con regularidad salta desde el terreno para capturar insectos que vuelan a baja altura.

ESPECIES SIMILARES (1) El Guabairo Americano es mayor, más pardo, con el collar blanco y la parte inferior del pecho sin manchas blancas, vibrisas más cortas y rectas, y el borde interior de las tres últimas plumas de la cola es blanco. (2) El Guabairo Chico es aún menor, con la garganta negra y un collar en forma de U.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. **STATUS:** Común en Cuba, Isla de Pinos, Cayo Coco, y posiblemente en otros cayos mayores al norte de las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. Diferencias en la vocalización y morfología sugiere que las poblaciones de Cuba y La Española constituyen dos especies diferentes. **HÁBITAT:** Bosques algo tupidos. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. Entre hojas secas en el terreno. Pone 2 huevos verde grisáceos muy manchados en pardo. **VOZ:** Un largo llamado que parece repetir las sílabas *tu-wurrrr*, a veces precedida por un *tu* casi inaudible. Se le oye por lo general al anochecer y al amanecer. **ALIMENTACIÓN:** Fundamentalmente insectos grandes que captura en vuelo.

Guabairo Chico

Whip-Poor-Will

Caprimulgus vociferus

Lámina 29

DESCRIPCIÓN 24 cm (9,5"). Moteado en pardo grisáceo oscuro. Garganta negra con un contrastante collar acanelado o blanco. Las tres plumas ex-

ternas de la cola en el macho, muy marcadas en blanco, y en beige y más reducidas en la hembra. Alas y cola redondeadas.

ESPECIES SIMILARES (1) El Guabairo Americano y (2) el Guabairo son mayores, con la garganta parda, y una barra menos contrastante. El macho del Guabairo Americano con menos blanco en las plumas externas de la cola.

EXPANSIÓN: Cría en el este y suroeste de Norteamérica, inverna al sur hasta Panamá. **STATUS:** Casual en Cuba. Dos registros: 7 de ene. de 1932 en La Habana y 26 de abr. de 2001 en Cayo Coco. **HÁBITAT:** Bosques. **VOZ:** Por la noche, un repetido *juip-puur-uill*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos.

POTÚ Nyctiibidae

POTOOS

El Potú se asemeja a los guabairos, son aves crípticas y nocturnas con grandes ojos y boca. El plumaje es suave, donde parte de las plumas de la mejilla está modificada en vibras en la base del pico. Son insectívoras, y capturan en vuelo a partir de una percha retornando a la misma. Son solitarias y habitan áreas boscosas. Durante el día se perchan en posición vertical a un tronco o rama de un árbol. Nidifica en depresiones de ramas o troncos, pone un solo huevo. (M:5; C:1)

Potú

Potoo

Nyctibius jamaicensis

No Ilustrado

DESCRIPCIÓN 43–46 cm (17,5"). Ave nocturna de cola larga y gran talla, de colores crípticos. Se percha de manera vertical. El iris es amarillo, aunque en la noche parece de color rojo cuando se lo ilumina. Inmaduro más pálido que el adulto.

ESPECIES SIMILARES El Guabairo Cubano y el Americano son más pequeños y se perchan de manera horizontal en la rama; cola mucho más corta.

EXPANSIÓN: Jamaica, La Española, Île de la Gonâve y Cuba. **STATUS:** Residente permanente muy raro. Diez registros: Alrededores de Caimito (La Habana), Santo Tomás, Pálpite, Molina, Bermeja (Ciénaga de Zapata), este de Siboney, Santiago de Cuba. Los dos únicos ejemplares colectados son de la localidad de Santa Cruz, provincia de Holguín (2002 y 2003 respectivamente). **HÁBITAT:** Bosques semihúmedos y bosques secos. **NIDIFICACIÓN:** Desconocida en Cuba. En otras regiones se reporta la puesta de un solo huevo manchado, sobre una rama partida o tronco. En Jamaica cría desde febrero a noviembre, y en La Española desde abril hasta

julio. **VOZ:** Semejante a una risa gutural: *kvaah, kvaah*... **ALIMENTACIÓN:** Insectos que captura al vuelo.

VENCEJOS Apodidae

SWIFTS

Pequeños en general, algunos medianos, con apariencia de golondrinas; pico muy pequeño, patas cortas y endebles, cola corta. Alas largas, estrechas y terminadas en punta, con la curvatura del ala próxima a los costados. Muy rápidos. La mayoría son oscuros, con pocas marcas blancas o pálidas. Capturan insectos al vuelo y algunas especies incluso copulan volando. Nunca se los ve posados en ramas o alambres; descansan, duermen y anidan en farallones, cuevas, palmas huecas o pencas de palmetos, y chimeneas. El nido en forma de copa lo fabrican usando secreciones salivares, ramitas, hojas, plumas y residuos de plantas. (M:99; C:4)

Vencejo Negro

Black Swift

Cypseloides niger

Lámina 29



DESCRIPCIÓN 17 cm (6,5"). Prácticamente de un pardo oscuro achocolatado que parece negro al verlo en vuelo; frente blancuzca, más oscura hacia la corona. Cola bifurcada. Los juveniles tienen las plumas de las partes inferiores con los bordes blancos. Vuelo menos errático que otros vencejos.

ESPECIES SIMILARES (1) El macho de la Golondrina Azul tiene las alas más anchas y triangulares. (2) El Vencejo de Collar tiene un collar blanco.

EXPANSIÓN: Oeste de Norteamérica, inverna por el sur hasta Centroamérica; en México, América Central (Guatemala y Costa Rica), y en las Antillas (Cuba, Jamaica, La Española, Puerto Rico, Montserrat, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lucía y San Vicente). **STATUS:** Un residente permanente raro en Cuba: Sierra de Guamuhaya, las provincias de Cienfuegos y Sancti Spiritus; montañas de las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. **HÁBITAT:** Sobre bosques montañosos.

NIDIFICACIÓN: El nido aún no ha sido encontrado en Cuba. **VOZ:** Un bajo *chip-chip*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos.

Vencejo de Collar

White-collared Swift

Streptoprocne zonaris

Lámina 29



DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5"). Grande y negro, con un collar blanco, aunque este no siempre es visible en los juveniles. Cola bifurcada. El inmaduro tiene un collar más estrecho, en ocasiones reducido sólo a parches; y hasta puede carecer de collar. Vuelo muy rápido, a veces en nutridas bandadas de hasta cincuenta individuos.

ESPECIES SIMILARES El Vencejo Negro es completamente negro.

EXPANSIÓN: México hasta el norte de Argentina; Antillas Mayores. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba: Sierra de Guamuha; provincias de Cienfuegos y Sancti Spiritus; montañas de las provincias de Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo. **HÁBITAT:** Sobre bosques montañosos. **NIDIFICACIÓN:** Mayo a julio. Farallones cercanos a saltos de agua y en palmas reales huecas. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Un alto y sonoro, *scree-scree*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos.

Vencejo de Chimenea

Chimney Swift

Chaetura pelagica

Lámina 29

DESCRIPCIÓN 13 cm (5"). De color pardo oscuro, con la garganta pálida. Cola muy corta, casi cuadrada, con los raquis de las plumas que sobresalen por la punta de la cola. Algunas veces vuela en grandes bandadas a lo largo de las costas, especialmente en otoño.

ESPECIES SIMILARES El Vencejito de Palma es más pequeño, con una visible rabadilla blanca.

EXPANSIÓN: Centro y este de Norteamérica; inverna en Perú, norte de Chile y noroeste de Brasil. **STATUS:** Común transeúnte en Cuba (10 de oct. a diciembre y marzo a 14 de abr.). **HÁBITAT:** Sobre ciudades y pueblos. **VOZ:** Un alto y repetido gorjeo. **ALIMENTACIÓN:** Insectos.

Vencejito de Palma o Vencejito

Antillean-Palm Swift

Tachornis phoenicobia

Lámina 29



DESCRIPCIÓN 11 cm (4,5"). Muy pequeño. De color pardo oscuro por encima, con una visible rabadilla blanca; la cola bifurcada. El macho más oscuro, con la garganta blanca; la hembra más pálida, con la garganta blanco grisácea. Ambos sexos tienen una banda oscura en el pecho. El juvenil es similar a la hembra pero con la parte ventral más oscura. Vuelo errático, similar al del murciélago.

ESPECIES SIMILARES El Vencejo de Chimenea es un poco mayor, y con todo el cuerpo de color pardo oscuro.

EXPANSIÓN: Cuba, Jamaica, La Española, Saona, Beata, Île de la Vache.

STATUS: Común residente permanente en Cuba e Isla de Pinos. **HÁBITAT:** Sobre terrenos bajos y abiertos, sabanas con palmetos, campos de caña u otros campos de cultivo. También en ciudades donde haya abundantes palmas exóticas con grandes pencas colgantes. **NIDIFICACIÓN:** Mayo a julio. Vive y cría en colonias; construye un nido de media copa entre las hojas colgantes y muertas de palmetos (*Washingtonia*), con fibras de plantas y plumas. Pone 2 o 3 huevos blancos. **VOZ:** Ruidoso. Mientras vuela emite casi constantemente un débil gorjeo: *tui-tui*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos.

ZUNZUNES Trochilidae

HUMMINGBIRDS

Muy pequeñitos, con diminutas patas, y largos y finos picos adaptados para extraer el néctar de las flores. Baten a gran velocidad las alas cortas y rígidas, con lo cual su silueta se vuelve borrosa en el aire y su vuelo produce un zumbido característico. De vistosos colores con resplandecientes visos iridiscuentes. Insectos blandos complementan su dieta de néctares. Los nidos, construidos y atendidos exclusivamente por la hembra; son sencillos pero bellamente elaborados, en forma de copas, con líquenes pegados en la

superficie exterior para enmascararlos. Pone siempre 2 huevos blancos. Los machos son por lo general algo menores y más vistosos. (M:319; C:4)

Zunzún o Zumbador o Picaflor

Cuban Emerald

Chlorostilbon ricardii

Lámina 30



DESCRIPCIÓN 10 cm (4"). El macho es casi todo de un verde oscuro, con algo de azul iridiscente, raramente observable en el pecho; también, gracias al reflejo de la luz, puede parecer totalmente negro con las coberteras inferiores de la cola blancas. Delgado, con un pico largo, y ligeramente curvado y una cola negra, larga y bifurcada. La hembra es similar, con el pecho y el vientre gris, y al igual que en el macho, una manchita blanca detrás del ojo. El juvenil similar a la hembra, pero con el verde del dorso más apagado.

ESPECIES SIMILARES La hembra del Zunzuncito es mucho menor, con una cola mucho más corta, en azul y con la punta blanca.

EXPANSIÓN: Bahamas y Cuba. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos. **HÁBITAT:** Bosques, vegetación costera, arboledas. **NIDIFICACIÓN:** El año entero. Construye un pequeño y profundo nido en forma de copa con fibras finas, revestido con líquenes y tela de araña, que coloca colgando de una ramita de árbol o arbusto, la cual puede estar a dos o cuatro metros del suelo. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** El canto del macho consiste en una serie de notas muy altas, rápidas y continuas, que repiten *sii*, así como unas notas *metálicas* saltadas. La hembra tiene un característico llamado en vuelo con una nota muy alta *sii sii sii*, repetida de 2 a 5 veces. **ALIMENTACIÓN:** Néctar, insectos, arañas.

Zunzún de las Bahamas

Bahamas Woodstart

Calliphlox evelynae

No Ilustrado

DESCRIPCIÓN 8-9,5 cm (3,5"). Dorso verdoso y pecho blanco. Zona ventral pardo rojiza. Machos adultos tienen la garganta de color violeta

iridiscente; según el ángulo de observación puede parecer negruzco. Cola bifurcada, con las plumas laterales negruzcas y las centrales pardo rojizas. Las hembras tienen garganta blanca y cola redondeada pardo rojiza. Zona ventral de similar color. Machos inmaduros con garganta grisosa.

ESPECIES SIMILARES Zunzuncito es más pequeño, machos con el dorso azul iridiscente, cola redondeada o ligeramente bifurcada. En la época de cría con la capucha de color rojo escarlata. Ambos sexos son ventralmente gris blancuzco.

EXPANSIÓN: Islas Bahamas. Casual en el sur de la Florida (Lantana, Homestead y Miami). **STATUS:** Casual en Cuba. Un registro: 19 de abr. (2001). Cayo Paredón Grande. **HÁBITAT:** Matorral xeromorfo costero. **ALIMENTACIÓN:** Néctar e insectos.

Colibrí

Ruby-throated Hummingbird

Archilochus colubris

Lámina 30

DESCRIPCIÓN 9,5 cm (3,75"). El macho de un verde lustroso por encima, blanco por debajo, los costados y flancos verdes, la garganta de un rojo brillante que contrasta con el borde blanco del pecho. Cola corta y bifurcada, pico fino y algo curvado. La hembra semejante al macho adulto, pero con la garganta y las puntas de las tres plumas externas de la cola, blancas. El macho inmaduro similar a la hembra, pero algunos pueden tener un viso dorado en el dorso, y con algunos puntos rojos en la garganta.

ESPECIES SIMILARES La hembra del Zunzuncito es más pequeña, con un viso azul verdoso en la espalda y la cola regularmente redondeada.

EXPANSIÓN: Sur de Canadá y este de Estados Unidos; inverna hasta Centroamérica. **STATUS:** Un transeúnte raro en el occidente de Cuba (22 de nov. y 15 de feb. a 15 may.). **HÁBITAT:** Zonas pobladas, arboledas. **VOZ:** Zumbidos cortos. **ALIMENTACIÓN:** Insectos y néctar.

Zunzuncito o Pájaro Mosca o Trovador

Bee Hummingbird

Calypte helena

Lámina 30

DESCRIPCIÓN 6,4 cm (2,5"). El ave más pequeña del mundo. El macho, de un azul intenso iridiscente por encima; algunos individuos, con cabeza y espalda verdosas; gris por debajo. Cabeza y garganta de un rosado o rojo vivo iridiscente. Cola muy corta, redondeada o ligeramente bifurcada, siempre azul. Los machos fuera de la época reproductiva, similares a las hembras, pero con los bordes de las plumas externas de la cola en negro. El macho inmaduro similar a la hembra, pero con el azul de la espalda más intenso. La hembra, mayor, con la espalda de un azul verdoso y las partes ventrales grises. Las plumas externas de la cola con bordes en blanco.



ESPECIES SIMILARES (1) La hembra del Colibrí es algo mayor, con la espalda de un verde brillante y la cola bifurcada. (2) La hembra del Zunzún es mayor, con la espalda de un verde iridiscente, y la cola negra notablemente bifurcada.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. **STATUS:** Globalmente amenazada. Raro y vulnerable en Cuba e Isla de Pinos. Puede encontrarse actualmente en la península de Guanahacabibes, Sierra de Anafe, península de Zapata, Júcaro, y en varias localidades en las montañas del este, fundamentalmente en Cuchillas del Toa y Sierra Cristal. **HABITAT:** Bosques o vegetación tupida, bordes boscosos de ciénagas. **NIDIFICACIÓN:** Abril a junio. Una diminuta copita muy bien elaborada con fibras y revestida con líquenes y tela de araña. Pone 2 huevos blancos. **VOZ:** Muy variada y sorprendentemente alta para su tamaño; emite silbidos y zumbidos. Los machos suelen cantar desde las más altas ramitas desnudas durante la época de cría. La vocalización de la hembra es similar a la del macho. **ALIMENTACIÓN:** Néctar, insectos.

TOCORORO Trogonidae

TROGONS

Aves de mediano tamaño, con picos cortos y anchos, alas cortas, cola larga y cuadrada que cae verticalmente. De vistosos colores; tranquilos, poco activos, permanecen posados inmóviles por largos períodos. Mientras revolotean, desprenden frutas y flores, también comen insectos. Los sexos son generalmente diferentes, aunque este no es el caso en la única especie cubana. (M:39; C:1)

Tocororo o Tocoloro o Guatíní

Cuban Trogon

Priotelus temnurus

Lámina 30

DESCRIPCIÓN 27 cm (10,5"). Esta bella especie constituye el ave nacional de Cuba. Verde oscuro iridiscente por encima, con viso azul violáceo en la corona y nuca; gris pálido la garganta y el pecho que contrastan vivamente



con el rojo bermellón del vientre. De coloración roja el ojo y la mandíbula inferior. Alas y cola con un característico patrón en azul, negro, verde y blanco. La punta de las plumas de la cola es muy llamativa, formando en su conjunto una cruz. Vuelo ondulante.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. **STATUS:** Común en Cuba, Isla de Pinos y en algunos de los grandes cayos del norte de Camagüey (Cayo Guajaba y Cayo Sabinal). **HÁBITAT:** Bosques de todo tipo, también pinares. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. Pone 3 o 4 huevos blancos en nidos abandonados de pájaros carpinteros. **VOZ:** Un rápido y repetido *to-co-lo, to-co-lo-ro*, emitido en series, así como una especie de gemido ronco, y una especie de cloqueo. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, flores y frutas.

PEDORRERA Todidae

TODIES

Pequeños, de llamativos colores; cortas las alas y la cola; pico largo, recto y aplanado; viven en bosques sombríos donde escudriñan el follaje en busca de insectos. Excavan túneles en madera podrida, barrancos de arena o de tierra, donde ponen entre 2 y 4 huevos. (M:5; C:1)

Cartacuba o Pedorrera

Cuban Tody

Todus multicolor

Lámina 30

DESCRIPCIÓN 10,8 cm (4,25"). Verde brillante por encima, gris pálido por debajo, con un brillante parche rojo en la garganta. Pico largo y aplanado, con la mandíbula inferior de color naranja. Ojos azules, lados del cuello con parche azul, coberteras inferiores de la cola amarillas, costados rosados. El juvenil es enteramente gris pálido por debajo, con ojos pardos. Se posa durante un tiempo considerable moviendo la cabeza arriba y abajo con frecuencia. Vuela sólo cortas distancias, con un peculiar sonido: *prrr*, producido por las alas.



ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. **STATUS:** Común en Cuba, Isla de Pinos y en los grandes cayos del norte de las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. **HÁBITAT:** Bosques sombríos, vegetación costera. **NIDIFICACIÓN:** Abril a julio. Pone 3 huevos blancos en túneles que excava en barrancos verticales o en la madera podrida. También utiliza pequeñas cavidades naturales en la piedra caliza de farallones o cuevas. Pueden excavar sus túneles en la arena, a la entrada de cuevas de cangrejos. **VOZ:** Un fuerte y rápido *tot-tot-tot*. **ALIMENTACIÓN:** Orugas, insectos adultos y sus larvas, arañas y pequeñas lagartijas.

MARTÍN PESCADOR Alcedinidae

KINGFISHERS

De pequeño a mediano tamaño; aves solitarias con cabeza grande y prominente cresta, pico largo y recto, y patas pequeñas. La mayor parte de las especies del Nuevo Mundo se alimentan de peces, de ahí que siempre se los encuentre cerca del agua. Sexos usualmente diferentes. Excavan túneles en barrancos para depositar sus huevos. (M:94; C:1)

Martín Pescador o Pitirre de Agua

Belted Kingfisher

Megaceryle alcyon

Lámina 30

DESCRIPCIÓN 33 cm (13"). Cabeza, espalda y la banda del pecho de color gris azulado, con un ancho y casi completo collar blanco. Vientre enteramente blanco en los machos, con una banda pardo rojiza en las hembras. El juvenil exhibe puntos pardo rojizos en la banda azul del pecho. Se posa cerca del agua. Aleteo profundo e irregular, que hace visibles los parches blancos del ala. Revolotea algo antes de lanzarse en picada para atrapar algún pez. Devora la presa posado.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica, inverna por todo el norte de Suramérica; Bahamas y las Antillas. **STATUS:** Común residente invernal y transúnte

en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos (el año entero). **HÁBITAT:** Franja costera con vegetación, estuarios, lagunas, lagunatos y presas. **VOZ:** Un resonante cascabeleo. **ALIMENTACIÓN:** Peces.

PÁJAROS CARPINTEROS Picidae

WOODPECKERS

Aves de mediano tamaño, con picos fuertes y terminados en punta que utilizan para levantar la corteza y taladrar la madera de los árboles. Dedos dispuestos dos hacia adelante y dos hacia atrás. Plumas de la cola muy rígidas, que le sirven de apoyo cuando trepa troncos verticales. Usualmente negros, grises y blancos, con marcas rojas en la cabeza. El vuelo es relativamente corto y ondulante. Las larvas de insectos que taladran la madera, constituyen la fuente principal de alimento para la mayoría de las especies; ellos extraen estas larvas de oquedades en la corteza de los árboles con la ayuda de su lengua larga y protractil. Otros se alimentan de pequeños insectos, savia y pequeñas frutas. Los pájaros carpinteros se caracterizan por golpetear con el pico en los troncos huecos u otras superficies resonantes. Hacen agujeros en los árboles para nidificar. Los huevos son blancos. Los sexos usualmente presentan pocas diferencias en el plumaje. (M:215; C:6)

Carpintero Jabado

West Indian Woodpecker

Melanerpes superciliaris

Lámina 31



DESCRIPCIÓN 28 cm (11"). Gris pálido; dorso y cola barrados en blanco y negro, vientre rojo. En el macho el casquete y la nuca son rojos; en la hembra sólo la nuca. En vuelo las plumas externas del ala presentan un parche blanco. Las aves de Isla de Pinos y Cayo Largo son más pequeñas, con el rojo de la nuca menos extenso. El juvenil similar al adulto pero con menos rojo en la cabeza.

ESPECIES SIMILARES El Carpintero de Paso es menor, con un prominente parche blanco en el interior del ala y con franjas blancas y negras en la cabeza.

EXPANSIÓN: Bahamas, Cuba y Gran Caimán. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos, y los cayos Coco, Romano, Guajaba, San Felipe, Ávalos, Cantiles y Largo. **HÁBITAT:** Bosques, bosques abiertos, arboledas, palmares, manglares. **NIDIFICACIÓN:** Febrero a julio. Usualmente nidifica en palmas muertas, sólo en ocasiones a mucha altura. Pone 5 o 6 huevos blancos. **VOZ:** Un alto, sonoro y repetido *kkrraaa-kkrraaa-kraa*, y también un *krrr-krrr*; muy semejante al que emite el Carpintero Churroso. **ALIMENTACIÓN:** Usualmente obtiene insectos y larvas en las ramas vivas, troncos y curujeyes; también pequeñas frutas, lagartijas y ranas.

Carpintero de Paso o Carpintero Chico

Yellow-bellied Sapsucker

Sphyrapicus varius

Lámina 31

DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5"). Dorso barrado en blanco y negro, vientre blanco amarillento, algo pálido. Cabeza con franjas en blanco y negro, frente roja. Interior del ala negra, con un llamativo parche blanco muy visible en vuelo. El macho adulto con garganta roja. Los juveniles son barrados en blanco, y parduscos en la cabeza, cuello, garganta y pecho. Alas y cola de color pardo negruzco mate.

ESPECIES SIMILARES El Carpintero Jabado es mayor, con un gran parche rojo en la nuca y otro negro detrás del ojo.

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica septentrional, inverna al sur hasta Centroamérica; Bahamas y las Antillas. **STATUS:** Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos (3 de oct. a 1 de may.). Hembras y juveniles son más comunes que los adultos machos. **HÁBITAT:** Bien distribuido en bosques; vegetación costera, arboledas. **VOZ:** Un suave "maullido" parecido al llamado del Zorzal Gato. **ALIMENTACIÓN:** Golpetea la corteza de los troncos, abriendo orificios que forman anillos alrededor del tronco para tomar la savia que brota y capturar los insectos que son atraídos o quedan pegados.

Carpintero Verde o Guasusa o Jorre Jorre o Ruan

Cuban Green Woodpecker

Xiphidiopicus percussus

Lámina 31

DESCRIPCIÓN 23 cm (9"). El dorso de un vivo verde oliváceo, vientre amarillo pálido, rayado en pardo oscuro. La mayor parte de la cabeza blanca, con una franja postocular negra, y un pequeño parche rojo en la base de la garganta y parte superior del pecho. El macho con la cabeza roja desde la frente a la nuca. La hembra con la parte anterior de la corona negra salpicada de blanco, y la parte posterior de la corona y la nuca en rojo. El juvenil más opaco en la espalda, el rojo de la cabeza más restringido hacia el centro. Garganta y parte superior del pecho, negruzcos. Durante la época de nidificación es el único carpintero que produce un sonido



peculiar con las alas al aproximarse al nido; frecuentemente le sirve como señal auditiva durante el ritual de reemplazo del nido. Los individuos que habitan los cayos y la Isla de Pinos, son generalmente más pequeños con los patrones de coloración más pálidos.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. **STATUS:** Común en Cuba, Isla de Pinos y muchos cayos en ambas costas. **HÁBITAT:** Bosques, pinares, vegetación costera y manglares. **NIDIFICACIÓN:** Enero a agosto. Nidifica en troncos de árboles vivos o muertos; la entrada de la cavidad pequeña y redonda; situados a una altura de 2 a 12 metros del suelo. **Pone 3 o 4 huevos blancos.** **VOZ:** Un alto y repetido *tajá-tajá*; también un corto *jorrr-jorrr-jorrr*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos y larvas que extrae de la corteza de ramas y troncos muertos. También pequeñas frutas, ranas, lagartijas y huevos de otras aves.

Carpintero Escapulario

Northern Flicker

Colaptes auratus

Lámina 31



DESCRIPCIÓN 33 cm (13"). Bellamente adornado, con la espalda barrada en negro, vientre blanco con visibles puntos u ocelos negros. Mayor parte de la cabeza en pardo y gris, con una V roja en la nuca. Una ancha medialuna negra se destaca en el pecho. El macho con un "bigote" negro. Cuando vuela exhibe claramente el color amarillo dorado de las alas y la cola. La hembra carece de "bigote". El juvenil es más pálido, sin marcas en la cabeza.

ESPECIES SIMILARES El Carpintero Churroso es pardo amarillento uniforme, barrado en negro.

EXPANSIÓN: La mayor parte de Norteamérica; Centroamérica, Cuba y Gran Caimán. **STATUS:** Común residente permanente. En Cuba: Sierra del Rosario (provincia de Pinar del Río), península de Zapata, Itabo (provincia de Matanzas), Sierra de Trinidad (provincias de Cienfuegos y Sancti Spiritus), Najasa (provincia de Camagüey), Pinares de Mayarí, Sierra de Cupeyal (provincia de Holguín), y los cayos mayores del norte de las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. **HÁBITAT:** Bosques, pinares, vegetación costera, manglares. **NIDIFICACIÓN:** Enero a agosto. Nidifica en árboles vivos o muertos. Pone entre 4 y 6 huevos blancos. **VOZ:** Un explosivo y alto *kiiu*. El llamado es un alto y repetido *uik-uik-uik-uik-uik*. También un bajo, suave y repetido *uicka, uicka*. Este último se asemeja mucho al del Carpintero Churroso, pero más alto en tono. **ALIMENTACIÓN:** Insectos y frutas que obtiene en los árboles, con menos frecuencia en el suelo.

Carpintero Churroso o Carpintero de Tierra

Fernandina's Flicker

Colaptes fernandinae

Lámina 31



DESCRIPCIÓN 34 cm (13,5"). Pardo amarillento uniforme, barrado en negro, cabeza color canela. El macho con un "bigote" negro, y en la hembra está ausente. Amarillo dorado por debajo de las alas y la cola, al igual que el Carpintero Escapulario. El juvenil con colores más opacos.

ESPECIES SIMILARES El Carpintero Escapulario presenta marcas en forma de ocelos en la parte ventral, pecho negro, y la nuca con un parche rojo en forma de V.

EXPANSIÓN: Endémico de Cuba. **STATUS:** Globalmente amenazada. Raro y vulnerable: Sierra del Rosario (provincia de Pinar del Río), Ciénaga de Zapata (provincia de Matanzas), El Dorado y Corralillo (provincia de Villa Clara), Najasa (provincia de Camagüey), Birama (provincia Granma)

y alrededores de Gibara (provincia de Holguín), La Tabla, Los Llanos, El Quemado (provincia Santiago de Cuba). **HÁBITAT:** Bosques semiabiertos, bordes de sabanas con abundancia de palmetos. **NIDIFICACIÓN:** Febrero a junio. Nidifica en palmas muertas, donde abre un agujero grande. Pone 4 o 5 huevos blancos. **VOZ:** Un corto, alto y sonoro *kür*, o *uicka, uicka* y un repetido *krrrr*; similar al del Carpintero Jabado. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente hormigas y larvas de insectos. Encuentra su alimento en el suelo, por lo general.

Carpintero Real

Ivory-billed Woodpecker

Campephilus principalis

Lámina 31



DESCRIPCIÓN 48 cm (19"). Grande, negro con franjas blancas a lo largo del cuello y el dorso; una ancha franja blanca en el ala. Una cresta o penacho rojo en la nuca del macho, negro en la hembra. Pico grueso, recto y de color marfil.

ESPECIES SIMILARES Ninguna.

EXPANSIÓN: Sur de Arkansas, Estados Unidos, y Cuba. **STATUS:** Globalmente amenazada. En crítico peligro de extinción. En Cuba se reportó en el siglo XIX del Pan de Guajaibón, ensenada de Cochinos y montañas de Guantánamo. Tal vez algunos individuos sobreviven en las montañas de las Cuchillas del Toa, donde, en 1987, al menos dos individuos (ambos sexos) posiblemente fueron observados en pinares en los alrededores de Ojito de Agua, cerca de una mina abandonada conocida por "Los Rusos", entre las provincias de Holguín y Guantánamo. Expediciones en busca de esta especie se llevaron a cabo en 1991, 1992 y 1993 sin éxito. **HÁBITAT:** Altos y conservados bosques con abundancia de árboles muertos, y pinares. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a junio. Nidifica en altos y gruesos pinos, así como en palmas. Pone entre 2 y 4 huevos blancos. **VOZ:** Un característico, suave y repetido trompeteo con cierto dejo nasal: *pent*. **ALIMENTACIÓN:** Larvas de grandes insectos que extrae de troncos podridos.

BOBITOS Y PITIRRES Tyrannidae

TYRANT FLYCATCHERS

Aves de pequeño y mediano tamaño. La mayoría coloreados en verde, gris, negro, amarillo pálido y blanco. Pico ancho en la base, plano, y ligeramente ganchudo en la punta, y en la mayoría de las especies rodeado de prominentes vibrisas. Algunas especies tienen una pequeña cresta, y un pequeño parche de brillantes colores en la corona, aunque visible sólo si se observa desde arriba y a corta distancia. Se posan en ramas poniéndose al acecho por considerable tiempo, para atrapar insectos voladores; luego retornan generalmente a la propia percha. Solitarios y territoriales. Sexos invariablemente similares. (M:537; C:18)

Bobito de Bosque del Oeste

Western Wood-Pewee

Contopus sordidulus

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 16 cm (6,25"). Casi idéntico al Bobito de Bosque. Se distinguen en el campo sólo por la voz. Verde pardusco por encima, con garganta y vientre blancuzcos. Barras en las alas definidas. Pecho usualmente con una ancha e ininterrumpida banda de color oscuro. Pico por lo general casi negro, la extensión del color amarillo en la mandíbula inferior es variable. El juvenil tiene los bordes de las plumas del dorso y del ala de color canela.

ESPECIES SIMILARES (1) La mayoría de los bobitos de bosque tiene la banda del pecho más estrecha, y más amarilla la mandíbula inferior. (2) El Bobito Chico tiene una marcada medialuna blanca detrás del ojo, y el pico más ancho y aplanado.

EXPANSIÓN: Oeste de Norteamérica y Centroamérica; inverna desde el norte de Suramérica hasta Bolivia. **STATUS:** Raro transeúnte en Cuba y algunos cayos (4 de jul. a 22 de oct. y 31 de mar. a 22 de abr.). **HÁBITAT:** Bosques abiertos, arboledas. **VOZ:** El llamado más usual es un ronco y descendente *fiir*. **ALIMENTACIÓN:** Fundamentalmente insectos que captura en vuelo.

Bobito de Bosque

Eastern Wood-Pewee

Contopus virens

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 16 cm (6,25"). Casi idéntico al Bobito de Bosque del Oeste. Sólo se distingue en el campo por la voz. Pardo oliváceo por encima; garganta y vientre blancuzcos. La ancha banda de color gris oscuro del pecho usualmente se interrumpe en el centro. La mayor parte de la mandíbula inferior, amarilla. Barras del ala blancuzcas. El juvenil, como el Bobito de Bosque del Oeste.

ESPECIES SIMILARES (1) La mayor parte de los bobitos de bosque del oeste tienen la banda del pecho más ancha, y más negra la mandíbula inferior. (2) El Bobito Chico es más pálido; con una marcada medialuna blanca detrás del ojo; el pico más ancho y aplanado.

EXPANSIÓN: Cría en el este de Norteamérica; invernada en Suramérica, desde Colombia y Venezuela hasta Perú y el oeste de Brasil. **STATUS:** Común transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos (24 de ago. a 4 nov. y 26 de mar. a 22 de abr.). Un registro el 29 de dic., en la península de Zapata. **HÁBITAT:** Bosques abiertos, arboledas. **VOZ:** Un alto y quejumbroso *piiuii*, con nota ascendente, también en nota descendente: *pii-ur*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos capturados en vuelo.

Bobito Chico o Pitibobo

Cuban Pewee

Contopus caribaeus

Lámina 32



DESCRIPCIÓN 16 cm (6,25"). Gris oliváceo oscuro por encima, con pecho y vientre beige de color grisáceo oscuro. Una medialuna blanca detrás del ojo. Pico ancho y aplanado; mandíbula inferior color carne. Mueve la cola cuando se posa. El juvenil tiene la mandíbula inferior más pálida y las barras del ala de color acanelado claro.

ESPECIES SIMILARES (1) El Bobito Grande es mayor, con la cola y las alas de un pardo rojizo. Cabeza y pico totalmente oscuros. El llamado es muy similar al del Bobito Chico, pero más lento. (2) Ambos bobitos de bosque tienen el pico más estrecho, el pecho gris oscuro, y carecen de la medialuna blanca detrás del ojo. (3) El Bobito Americano es más pálido por debajo, con el pico más estrecho y negro; carece de marcas en el ojo.

EXPANSIÓN: Bahamas y Cuba. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y algunos cayos. **HÁBITAT:** Bosques, pinares, borde de bosques, ciénagas, manglares. Raro en altas elevaciones. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a junio. El nido en forma de copa lo construyen en la bifurcación de ramas de árboles o arbustos, y lo elaboran con finas raicillas y pelos, todo revestido con líquenes y musgo. Pone hasta 4 huevos blancos con

abundantes manchas oscuras en pardo y violeta, concentradas en el polo mayor. **VOZ:** Un prolongado y descendente silbido: *wiiiioooo*. También un débil y repetido *uiit*, similar al del Bobito Grande pero más rápido. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos capturados en vuelo, también fruticas.

Bobito Amarillo

Yellow-bellied Flycatcher

Empidonax flaviventris

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 14 cm (5,5"). Verde oliváceo por encima, amarillento por debajo, con un ancho viso oliváceo en el pecho. Un llamativo anillo ocular amarillo. Mandíbula inferior de un anaranjado pálido. Dos bien señaladas barras amarillentas o blancuzcas en el ala. Patas grises.

ESPECIES SIMILARES (1) El Bobito Verde es amarillo pálido por debajo, con la garganta blancuzca, parte inferior del pecho blanca y alas más largas. (2) El Bobito de Alder y (3) el Bobito de Traill usualmente carecen del llamativo anillo ocular y tienen la garganta blancuzca, vientre amarillento y son de un pardo oliváceo por encima. Estas tres especies carecen del viso amarillo.

EXPANSIÓN: Cría en Norteamérica septentrional; inverna en Centroamérica.

STATUS: Muy raro como transeúnte otoñal en Cuba (8 de sept. a 4 de oct.). **HÁBITAT:** Bosques abiertos, matorrales, arboledas, vegetación costera. **VOZ:** Un silbido: *chu-iii*, y un resonante *che-lek*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos que captura en vuelo.

Bobito Verde

Acadian Flycatcher

Empidonax virescens

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 15 cm (6"). Verde oliváceo por encima, con la garganta blancuzca. Pecho con viso oliváceo, parte superior del vientre blanca, resto del vientre y coberteras inferiores de la cola amarillentas. Patas grises. Mandíbula inferior amarilla. Anillo ocular amarillo. Dos visibles barras en el ala. El inmaduro exhibe un fuerte viso amarillo por debajo. El juvenil tiene las partes superiores de color pardo oliváceo y es más blanco por debajo, con las barras del ala color acanelado pálido.

ESPECIES SIMILARES (1) El Bobito Amarillo es mucho más amarillo por debajo, con alas más cortas y anillo ocular más marcado. (2) El Bobito de Alder y (3) el Bobito de Traill son más oscuros y pardos por encima, con el anillo ocular ausente o muy poco visible.

EXPANSIÓN: Sur de Ontario, este de Estados Unidos; inverna desde Nicaragua hasta el norte de Suramérica. **STATUS:** Un raro pero regular transeúnte en Cuba, principalmente en otoño (6 de sept. a 15 de oct.; 28 de abr.).

HÁBITAT: Bosques abiertos, arboledas. **VOZ:** Un silbido ascendente: *pii-piit-sa*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos que captura en vuelo.

Bobito de Alder

Alder Flycatcher

Empidonax alnorum

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 15 cm (5,75"). Casi idéntico al Bobito de Traill. Sólo identificable en el campo por la voz. Pardo oliváceo por encima. Anillo ocular, ausente o poco marcado. Barras del ala blancuzcas y visibles. Garganta blancuzca, pecho oliváceo pálido, vientre amarillo pálido. Patas negras, mandíbula inferior amarilla. El juvenil exhibe las barras del ala color acanelado claro y un anillo ocular ligeramente señalado.

ESPECIES SIMILARES (1) La mayor parte de los bobitos de Traill carecen de anillo ocular, o lo presentan muy poco definido. (2) El Bobito Verde y (3) el Bobito Amarillo son oliváceos por encima, con un visible anillo ocular. (4) los bobitos de bosque son algo mayores, con vestigios de cresta en la cabeza, las alas más largas y una banda gris en el pecho.

EXPANSIÓN: Cría en Alaska, Canadá y nordeste de Estados Unidos; inverna en Suramérica. **STATUS:** Muy raro transeúnte en Cuba (7-15 de oct.). **HÁBITAT:** Bosques abiertos, arboledas. **VOZ:** Un zumbido: *rii-bii-a*; el llamado es un alto *piiip*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos que captura en vuelo.

Bobito de Traill

Willow Flycatcher

Empidonax traillii

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 15 cm (6"). Casi idéntico al Bobito de Alder. Sólo identificable en el campo por la voz. Pardo oliváceo por encima. Ojos usualmente sin anillo. Dos visibles barras en el ala. Garganta y parte superior del vientre, blancos. Pecho con viso oliváceo, vientre con viso amarillo. Patas negras, y la mandíbula inferior amarilla.

ESPECIES SIMILARES (1) La mayor parte de los bobitos de Alder tienen el anillo ocular más marcado. (2) El Bobito Verde y (3) el Bobito Amarillo son más verdes por encima, con un visible anillo ocular amarillento.

EXPANSIÓN: Oeste de Canadá, norte y centro de Estados Unidos; inverna al sur hasta Centroamérica. **STATUS:** Muy raro transeúnte otoñal en Cuba (12 de sept. a 15 de oct.). **HÁBITAT:** Bosques abiertos, arboledas. **VOZ:** Un zumbido: *fittz-biu*; el llamado, un enfático *rit* o *uit*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos capturados en vuelo.

Bobito Americano

Eastern Phoebe

Sayornis phoebe

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 18 cm (7"). Pardo grisáceo por encima, con la cabeza oscura, y sin anillo ocular. Garganta blanca y vientre gris amarillento pálido. Dos marcadas barras en el ala, pico negro. Tiene el hábito de mover la cola

con regularidad. El juvenil es pardo por encima, con dos barras de un acanelado pálido en el ala.

ESPECIES SIMILARES (1) El Bobito Chico tiene una medialuna blanca detrás del ojo, pico ancho y aplanado, mandíbula inferior amarilla. (2) Los bobitos de bosque tienen barras en el ala, son más oscuros en el pecho, y no mueven la cola.

EXPANSIÓN: Canadá, este y centro de Norteamérica; inverna al sur hasta Oaxaca (México). **STATUS:** Casual en Cuba. Cinco registros: Febrero (siglo XIX), 14 y 16 de sep. (1960), 28 de nov., uno sin fecha. La Habana y Sierra de Najasa, Camagüey. **HÁBITAT:** Bosques abiertos. **VOZ:** Un repetido *foe-bi*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente captura insectos en vuelo.

Bobito de Cresta

Great Crested Flycatcher

Myiarchus crinitus

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 20 cm (8"). Cabeza y espalda de color oliváceo; gris desde la garganta al pecho; vientre de un amarillo vivo, alas con la parte externa de las plumas primarias pardo rojizas; parte interna de todas las plumas de la cola, excepto las centrales, de un pardo rojizo. Pico negro y base de la mandíbula inferior, anaranjada.

ESPECIES SIMILARES El Bobito Grande tiene el pecho gris pálido, vientre amarillo pálido, y la parte interna de las plumas de las alas y la cola, color canela.

EXPANSIÓN: Centro y este de Norteamérica; inverna hasta el norte de Suramérica. **STATUS:** Raro transeúnte en Cuba (20 de sept. a 26 de dic. y 19 de feb. a 22 de abr.). **HÁBITAT:** Bosques tupidos, con frecuencia en lo alto de los árboles. **VOZ:** Variada: un alto silbido *uip*; un corrido *prrr-it*; y un *uirrop*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos.

Bobito Grande

La Sagra's Flycatcher

Myiarchus sagrae

Lámina 32



DESCRIPCIÓN 20 cm (8"). Espalda de color pardo oliváceo; cabeza negruzca, regularmente con cresta; pico todo negro; garganta y parte superior del

vientre gris; parte inferior del vientre de color amarillo pálido. Ala y cola con la parte interna de las plumas de color canela oscuro.

ESPECIES SIMILARES (1) El Bobito de Cresta tiene el pecho de un gris más oscuro y el vientre de un amarillo más subido; alas y cola de color pardo rojizo. (2) El Ruiseñor exhibe un anillo ocular de color crema y dos líneas oscuras en la garganta; se posa generalmente con la cola colgando. (3) El Bobito Chico es más pequeño, con una medialuna blanca detrás del ojo, y la mandíbula inferior color carne.

EXPANSIÓN: Bahamas, Cuba y Gran Caimán. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y muchos de los cayos mayores. **HÁBITAT:** Bosques, desde el nivel del mar hasta altas elevaciones. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. En oquedades de ramas secas, o en nidos abandonados de pájaros carpinteros; revisten el fondo con hierbas secas, pelos, raicillas, plumas; pone 4 huevos de coloración blanco amarillenta, manchados en pardo y violeta en el polo mayor. **VOZ:** Un silbido: *uiit-zí-uuir* o *uiit-zí*. El llamado un silbido ascendente: *uiit*, repetido a intervalos, algunas veces con un tono chillón. Comparable con el Bobito Chico. **ALIMENTACIÓN:** Insectos que captura en vuelo, o directamente sobre las hojas o ramitas; también pequeñas lagartijas.

Pitirre Tropical

Tropical Kingbird

Tyrannus melancholicus

Lámina 33

DESCRIPCIÓN 23 cm (9,25"). Verde grisáceo por encima, con la cabeza gris. Pico grande, garganta blanca. Pecho oliváceo amarillento, vientre de un amarillo vivo. Cola escotada, pardo negruzca. Parche oculto de la corona, rojo. El juvenil similar al adulto, pero sin el parche de la corona y con el borde de las coberteras inferiores de la cola de un acanelado pálido.

ESPECIES SIMILARES El Pitirre del Oeste tiene la cola cuadrada y negra, blanco el borde externo.

EXPANSIÓN: Arizona y desde el noroeste de México hasta Argentina. **STATUS:** Casual en Cuba. Tres registros: 17 de feb. y dos sin fecha, península de Zapata y Cayo Largo. **HÁBITAT:** Áreas abiertas. **VOZ:** Un repetido gorjeo: *pip*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos que captura en vuelo.

Pitirre del Oeste*

Western Kingbird

Tyrannus verticalis

Lámina 33

DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5"). Oliváceo por encima, con la cabeza de color gris pálido y el vientre amarillo. Cola cuadrada y negra, con estrechos bordes blancos. Parche oculto de la corona, anaranjado. El juvenil similar al adulto, pero sin el parche de la corona, y las coberteras del ala con bordes en canela claro.

ESPECIES SIMILARES El Pitirre Tropical tiene toda la cola de un pardo negrozco, y escotada; un viso oliváceo en todo el pecho, y pico mucho mayor.

EXPANSIÓN: Cría al oeste de Norteamérica; inverte al sur hasta Costa Rica.

STATUS: Un registro visual en Cuba (26 de ago. de 1986, Najasa). **HÁBITAT:** Terrenos abiertos. **VOZ:** Un corto y enfático *uiit*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos capturados en vuelo.

Pitirre Americano

Eastern Kingbird

Tyrannus tyrannus

Lámina 33

DESCRIPCIÓN 22 cm (8,5"). Gris pizarra oscuro por encima, blanco por debajo, con un viso gris pálido en el pecho. Cabeza negra, parche oculto de la corona, anaranjado. Barras del ala poco señaladas. Cola cuadrada, con una banda blanca muy visible en su extremo. El inmaduro es pardo grisáceo por encima y carece del parche en la corona.

ESPECIES SIMILARES (1) El Pitirre Guatífere tiene la banda terminal de la cola blancuzca, y menos definida; plumas axilares y coberteras inferiores de la cola con un viso amarillo, y el pico mucho mayor. (2) El Pitirre Abejero tiene gris la cabeza y la espalda, con la cola escotada sin banda terminal blanca; el pico mucho mayor.

EXPANSIÓN: Norteamérica; inverte al sur hasta el norte de Chile y norte de Argentina. **STATUS:** Común transeúnte en Cuba (4 de jul. a noviembre y 31 de mar. a 22 de abr.). **HÁBITAT:** Bosques abiertos, fincas, parques, arboledas. **VOZ:** Un estridente grito: *kip-kip-kipper*, o *dzii-dzii*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos capturados en vuelo y frutas.

Pitirre Abejero o Pitirre

Gray Kingbird

Tyrannus dominicensis

Lámina 33



DESCRIPCIÓN 23 cm (9"). Gris oscuro por encima, con un parche negro en el oído. Partes ventrales por lo general blancas, con un ligero viso amarillo en el vientre y en las coberteras inferiores de la cola. Cola escotada. Pico grande. Parche oculto de la corona anaranjado. El juvenil con el borde

de las plumas del ala y la espalda de color pardo, y sin el parche de la corona.

ESPECIES SIMILARES (1) El Pitirre Americano y (2) el Pitirre Guatíbere tienen la cabeza negra y la cola cuadrada. (3) El Pitirre Real es mayor, con el pico más grande y robusto; la cabeza negruzca y la cola ligeramente escotada.

EXPANSIÓN: Cría en zonas costeras del sureste de Estados Unidos, Bahamas y las Antillas, y norte de Suramérica; inverna desde La Española y Puerto Rico por el sur hasta las Antillas Menores, y desde Panamá hasta el norte de Suramérica. **STATUS:** Común residente veraniego y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y muchos de los cayos mayores (20 de ene. a 20 de oct.). Generalmente arriban a partir del 10 de mar.

HÁBITAT: Bosques abiertos, arboledas. **NIDIFICACIÓN:** Abril a julio. Construye el nido en los árboles en forma de copa con palitos, ramitas, lianas y hierba; acolchonado con hierba fina y raicillas. Pone 3 o 4 huevos de coloración blanco crema o rosado pálido, manchados con rojo acanelado, lila pálido y gris. **VOZ:** Un alto y redoblado *pit-pitirri-ri-re*, de tono más alto que el del Pitirre Guatíbere; además, un corto y rápido *pi-tir-re*. **ALIMENTACIÓN:** Abejas y otros insectos voladores; también fruticas y lagartijas.

Pitirre Guatíbere o Pitirre Cantor, Guatíbere

Loggerhead Kingbird

Tyrannus caudifasciatus

Lámina 33



DESCRIPCIÓN 23 cm (9"). El gris oscuro de la espalda y la cola contrasta con la coloración negra de la cabeza. Blanco por debajo, con viso amarillo en las axilares y coberteras inferiores de la cola. Parche oculto de la corona generalmente amarillo, algunas veces anaranjado pálido. Cola cuadrada, con una banda terminal blancuzca. El juvenil con las barras del ala parduscas y sin el parche de la corona.

ESPECIES SIMILARES (1) El Pitirre Abejero tiene la cabeza gris y un visible parche auricular negro. (2) El Pitirre Real es mayor, con el pico más grande y grueso, y menos marcada la banda blancuzca terminal de la cola escotada. (3) El Pitirre Americano es más blanco por debajo, con el pico menor y con una muy marcada banda blanca en la punta de la cola.

EXPANSIÓN: Bahamas, Antillas Mayores e Islas Caimán. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y en muchos cayos de los archipiélagos de Sabana-Camagüey y Jardines de la Reina. **HÁBITAT:** Bosques, manglares, borde de ciénagas. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. El nido, en forma de copa, lo construye a considerable altura, con ramitas, raicillas y pelos, sin ningún acolchonamiento. Pone 2 o 3 huevos color salmón, con marcas pardo rojizas y violáceas en el polo mayor. **VOZ:** Un alto y ascendente *pit-pit-pit-pit-pit-tirr-ri-ri-reee*, y un redoblante chacharco. **ALIMENTACIÓN:** Grandes insectos voladores, orugas, lagartijas y fruticas.

Pitirre Real

Giant Kingbird

Tyrannus cubensis

Lámina 33



DESCRIPCIÓN 26 cm (10,25"). Un fornido pitirre con pico grueso. Gris oscuro por encima, cabeza negruzca y partes ventrales blancas. Alas cortas. Cola ligeramente escotada, y puede tener algunas veces el borde extremo blancuzco. Parche oculto de la corona, anaranjado; ausente en los juveniles.

ESPECIES SIMILARES (1) El Pitirre Guatibere es menor, con la cabeza más oscura, el pico más corto y fino, y con la banda terminal de la cola cuadrada más visible. (2) El Pitirre Abejero es más pequeño, con el pico menos robusto, la cabeza gris y la cola bien escotada.

EXPANSIÓN: Cuba. En otros tiempos en las Bahamas (Caicos y Gran Inagua). **STATUS:** Globalmente amenazada. En peligro. Raro residente permanente en Cuba e Isla de Pinos: península de Guanahacabibes, Sierra de Anafe, Sierra de Jumagua, Guajaimico (entre Cienfuegos y Trinidad), Sierra de Najasa, Cabo Cruz, Mayarí, Nicaro, y montañas de las sierras de Sagua-Baracoa, y Cuchillas del Toa (Ojito de Agua); río Santa Fe (Isla de Pinos). **HÁBITAT:** Bosques altos y semiabiertos, preferentemente cerca de cuerpos de agua, pinares. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a junio. Construye el nido en forma de copa en lo alto de árboles, con ramitas, raicillas, hierbas, pelos y sin acolchonamiento. Pone 2 o 3 huevos blanco cremoso manchados o punteados en rojo-canela, gris y lila. **VOZ:** *Tui-úi,tui*.

ALIMENTACIÓN: Grandes insectos, pichones de otras aves, lagartijas y fruticas.

Bobito Cola de Tijera

Scissor-tailed Flycatcher

Tyrannus forficatus

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 33 cm, incluyendo las plumas largas de la cola del macho (13"). Gris pálido; alas y larga cola bifurcada, negras. Parte inferior del vientre y coberteras anales con un viso rosado, así como las coberteras bajo el ala, y con las plumas axilares rojas. La hembra tiene la cola más corta y el inmaduro más aún.

ESPECIES SIMILARES El Bobito de Cola Ahorquillada tiene la corona negra y carece de los tonos rosados.

EXPANSIÓN: Texas, estados adyacentes de Estados Unidos y nordeste de México, inverna por el sur hasta Panamá. **STATUS:** Casual en Cuba. Cuatro registros: 21 de nov. (1952), 11 de nov. (1984), 13 de nov. (1998), 20 de ene. (1999). Ensenada de Guadiana, San Antonio de los Baños, Guardalavaca. **HÁBITAT:** Terrenos semiabiertos. **VOZ:** Un áspero *ki-ki*. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos capturados al vuelo.

Bobito de Cola Ahorquillada

Fork-tailed Flycatcher

Tyrannus savana

Lámina 32

DESCRIPCIÓN 36 cm, incluidas las plumas largas de la cola (14"). Negro por encima, excepto la espalda, de un gris pálido; blanco por debajo. Cola extremadamente larga y bifurcada. El inmaduro con la cola más corta.

ESPECIES SIMILARES El Bobito Cola de Tijera tiene la cabeza blanca y los costados rosados.

EXPANSIÓN: Centro y Suramérica; inverna irregularmente a través de Centroamérica desde sus territorios de cría en el sureste de México hasta el sur y centro de Panamá. En Suramérica, desde Colombia a la Argentina. **STATUS:** Casual en Cuba. Dos registros: 11 de nov. y feb., provincias occidentales. **HÁBITAT:** Terrenos abiertos. **ALIMENTACIÓN:** Básicamente insectos que captura en vuelo.

VIREOS Vireonidae

VIREOS

De pequeño tamaño, con picos ligeramente gruesos y algo ganchudos. De colores pálidos, parduscos, o verde oliváceos por encima, claros por debajo. Las especies que exhiben cejas carecen de barras en el ala; pero aquellas con anillo ocular y loreal sí las poseen. Su alimento consiste básicamente