

**Bijirita Grande**

Yellow-breasted Chat

*Icteria virens*

Lámina 43

**DESCRIPCIÓN** 19 cm (7,5"). Muy grande. *Macho*: En plumaje de invierno con el dorso olivo oscuro sin marcas, visible loreal negruzco, con una línea blanca superior. Anillo ocular blanco, pico grande y algo pálido. Cola algo larga, bordeada en blanco. Garganta y pecho amarillo con viso oliváceo, vientre y coberteras inferiores de la cola blancas. El macho en plumaje de cría con el pico siempre negro, pueden mostrar auriculares y corona negra. *Zona ventral amarillo brillante. Hembra*: Loreal y amarillo ventral más pálido. El pico puede ser algo pálido. Los inmaduros con el amarillo ventral más opaco, con un extenso viso oliváceo; las hembras con un tenue color pardo en los costados. Solitaria y tímida, se esconde entre los arbustos.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN**: Cría al suroeste de Canadá, Estados Unidos y México; inverte al sur hasta Panamá. **STATUS**: Muy raro transeúnte en Cuba (24 de oct. a 22 de nov. y 12 de feb. a 5 de may.). **HÁBITAT**: Borde de bosques, matorrales. **VOZ**: Un solo *kuk*. **ALIMENTACIÓN**: Insectos.

**REINITA Coerebidae****BANANAQUITS**

Aves pequeñas y de vistoso colorido, arbóreas, de cola corta y un fino y curvado pico, que les permite alimentarse de jugosas frutas y del néctar de las flores. (M:1; C:1)

**Reinita**

Bananaquit

*Coereba flaveola*

Lámina 44

**DESCRIPCIÓN** 11 cm (4,5"). Negra por encima con una llamativa ceja blanca y rabadilla amarilla. Blacuzca por debajo, con el pecho amarillo. Una pequeña manchita blanca en la base de las primarias. Pico fino y curvado, con un punto rojo en la base. Cola corta. El inmaduro es más opaco, con una ceja gris amarillenta. Rabadilla con un amarillo opaco.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN**: México hasta el norte de Argentina; Bahamas y las Antillas. **STATUS**: Raro visitante y posible residente permanente. Cinco especímenes: uno de Cayo Tío Pepe y cuatro de los alrededores de Gibara. Ocho registros recientes que son en los cayos del norte de Ciego de Ávila y Camagüey: tres capturados y anillados, y otro visto en Cayo Coco; tres observados en Cayo Paredón Grande y otro en Cayo Guillermo. **NIDIFICACIÓN**: No



verdosa, con manchas pardo rojizas y lila en el polo mayor. **VOZ:** El canto comienza con un par de *briip-briip*, seguido de una serie de notas altas: *tu-tu-tu-wii-wii-tu-tu-tu*. El llamado es un corto y alto *tsip-tsip*; también un sonido nasal: *bizzz*. **ALIMENTACIÓN:** Néctar, frutas, insectos.

## Cabrero

Western Spindalis

*Spindalis zena*

Lámina 45



**DESCRIPCIÓN** 15 cm (6"). **Macho:** Marcadamente coloreado en naranja, castaño, blanco y negro. Cabeza con franjas blancas, ala con un pequeño parche blanco en la base de las primarias, y estas extensivamente bordeadas en blanco. Garganta y pecho de un rico castaño pardusco, con la parte superior del pecho más oscura. Vientre grisáceo. **Hembra:** Gris oliváceo por encima, las marcas de la cabeza poco visibles, con un pequeño parche blancuzco en la base de las primarias, y la parte ventral de un pálido pardo grisáceo. El juvenil similar a la hembra, pero el macho joven tiene más llamativas las franjas de la cabeza y cierto viso naranja en el plumaje. Pico corto y grueso en ambos sexos.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** Bahamas, Antillas Mayores, Gran Caimán y Cozumel. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos, y muchos de los grandes cayos en ambas costas: Santamaría, Coco, Cinco Leguas, Cantiles. **HÁBITAT:** Bosques abiertos, matorral xeromorfo, bosques en zonas montañosas, desde el nivel del mar hasta las mayores alturas. **NIDIFICACIÓN:** Febrero a julio. Construye un nido en forma de copa bastante alto en las ramas. Pone 2 o 3 huevos, cubiertos con manchitas pardas y negruzcas. **VOZ:** Canto variable, con una serie de altos *tsips* y zumbidos, ej.: *uiizi-uu-zi-uuizi-ti-ti-bizz-uuizi-uuizi*. El canto más característico es un fino y alto *tsiiiii*. **ALIMENTACIÓN:** Fundamentalmente frutas, semillas e insectos.

## Cardenal o Tanagra

Summer Tanager

*Piranga rubra*

Lámina 45

**DESCRIPCIÓN** 19 cm (7,5"). **Macho:** Enteramente rojo, con las alas y la cola de un rojo más oscuro. El macho inmaduro es oliváceo por encima con

las alas algo más oscuras, y amarillo anaranjado en la parte ventral, algunas veces con manchas en rojo. *Hembra*: Similar al macho joven. Ambos sexos tienen el pico más grueso y algo más corto y pálido que el de otros cardenales, aunque algo más largo. Coberteras bajo el ala amarillentas, muy visibles en vuelo. Se alimenta solo o en parejas.

**ESPECIES SIMILARES** El macho del Cardenal de Alas Negras en plumaje de cría, con alas y cola negras; el macho en plumaje de invierno y la hembra son más verdosos, con las alas y la cola más oscuras, y el pico más corto.

**EXPANSIÓN:** Cría al sur de Norteamérica; inverna al sur hasta Bolivia y Brasil; Bahamas y Cuba. **STATUS:** Raro residente invernal y menos raro como transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los cayos mayores (1 de sept. a 28 de abr.). **HÁBITAT:** Bosques, matorrales, jardines. **VOZ:** Un *pi-ki-tuk*; también un silbido: *tuii*. **ALIMENTACIÓN:** Grandes insectos, frutas, semillas, particularmente las de la palma real (palmiche).

### Cardenal Alinegro o Tanagra o Cardenal de Alas Negras

Scarlet Tanager

*Piranga olivacea*

Lámina 45

**DESCRIPCIÓN** 18 cm (7"). *Macho*: En plumaje de invierno verde oliváceo, con alas y cola negruzcas. Amarillento por debajo. Plumaje de cría, sólo observable durante la migración primaveral, rojo brillante, con alas y cola negras. *Hembra*: Similar al macho en invierno, con alas pardo verdosas. Ambos sexos con el pico amarillento, grueso y algo corto. Usualmente se posa sobre ramas altas, haciendo rápidos revoloteos en busca de comida.

**ESPECIES SIMILARES** El macho inmaduro y la hembra del Cardenal tienen un tenue tono naranja por debajo, alas y cola casi con la misma tonalidad del cuerpo, pico más largo.

**EXPANSIÓN:** Cría principalmente al nordeste de Estados Unidos; inverna al sur desde Panamá hasta Bolivia. **STATUS:** Raro transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los grandes cayos de la costa norte, más común en el otoño que en primavera (21 de sept. a 6 de nov. y 16 de feb. a 4 de may.). **HÁBITAT:** Bosques abiertos, jardines. **VOZ:** Un bajo *chip-burr*. **ALIMENTACIÓN:** Grandes insectos, frutas, semillas.

### Cardenal del Oeste\*

Western Tanager

*Piranga ludoviciana*

Lámina 51

**DESCRIPCIÓN** 18 cm (7"). *Macho*: En plumaje de invierno amarillo verdoso en la cabeza, a menudo con algo de rojo. Parte media de la espalda, alas y cola casi por completo negras. Barras de las alas bien marcadas, de color amarillo. Parte inferior de la espalda y vientre amarillos. En plumaje de cría con la cabeza roja. *Hembra*: Espalda grisácea, parte posterior del cuello y rabadilla de un amarillo oliváceo. La cabeza carece de rojo,

ocasionalmente con cierto viso. Barras en el ala amarillentas o blancuzcas. La parte ventral amarilla. Pico algo grueso como en otros miembros del género. El joven se asemeja a la hembra.

**ESPECIES SIMILARES** Las hembras de los turpiales tienen el pico afinado.

**EXPANSIÓN:** Oeste de Norteamérica, inverna al sur hasta América Central.

**STATUS:** Tres registros no confirmados en Cuba: 2 de ene. (1978) en Cárdenas, y otro más reciente en La Habana. **HÁBITAT:** Bosques, áreas abiertas con escasos árboles. **VOZ:** Llamado: *pit-er-ik*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, frutas.

## TOMEGUINES Y GORRIONES Emberizidae

### GRASSQUITS AND SPARROWS

Las aves son pequeñas o de mediano tamaño, con picos cónicos y de hábitos regularmente terrestres. Se alimentan de semillas, frutas e insectos. (M: 285; C:14)

#### Gorrión de Cola Verde

Green-tailed Towhee

*Pipilo chlorurus*

Lámina 48

**DESCRIPCIÓN** 18 cm (7,25"). Oliváceo por encima, cabeza gris con la corona pardo rojiza y dos líneas a nivel de la garganta de color pardo negro. Gris por debajo, con la garganta blanca bien definida. Cola larga y redondeada; pico corto y cónico.

**ESPECIES SIMILARES** El Cabrerito de la Ciénaga es de color gris oliváceo por encima, con rayas oscuras; el pecho y el vientre de color amarillo; los costados de un olivo grisáceo.

**EXPANSIÓN:** Cría al oeste de Estados Unidos, inverna al sur hasta México.

**STATUS:** Casual en Cuba. Un registro: 8 de ene. (1964), Casilda, Trinidad. **HÁBITAT:** Zonas de arbustos semiáridos. **VOZ:** Sonido similar a un gato: *miau*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, semillas.

#### Negríto


Cuban Bullfinch

*Melopyrrha nigra*

Lámina 47

**DESCRIPCIÓN** 14 cm (5,5"). Pico muy grueso y negro. **Macho:** Negro lustroso, con parche blanco en el ala. **Hembra:** Similar pero más opaca, con el parche blanco más pequeño. El macho inmaduro se asemeja a la hembra, pero con la cabeza y las plumas de vuelo de un negro lustroso. **Juvenil:** Similar a la hembra, con las puntas de las plumas de una tonalidad verdosa. A menudo se alimenta en pequeñas bandadas.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.



**EXPANSIÓN:** Gran Caimán y Cuba. **STATUS:** Común residente permanente en toda Cuba, Isla de Pinos y algunos de los grandes cayos del archipiélago de Sabana-Camagüey, y Cayo Cantiles en el archipiélago de los Canarreos. **HÁBITAT:** Matorrales y bosques. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a agosto. El nido es grande y globoso, con entrada lateral; lo fabrica de hierbas secas, hojas, raicitas, pelos y plumas. Pone de 3 a 4 huevos blancuzcos con leve tonalidad verdosa, y pequeñas manchitas de color pardo rojizo y lila, concentradas en el polo mayor. **VOZ:** Un fino, prolongado y melodioso canto: *ti-ti-tisissiiii-tsiüütsiiii-tui-tui*. El llamado: *chi-dip*; también un fino *tsí*, repetido a menudo. **ALIMENTACIÓN:** Frutas, semillas e insectos.

### Tomeguín del Pinar o Senserenico

Cuban Grassquit

*Tiaris canorus*

Lámina 46



**DESCRIPCIÓN** 11 cm (4,5"). **Macho:** De color olivo oscuro por encima con la corona gris. Máscara y gran parche negro en el pecho, separado por un collar de color amarillo naranja que continúa en forma de medialuna por detrás del ojo. Vientre gris. **Hembra:** Similar al macho, con máscara de color castaño y collar de un amarillo más pálido. La parte ventral gris. **Juvenil:** Más opaco que la hembra. Collar amarillo verdoso por encima del cuello, medialuna blanca por detrás del ojo; anillo ocular, loreal y gar-

alimentan entre la hierba, estas aves suelen saltar para alcanzar las semillas en las espigas más altas.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Tomeguín de la Tierra tiene un pequeño parche, tanto en la garganta como en la ceja, de color naranja o amarillo. (2) La hembra del Tomeguín Prieto tiene la cara, la garganta y pecho de color gris oliváceo.

**EXPANSIÓN:** Endémico de Cuba. **STATUS:** Común en algunas regiones, pero ha disminuido notablemente cerca de los asentamientos humanos. Ausente de Isla de Pinos y cayos. **HÁBITAT:** Arbustos costeros, bosques, pinares, matorrales cerca de campos cultivados. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a junio. El nido es grande y globoso, con entrada lateral; lo fabrica con hierbas secas, raicillas, pelos y fibras vegetales. Pone de 2 a 3 huevos blancos, con una tenue tonalidad gris verdosa, y pequeñas manchitas de color pardo y lila, concentradas en el polo mayor. **VOZ:** Canto: *chiri-wichi-wichi, chibiri-wichi*; y también un *tsit-tsit-tillio, tsit-tsit-tillio*. Llamado alto, y repetido con frecuencia: *tsit*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas y pequeñas frutas.

### Tomeguín de la Tierra o Viudito

Yellow-faced Grassquit

*Tiaris olivaceus*

Lámina 46



**DESCRIPCIÓN** 11 cm (4,5"). **Macho:** Olivo por encima, grisáceo por debajo. Una visible ceja y parche en la garganta, ambos de color naranja. Un parche negro en el pecho que incrementa de tamaño con la edad. **Hembra:** Similar, la ceja y el parche de la garganta de color amarillo pálido, y carece del parche negro en el pecho. **Juvenil:** Similar a la hembra, con la ceja y el parche de la garganta en tonalidades más pálidas. Social fuera de la época de cría.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El macho del Tomeguín del Pinar tiene una máscara negra y un visible collar de color amarillo naranja. La hembra tiene la máscara de color castaño y el collar amarillo. (2) El Tomeguín Prieto carece de tonos amarillos o naranjas.

**EXPANSIÓN:** México hasta el norte de Suramérica; las Antillas Mayores e Islas Caimán. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los grandes cayos. **HÁBITAT:** Matorrales, arbustos y tierras cultivadas, desde el nivel del mar hasta elevaciones medias. **NIDIFICACIÓN:**

Todo el año. El nido, globoso, lo sitúan a baja altura, con entrada lateral. Lo fabrica con hierbas secas, raicitas, pelos y fibras vegetales. Pone de 2 a 4 huevos blancos de una tenue tonalidad azulada, con manchas de color pardo y lila, concentradas en el polo mayor. **VOZ:** Canto débil, pero agradables trinos: *tsii-tsiii-tsiii-tsiii-tsiii-tsiii*. El llamado es un alto y fino *tsit*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, pequeñas frutas y retoños.

### Tomeguín Prieto o Barbito

Black-faced Grassquit

*Tiaris bicolor*

Lámina 46



**DESCRIPCIÓN** 11 cm (4,5"). **Macho:** Con la espalda de color olivo oscuro; cabeza y parte ventral de un negro poco lustroso. **Hembra:** Gris oliváceo por encima, más pálida por debajo. El inmaduro más opaco. Como en todos los miembros de este pequeño género, carece de barras en el ala. Usualmente se alimentan en el suelo.

**ESPECIES SIMILARES** Las hembras de ambas especies: (1) Tomeguín del Pinar y (2) Tomeguín de la Tierra, tienen patrones característicos de color amarillo en la cabeza y la garganta.

**EXPANSIÓN:** Islas del Caribe y norte de Suramérica. **STATUS:** Muy raro residente permanente, sólo reportado en Cayo Tío Pepe, nordeste de Isabela de Sagua. También registrado en Cayo Guillermo y alrededores de Gibara (un solo ejemplar). El estado actual de su población es desconocido. **HÁBITAT:** Matorrales bajos, arbustos y vegetación costera. **NIDIFICACIÓN:** Abril a junio. El nido lo construyen a baja altura, de forma globosa, y con una entrada lateral. Usualmente pone 3 huevos blancuzcos, con muchas manchitas en el polo mayor. **VOZ:** La nota del llamado es un suave y musical *tsip*. El canto es un zumbido: *tik-tsiii, tik-tik-tsiii*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, pequeñas frutas.

### Gorrion Azafrán

Saffron Finch

*Sicalis flaveola*

No ilustrado

**DESCRIPCIÓN** 14 cm (5,5"). Completamente amarillo; con la corona amarilla en el adulto. El inmaduro más pálido, con la cabeza grisácea; pecho amarillo y parte ventral blanca.

**ESPECIES SIMILARES** La Bijirita Amarilla (o Canario de Manglar) usualmente tiene rayas de color pardo rojizo en la parte ventral; pico más fino y hábitos arbóreos.

**EXPANSIÓN:** Suramérica y las Antillas Menores. Introducido en Jamaica y Puerto Rico. **STATUS:** Casual en Cuba. Un registro: octubre de 1996, provincia de Guantánamo. **HÁBITAT:** Sabanas costeras. **VOZ:** El llamado, un agudo *pink*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas.

### Cabrerito de la Ciénaga

Zapata Sparrow

*Torreornis inexpectata*

Lámina 47



**DESCRIPCIÓN** 17 cm (6,5"). **Macho:** Gris oliváceo por encima, con rayas oscuras y corona de color castaño. Garganta blanca, bordeada con dos líneas negras, el pecho y el vientre de color amarillo; los costados de un olivo grisáceo. **Hembra:** Menos vistosa que el macho. Tres razas conocidas: las de Zapata y Cayo Coco son bastante similares, con los colores más brillantes. La raza oriental, al este de la bahía de Guantánamo, es más opaca, con la corona casi gris. **Inmaduro:** De color olivo grisáceo, amarillo claro por debajo y carece del color castaño en la corona. Vuelo débil.

**ESPECIES SIMILARES** El Gorrion de Cola Verde es oliváceo por encima, cabeza gris con la corona pardo rojiza. Gris por debajo.

**EXPANSIÓN:** Endémico de Cuba. **STATUS:** Globalmente amenazada. Restringido, vulnerable y raro residente de tres áreas completamente separadas: Ciénaga de Zapata, específicamente al norte de Santo Tomás; Cayo Coco, al norte de la provincia de Ciego de Ávila; y en la región costera entre Tortuguilla y Maisí, en la provincia de Guantánamo. **HÁBITAT:** Bastante diferente en las tres áreas: En Zapata se localiza en extensas llanuras de hierba de cortadera, que se encuentran cubiertas de agua unos cincuenta centímetros de profundidad durante la mitad del año y bordes de manglares. Cayo Coco es un área de bosques secos y semihúmedos con arbustos y en menor cantidad en la vegetación costera. Sureste de la provincia de Guantánamo, en áreas con matorrales espinosos, cactus y escasos árboles. **NIIFICACIÓN:** Abril a junio. Tiene forma de copa, y los construye en la parte alta de los arbustos, así como en el interior de los mazos de hierba de cortadera. Los huevos son blancos, con una tenue tonalidad verdosa y



plomo en la rabadilla del Gorrión de Cabeza Parda. Cola bastante larga y bifurcada. El inmaduro similar al adulto, con el pecho y los costados de color pardo amarillento claro.

**ESPECIES SIMILARES** El adulto en plumaje de invierno y el inmaduro del Gorrión de Cabeza Parda tienen la rabadilla gris plomo y carecen de la franja central en la cabeza, y del borde pardo oscuro del parche de la mejilla.

**EXPANSIÓN:** Cría en Norteamérica septentrional, inverna al sur hasta México.

**STATUS:** Raro transeúnte y visitante invernal en Cuba (15 de oct. a 5 de dic. y 26 de ene.). **HÁBITAT:** Sabanas con arbustos. **VOZ:** Un fino *tsiip*.

**ALIMENTACIÓN:** Semillas e insectos.

### Gorrión de Uñas Largas

Lark Sparrow

*Chondestes grammacus*

Lámina 47

**DESCRIPCIÓN** 17 cm (6,5"). Pardo por encima con rayas oscuras, la cabeza con marcadas franjas de color castaño y blancas. Blancuzco por debajo, con un llamativo parche negro en el centro del pecho. Cola larga y redondeada, con bordes blancos.

**ESPECIES SIMILARES** El adulto del Gorrión de Coronilla Blanca tiene la cabeza marcada con franjas blancas y negras; la cola y el pecho sin marcas.

**EXPANSIÓN:** Cría al sur del Canadá; Estados Unidos y México; inverna dentro de su área de cría. **STATUS:** Casual en Cuba. Cuatro registros: uno sin fecha (siglo XIX), 12 de dic., 10 de feb. (1958) y 25 de mar. (1965) en La Habana. **HÁBITAT:** Sabanas arbustivas. **VOZ:** Un agudo *tink* o *jii*.

**ALIMENTACIÓN:** Insectos, semillas.

### Gorrión de Sabana

Savannah Sparrow

*Passerculus sandwichensis*

Lámina 47

**DESCRIPCIÓN** 15 cm (5,75"). Pardo por encima, densamente rayado. Blancuzco por debajo, con el pecho y costados rayados, a menudo una mancha negra en la parte central del pecho. Cabeza con una franja central pálida, área loreal amarillenta o blancuzca. Ceja blancuzca y una característica línea oscura a ambos lados de la garganta. Cola corta y bifurcada, patas y dedos rosados. Cuando se alarma, vuela cortas distancias.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Chamberguito es ligeramente más pequeño y sin marcas por debajo. Las plumas exteriores de la cola terminan en puntas muy finas. (2) El Gorrión de Lincoln tiene ceja gris, pecho con una banda de color pardusco amarillenta, y finamente rayado por debajo.

**EXPANSIÓN:** Cría en Norteamérica y al sur hasta Guatemala; inverna hasta Honduras; Bahamas, Cuba, Islas Caimán e Isla Swan. **STATUS:** Común como residente invernal y transeúnte en la Isla de Cuba (11 de oct. a 25 de abr.). **HÁBITAT:** Herbazales, pastizales, sabanas, y vegetación costera baja.



**STATUS:** Raro residente invernal y transeúnte en Cuba (12 de oct. a 28 de nov. y 8 de ene. a marzo). **HÁBITAT:** Sabanas con arbustos, sotobosques, matorrales, jardines. **VOZ:** Un duro *chup* y un peculiar zumbante *dzzzzzz*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, insectos.

### Gorrión de Coronilla Blanca

White-crowned Sparrow

*Zonotrichia leucophrys*

Lámina 47

**DESCRIPCIÓN** 18 cm (7"). Espalda, alas y cola de color pardo. Corona con franjas negras y blancas muy marcadas; cara y cuello gris, garganta blanquizca, y vientre mayormente gris. Pico naranja o rosado, oscuro en la punta. Dos barras estrechas en el ala, pero muy visibles. El inmaduro tiene la cabeza rayada en color pardusco amarillento y pardo oscuro.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Gorrión de Uñas Largas tiene franjas blancas y de color castaño en la cabeza y las puntas exteriores de la cola blancas. (2) La hembra del Gorrión Doméstico se parece al inmaduro, pero es menos lustrosa y carece de las marcadas franjas en la cabeza. Una sola barra en el ala poco visible. (3) El Chambergo tiene los costados rayados, alas sin marcas, plumas de la cola muy puntiagudas.

**EXPANSIÓN:** Cría desde el norte de Canadá hasta el oeste de Estados Unidos, inverna por todo el sur de este país hasta México, Islas Bahamas y Jamaica. **STATUS:** Raro transeúnte en Cuba, pero probablemente sea residente invernal muy raro (2 de oct. a 22 de mar.). **HÁBITAT:** Bosques abiertos, campos de herbazales. **VOZ:** Un fino *siit*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, insectos.

## DEGOLLADO, AZULEJÓN, AZULEJO Y MARIPOSA Cardinalidae

### GROSBEAKS AND BUNTINGS

Aves de pequeño a mediano tamaño con pico robusto y cónico; este grupo está representado por seis especies migratorias o residentes invernales que proceden de Norteamérica. Los machos son de bellos colores, las hembras menos coloreadas. Comedores de semillas, frutas e insectos, se encuentran en bosques poco densos o en vegetación arbustiva. (M:47; C:6)

#### Degollado

Rose-breasted Grosbeak

*Phenicticus ludovicianus*

Lámina 48

**DESCRIPCIÓN** 20 cm (7,75"). *Macho:* En plumaje de invierno, la cabeza y la espalda de un pardo muy oscuro o negro; pequeñas manchitas blancas en las coberteras y primarias de las alas. Plumás más externas de la cola

con marcas blancas. Coberteras inferiores del ala de color rosado, rabadilla blanca barrada en gris. Un parche rojo triangular en la parte superior del pecho que se hace más fino hacia su parte inferior; vientre blanco. Costados rayados. Plumaje de cría similar pero con la cabeza y espalda negras, costados y rabadilla completamente blancos. *Hembra*: De color pardo por encima, rayada; franjas blancuzcas en la cabeza; coberteras inferiores del ala amarillas. Gris pálido por debajo, rayada. Ambos sexos tienen los picos muy gruesos y pálidos. Los inmaduros de ambos sexos similares a la hembra, pero el macho tiene una tonalidad rosada en la parte superior del pecho.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** Cría al este, norte y centro de Norteamérica; inverna desde la mitad de México hasta Perú. **STATUS:** Transeúnte poco común y muy raro residente invernal en Cuba, Isla de Pinos y algunos de los grandes cayos (23 de sept. a 7 de may.). **HÁBITAT:** Bosques, jardines. **VOZ:** Un fuerte y áspero *iik*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas y frutas.

## Azulejón

Blue Grosbeak

*Passerina caerulea*

Lámina 48

**DESCRIPCIÓN** 17 cm (6,75"). *Macho*: Azul; barras de color pardo rojizo sobre el ala negra opaca. *Hembra*: Color pardo por encima, con alas y cola oscuras. La parte ventral más pálida, con garganta blancuzca. Rabadilla y hombro de color azul. Barras en el ala de color pardo pálido. Pico grueso. *Inmaduro*: De un colorido más uniforme y más pardo anaranjado que la hembra adulta. Habitualmente mueve la cola.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Azulejo es más pequeño, con el pico más chico y carece de barras visibles en las alas. (2) La hembra de la Mariposa Azul es más pequeña, con la rabadilla de color azul pálido y barras blancas en el ala menos visibles. En general, el Azulejón siempre parece más grande y con la cabeza más puntiaguda que la de los otros azulejos.

**EXPANSIÓN:** Cría desde los Estados Unidos hasta Costa Rica; inverna hasta Panamá. **STATUS:** Transeúnte común y muy raro como residente invernal en Cuba, Isla de Pinos y algunos grandes cayos (1 de sept. a 2 de may.). **HÁBITAT:** Bosques, vegetación costera, jardines. **VOZ:** Un agudo *chink*. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, frutas.

## Mariposa Azul

Lazuli Bunting

*Passerina amoena*

Lámina 46

**DESCRIPCIÓN** 14 cm (5,5"). *Macho*: En plumaje de invierno, azul turquesa por encima, bordeado de pardo en la cabeza y rabadilla, alas negruzcas con barras blancas, plumas de la cola bordeadas en azul. Una ancha banda pardo rojiza sobre el pecho y costados. Vientre blancuzco. En plumaje

de cría, cabeza y rabadilla azul turquesa. *Hembra*: De color pardo por encima, y rabadilla azulosa con tenues barras color canela. Alas y cola de un pardo oscuro con algunos visos azules. La parte ventral sin marcas, con un tono pardo rojizo en la garganta y el pecho; vientre blancuzco. *Inmaduro*: Similar a la hembra, con tenues rayas en el pecho y la rabadilla de color pardo.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La hembra del Azulejo tiene rayas muy tenues en el pecho; puede o no presentar barras oscuras en las alas; rabadilla de color pardo. Macho en plumaje de cría enteramente azul. (2) El macho del Azulejón es mayor, de un azul más intenso, y tiene barras pardo rojizas en las alas, muy visibles.

**EXPANSIÓN**: Cría al centro y oeste de Norteamérica; inverna hasta México.

**STATUS**: Casual en Cuba. Un registro: 29 de mar. (1960), La Habana.

**HÁBITAT**: Zonas arbustivas. **VOZ**: Un fuerte *spit*. **ALIMENTACIÓN**: Insectos, semillas.

## Azulejo

Indigo Bunting

*Passerina cyanea*

Lámina 46

**DESCRIPCIÓN** 14 cm (5,5"). *Macho*: En plumaje de invierno, pardo por encima y por debajo con visos azules, más intenso el color en la rabadilla. Plumaje de cría azul índigo. *Hembra*: De color pardo por encima, más pálida por debajo, ligeramente rayada en el pecho y tenues barras de color pardo en el ala. El inmaduro similar a la hembra. Pico pequeño y cónico. Forma pequeñas bandadas.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Azulejón es mayor, con visibles barras en el ala de color pardo rojizo. (2) La hembra de la Mariposa Azul no tiene marcas por debajo; la rabadilla azulosa; el macho tiene en el pecho una banda de color pardo rojizo.

**EXPANSIÓN**: Cría en el suroeste, centro y este de Norteamérica; inverna al sur hasta Panamá y raramente al norte de Suramérica; Bahamas y las Antillas Mayores. **STATUS**: Común residente invernal y transeúnte en Cuba, Isla de Pinos y algunos grandes cayos (21 de sept. a 13 de may.). **HÁBITAT**: Bosques abiertos, áreas arbustivas, matorrales. A menudo se alimenta en el suelo. **VOZ**: Un zumbido *zhiiig*, o un corto *biiz*. **ALIMENTACIÓN**: Semillas, frutas, insectos.

## Mariposa o Verdón

Painted Bunting

*Passerina ciris*

Lámina 46

**DESCRIPCIÓN** 14 cm (5,5"). *Macho*: Muy vistoso, cabeza azul púrpura, espalda de color amarillo verdoso, rabadilla y región ventral rojo brillante.

*Hembra*: Dorso verde olivo y la parte ventral amarillo oliváceo, con un tenue anillo ocular. El inmaduro similar a la hembra pero de un verde más brillante, en particular la cabeza.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La hembra del Tomeguín Prieto es más pequeña, opaca, más verde olivácea, con el pico más oscuro. (2) La Mariposa Azul carece de tonos rojos o verdes, y tiene barras en las alas.

**EXPANSIÓN**: Sur, centro y sureste de Estados Unidos y nordeste de México; inverna al sur hasta Panamá, Bahamas, Cuba y Jamaica. **STATUS**: Común transeúnte y raro residente invernal en Cuba, Isla de Pinos y algunos grandes cayos de la costa norte (15 de oct. a 29 de abr.). **HÁBITAT**: Matorrales, herbazales, arbustos. **VOZ**: Un fuerte *chip*. **ALIMENTACIÓN**: Semillas y pequeñas frutas.

### Gorrión de Pecho Amarillo

Dickcissel

*Spiza americana*

Lámina 48

**DESCRIPCIÓN** 16 cm (6,25"). *Macho*: Pardo con rayas negras por encima y un parche de color castaño en el hombro. Cabeza gris con ceja amarilla. Mentón blanco, garganta con un parche negro triangular, pecho amarillo, y vientre gris pálido. *Hembra*: Similar al macho sin el parche negro de la garganta, con el amarillo ventral menos extendido y menos visible el parche del hombro. El inmaduro similar a la hembra pero considerablemente más opaco, con tenues rayas en los flancos.

**ESPECIES SIMILARES** La hembra del Gorrión Doméstico carece de rayas en la parte ventral y es de color pardo grisáceo, con una ceja ancha y visibles barras en el ala.

**EXPANSIÓN**: Cría al centro de Norteamérica; inverna al sur hasta el norte de Suramérica. **STATUS**: Muy raro transeúnte en Cuba (3 de sept. a 23 de nov. y 18 de mar. a 2 de may.). **HÁBITAT**: Zonas abiertas, arbustos, matorrales y campos cultivados. **VOZ**: Un corto pero característico *bzzt*.

## CHAMBERGO, TOTÍ, MAYITOS, SABANERO, HACHUELA Y TURPIALES Icteridae

### BOBOLINKS, BLACKBRIDS, MEADOWLARKS, GRACKLES, AND COWBIRDS

De mediano tamaño y por lo general de un negro lustroso; algunas especies están notablemente coloreadas de amarillo o naranja. Pico cónico, largo y puntiagudo. Alimentación variada, desde insectos y pequeños verrebros hasta frutas y néctar. Ciertas especies se alimentan en el suelo mientras otras son estrictamente arborícolas. Muchas son muy ruidosas, pero se incluyen algunas que son buenas canoras, en particular los turpiales. Altamente

gregarias, ciertas especies se reúnen en inmensas bandadas para descansar. La mayoría de las especies norteamericanas son migratorias y sexualmente dimórficas. (M:98; C:14)

## Chambergo

Bobolink

*Dolichonyx oryzivorus*

Lámina 45

**DESCRIPCIÓN** 18 cm (7"). Plumaje de invierno de un pardusco amarillento, con rayas en pardo oscuro por encima, la cabeza con dos franjas oscuras. La parte ventral es de un pálido amarillento pardusco, con los costados tenuemente rayados en pardo oscuro. En plumaje de cría, el macho tiene una gran mancha de color pardusco amarillento en la parte posterior del cuello y con las escapulares y la parte baja de la espalda blancas. El negro plumaje de cría en el macho tiene los bordes de color pardusco amarillento a principios de la primavera; estos se van perdiendo gradualmente a medida que avanza la estación. El plumaje de cría de la hembra es similar al plumaje de invierno, pero algo más claro. El juvenil similar a la hembra en el invierno, pero con mayor coloración pardo amarillenta por arriba, sin marcas, y más amarillo por debajo. Pico corto, ancho en la base. Plumas de la cola con las puntas afinadas en todos los plumajes.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El Gorrión de Sabana tiene el pecho densamente rayado y, como las dos siguientes especies, tiene las plumas de la cola normales, sin modificar. (2) La hembra del Gorrión Doméstico tiene la parte superior de la cabeza y la zona ventral sin marcas. (3) El inmaduro del Gorrión de Coronilla Blanca tiene barras blancas en el ala.

**EXPANSIÓN:** Cría en el centro de América del Norte; inverte en América del Sur desde Perú hasta Argentina. **STATUS:** Transeúnte común (13 de ago. a 12 de dic. y 5 de mar. a 12 de jun.). **HÁBITAT:** Vegetación costera, campos de arroz, sabanas. **VOZ:** Durante el vuelo, un *pink* suave y muy característico. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, insectos.

## Mayito de Ciénaga o Chirriador

Red-shouldered Blackbird

*Agelaius assimilis*

Lámina 49

**DESCRIPCIÓN** 21 cm (8,25"). *Macho:* Negro con una mancha de color rojo anaranjado en el hombro. *Hembra:* Completamente negra. Ambos sexos cantan casi idénticamente. El macho de un año es similar a la hembra, con una mancha pardusca en el hombro. Ambos sexos tienen la cola más bien cuadrada, con las puntas de las plumas ligeramente puntiagudas. El juvenil, negro opaco. Muy social, forma bandadas con el Totí y el Mayito.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El macho del Mayito tiene la mancha del hombro de un pardusco anaranjado, el pico más pequeño y la cola bifurcada, con



la punta de las plumas redondeadas. (2) El Totí es ligeramente mayor, con el pico más grande y la punta de las plumas de la cola redondeadas.

**EXPANSIÓN:** Endémico de Cuba. **STATUS:** Raro, pero localmente común en la parte central y occidental de Cuba. **HÁBITAT:** Ciénagas, campos de arroz y marismas. **NIDIFICACIÓN:** Mayo a agosto. Construye un profundo nido en forma de copa entre las altas hierbas de cortadera y junquillos, y pone de 3 a 4 huevos de un blanco azulado claro, densamente manchados en pardo rojizo y púrpura claro. **VOZ:** Altos chirridos ásperos, frecuentemente repetidos (de aquí su nombre, Chirriador): *owiihiiii-o-wiihiiii*. También un corto *chek-chek*. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, semillas y néctar.

### Mayito o Totí Mayito

Tawny-shouldered Blackbird

*Agelaius humeralis*

Lámina 49



**DESCRIPCIÓN** 20 cm (8"). Negro, ambos sexos con una mancha pardo anaranjada en el hombro, más pequeña y opaca en la hembra. Las plumas de la cola redondeadas en la punta. El juvenil es negro opaco, con la mancha del hombro más reducida y clara, algunas veces es visible sólo durante el vuelo. Cuando emiten el llamado (*chik*), estas aves levantan la cola sincrónicamente. Altamente social.

**ESPECIES SIMILARES** El macho del Mayito de Ciénaga tiene una mancha de color rojo anaranjado en el hombro. La hembra completamente negra, con el pico más grande. Ambos sexos tienen las plumas de la cola ligeramente puntiagudas.

**EXPANSIÓN:** Cuba y La Española (norte de Haití). **STATUS:** Residente permanente común en la Isla de Cuba y varios cayos grandes en ambas costas. No se le conoce de Isla de Pinos. **HÁBITAT:** Bosques abiertos, orillas de bosque, campos agrícolas, pastizales, riberas de ciénagas, matorrales costeros. **NIDIFICACIÓN:** Abril a agosto. Construye el nido en forma de copa en árboles; está hecho de hierbas, pelos y ocasionalmente algunas plumas. Por lo general pone de 3 a 4 huevos blancos, de tono verdoso, con manchas pardas. **VOZ:** Silbidos cortos, chirridos ásperos: *wiii-wiii*; y un *enk* nasal. También un fuerte *chik*, que se repite a menudo. **ALIMENTACIÓN:** Abejas, semillas, néctar, frutas, pequeñas lagartijas.

### Sabanero

Eastern Meadowlark

*Sturnella magna*

Lámina 48



**DESCRIPCIÓN** 23 cm (9"). Pardo por encima, rayado en pardo oscuro; la cabeza aplanada, con marcadas franjas pardas y de un pardusco amarillento claro. Pico largo y recto. Amarillo subido en la parte ventral, con una característica banda negra en forma de V a través del pecho, vientre blancuzco. Costados rayados en pardo oscuro. En invierno el adulto presenta la banda en forma de V con un viso amarillento. El juvenil es similar al adulto, pero más claro, con el pecho rayado y la garganta gris. Cola corta, con las plumas externas bordeadas de blanco. Hábitos terrestres; se le encuentra solo o en pequeños grupos. Vuelo bajo, con aleteo rápido y planeos cortos. Posado en tierra, mueve a menudo la cola.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** Cría al este y sur de América del Norte, hasta el norte de Brasil. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba e Isla de Pinos y Cayo Romano. Casual en Cayo Coco. **HÁBITAT:** Sabanas, pastizales, bosques abiertos con grandes claros herbosos, pantanos secos. **NIDIFICACIÓN:** Todo el año. Construye el nido en forma de cúpula entre las hierbas, poniendo de 4 a 5 huevos, con manchas pardo rojizas concentradas en el polo mayor. **VOZ:** Un silbido modulado. También

un chirrido burbujeante. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, pequeñas lagartijas, gusanos, semillas.

### Mayito de Cabeza Amarilla

Yellow-headed Blackbird

*Xanthocephalus xanthocephalus*

Lámina 49

**DESCRIPCIÓN** 24 cm (9,5"). **Macho:** Negro con cabeza y pecho de color amarillo anaranjado, y una mancha blanca en el ala. **Hembra:** Más pequeña, de color pardo oscuro con la cara, garganta y pecho de color amarillo opaco. Parte inferior del pecho rayado en blanco. Carece de la mancha del ala. El inmaduro similar a la hembra, el macho en particular con la mancha en el ala apenas visible.

**ESPECIES SIMILARES** Ninguna.

**EXPANSIÓN:** Cría al oeste de América del Norte, inverna al sur hasta México.

**STATUS:** Casual en Cuba. Cuatro registros: uno del siglo XIX, dos en otoño (sin fecha) y 10 de dic. (sin precisar año). **HÁBITAT:** Fincas, campos.

**VOZ:** Un *ktuk* nítido. **ALIMENTACIÓN:** Semillas, frutas, insectos grandes.

### Totí o Choncholí

Cuban Blackbird

*Dives atrovioletaceus*

Lámina 49



**DESCRIPCIÓN** 27 cm (10,5"). Completamente negro, con brillos metálicos violáceos. Pico robusto. Ojo pardo. Cola aplanada y cuadrada en su borde posterior. Hembra ligeramente más pequeña. Juvenil de un negro opaco.

**ESPECIES SIMILARES** (1) El adulto del Chichinguaco tiene el ojo amarillo, pico más largo y más fino, cola plegada o en forma de quilla. (2) La hembra del Mayito de Ciénaga es más pequeña, con plumas ligeramente puntigradas en la cola.

**EXPANSIÓN:** Endémico de Cuba. **STATUS:** Común, aunque ausente de Isla de Pinos y cayos. **HÁBITAT:** Bosques montanos, áreas cultivadas, arboledas.

**NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. Construye el nido en forma de copa entre las hojas de palma, entre los racimos de palmiche, o curujeyes; lo fabrican

con hierbas secas, raíces, pelo y plumas. Pone de 3 a 4 huevos blanco grisáceos, con manchas grises y pardas en el polo más grueso. **VOZ:** Un alto y variable *tiu-tiu-tiu*, o *tii-liitu*, que repite con frecuencia, y también un prolongado y nasal *enk*; un llamado en forma de chachareo, y un simple *kik*, a menudo repetido. **ALIMENTACIÓN:** Omnívoro.

### Totí Pardo\*

Rusty Blackbird

*Euphagus carolinus*

Lámina 51

**DESCRIPCIÓN** 23 cm (9"). **Macho:** Negruzco, con la punta de las plumas de color pardo rojizo sólo en el otoño; con barras en la parte ventral. Ojo amarillo muy claro, que parece blanco; ceja ancha y de un pardusco amarillento. Plumaje de cría negro con muy tenues destellos verdes. Pico delgado y de punta muy fina. **Hembra:** Similar al macho en otoño, de color pardo en la parte ventral. Plumaje de cría grisáceo. **Inmaduro:** Similar a los adultos en plumaje de invierno.

**ESPECIES SIMILARES** El Chichinguaco es mayor y tiene la cola en forma de quilla.

**EXPANSIÓN:** América del Norte septentrional; inverna en el sureste de Estados Unidos. **STATUS:** Un solo reporte visual en el otoño, en la ciudad de La Habana (octubre de 1960). **VOZ:** Un *chuck* bajo; y varias notas altas y chirriantes. **ALIMENTACIÓN:** Insectos, semillas.

### Chichinguaco o Hachuela

Greater Antillean Grackle

*Quiscalus niger*

Lámina 49



**DESCRIPCIÓN** 28 cm (11"). Completamente negro; el macho muy lustroso, con brillos metálicos purpúreos y ojo de un amarillo intenso en el adulto. Pico fino y ligeramente curvado. Cola plegada en forma de quilla. Hembra similar, ligeramente más pequeña. Juveniles similares a los adultos, con ojos castaños y alas pardas. La raza *caribaeus* del extremo más occidental de Cuba, Isla de Pinos y cayos adyacentes, exhibe un lustre verde

metálico. Social, aunque continuamente se muestren agresivos entre ellos; cientos de ellos se reúnen al anochecer en árboles altos. A menudo son vistos bañándose en los charcos durante el calor del día.

**ESPECIES SIMILARES** El Totí tiene un pico más corto y robusto, ojo pardo y cola aplanada.

**EXPANSIÓN:** Antillas Mayores e Islas Caimán. **STATUS:** Residente permanente, muy común en Cuba, Isla de Pinos y muchos de los cayos mayores. **HÁBITAT:** Bosques, vegetación costera, manglares, arboledas. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. Construye el nido en forma de copa, con hierbas y fango, generalmente en la base de las pencas de las palmas o grandes curujeyes. Pone de 3 a 5 huevos oliváceos, con manchas de color pardo rojizo. **VOZ:** Los cantos incluyen un alto y áspero *chin-chin-chin-lin-lin*, también un alto *tik*, a menudo repetido. El macho adulto hace una señal visual con la cola abierta, las alas caídas y las plumas erizadas, emitiendo un alto y metálico *wiii-süüi-iii*. **ALIMENTACIÓN:** Omnívoro, incluidos lagartijas y moluscos.

### Pájaro Vaquero o Tordo Lustroso

Shiny Cowbird

*Molothrus bonariensis*

Lámina 48



**DESCRIPCIÓN** 19 cm (7,5"). **Macho:** Azul violáceo metálico muy intenso, con alas verdes, que a menudo da la impresión de ser negro completo. **Hembra:** De color pardo grisáceo oscuro por arriba, más claro por debajo. Punta de la cola cuadrada. **Inmaduro:** Similar a la hembra pero con rayas oscuras.

**ESPECIES SIMILARES** (1) La hembra del Totí Americano tiene el pico más corto y la parte ventral rayada. (2) El Mayito es negro, con una mancha de color pardo anaranjado en el hombro.

**EXPANSIÓN:** Desde Panamá hasta el sur de Argentina; las Antillas Menores. Comenzaron a invadir las Antillas Mayores desde el sudeste durante la década del 1940, llegando a Cuba a finales de los setenta. También las Islas Bahamas y el sureste de los Estados Unidos. **STATUS:** Común residente permanente en Cuba e Isla de Pinos. **HÁBITAT:** Fincas, parques, pueblos, campos cultivados. **NIDIFICACIÓN:** Marzo a julio. Ave parásita,