

Fig. 11. Variabilidad morfológica de *Scenedesmus acuminatus* (Lagerh.) Chod. s. l. UTOs 1 (A) y 4 (B) (poblaciones naturales).




Fig. 12. Variabilidad morfológica de *Scenedesmus acuminatus* (Lagerh.) Chod. s. l. UTO 6 (población natural).




Fig. 13. Variabilidad morfológica de *Scenedesmus acuminatus* (Lagerh.) Chod. s. l. UTO 9 (población natural).




Fig. 14. Variabilidad morfológica de *Scenedesmus acuminatus* (Lagerh.) Chod. s. l. UTO 12 (población natural).




Fig. 15. Variabilidad de *Scenedesmus javanensis* Chod. f. *schroeteri* (Hub.-Pest.) Comas et Kom. UTO 5 (población natural).




Fig. 16. Variabilidad de *Scenedesmus javanensis* Chod. f. *javanensis*. UTO 7 (población natural).




Fig. 17. Variabilidad de *Scenedesmus javanensis* Chod. f. *javanensis*. UTO 7 (población natural).




Fig. 18. Variabilidad de *Scenedesmus javanensis* Chod. f. *javanensis*. UTO 14 (población natural).




Fig. 19. Variabilidad de *Scenedesmus obliquus* (Turp.) Kütz. var. *dimorphus* (Turp.). UTO 8 (población natural).




Fig. 20. Variabilidad de *Scenedesmus obliquus* (Turp.) Kütz, var. *dimorphus* (Turp.). UTO 11 (población natural).




Fig. 21. Poblaciones naturales intermedias entre las variedades *obliquus* y *dimorphus*. UTOs 2 (A) y 3 (B).